

Revisjon av naturtypebasen til Oppegård kommune

Stefan Olberg og Terje Blindheim



Ekstrakt

BioFokus har på oppdrag fra Oppegård kommune gått igjennom kommunens Natur-2000-base for å oppdatere eksisterende naturtyper. I kommunens naturbase er det pr dags dato avgrenset og beskrevet 310 naturtype-lokaliteter, hvorav 124 utgjør punktregistreringer av eiketrær. Det er lagt inn 31 nye polygoner og 57 nye punkter. I 37 av de gamle polygonene ble enten naturtype, verdi, navn eller avgrensinger forandret. Det er registrert 90 funn av 36 ulike rødlistearter innenfor de avgrensede naturtypene. Kartleggingsstatusen i kommunen er generelt god, men de eldre lokalitetene er ofte dårlig beskrevet og flere av dem kunne med fordel vært inventert på nytt.

Nøkkelord

Oppegård
Akershus
Naturverdier
Naturtyper
Natur2000
Eiker
Rødlistearter
Verdivurdering

Omslag

FORSIDEBILDER

Øvre: Oksetungesopp. Foto: Stefan Olberg.

Midtre: Grov eik ved Bålerud. Foto: Anders Thylén.

Nedre: Rikt strandberg ved Bålerud. Foto: Anders Thylén.

LAYOUT OMSLAG

Blindheim Grafisk

ISSN: 1504-6370

ISBN: 978-82-8209-201-2

BioFokus-rapport 2012-16

Tittel

Revisjon av naturtypebasen til Oppegård kommune

Forfattere

Stefan Olberg og Terje Blindheim

Dato

01.05.2012

Antall sider

102 sider

Publiseringstype

Digitalt dokument (Pdf). Som digitalt dokument inneholder denne rapporten "levende" linker.

Oppdragsgiver

Oppegård kommune

Tilgjengelighet

Dokumentet er offentlig tilgjengelig.

Andre BioFokus-rapporter kan lastes ned fra:

<http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>

BioFokus: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

Telefon 2295 8598

E-post: post@biofokus.no Web: www.biofokus.no

Forord

Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Oppegård kommune foretatt en oppdatering av kommunens naturbase. Oppdraget gikk ut på å oppdatere de eksisterende naturtypedataene til et enhetlig datasett i henhold til DN sine kriterier for naturtypedata, samt inkludere kartlagte lokaliteter som ikke var lagt inn i basen. Dette inkluderte et datasett fra 2008 kartlagt av Harald Bratli, BioFokus sin naturtypekartlegging og edelløvskogskartlegging i 2011 og kartleggingen av «hule eiker» (naturtypen «Store gamle trær - eiker») i 2010 og 2011 av Sigmund Løvåsen. Alle naturtyper har nå en mer enhetlig beskrivelse og er i en viss grad vurdert på nytt etter naturtypemetodikk beskrevet i DN-håndbok 13.

Kristine von Hanno og Marcus Hothmann har vært våre kontaktpersoner hos oppdragsgiver. Karoline Bredland hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært delaktig i prosjektet, og har vært behjelpelig med anskaffelse av nødvendige data og med synspunkter underveis. Håkon Borch drifter Natur2000-basen som dekker hele Follo, og han har vært behjelpelig med å fremskaffe eksisterende naturtypedata for Oppegård. Stefan Olberg hos BioFokus har vært prosjektansvarlig og stått for oppdateringen av naturtypene samt rapportskrivning. Terje Blindheim (BioFokus) har hatt det overordnede ansvaret, har løst en del datatekniske problemer og vært med å skrive og kvalitetssikre rapporten. Kim Abel (BioFokus) har hjulpet til med produksjonen av kartfiler. Vi takker for oppdraget og for den hjelpen vi har fått.

Oslo, 01.05.2012

Stefan Olberg og Terje Blindheim



Flyfoto over Østre Oppegård som viser mosaikken i kulturlandskapet (kopiert fra norgeskart.no).

Innhold

1	INNLEDNING	5
1.1	BAKGRUNN	5
2	METODE	5
3	RESULTATER	6
3.1	NYE NATURTYPER 2012	6
3.2	OPPEGÅRDS NATURTYPER	6
3.3	KARTLEGGINGSSTATUS	10
3.4	RØDLISTEARTER	11
3.5	LOKALITETSBESKRIVELSER	13
3.5.1	<i>Beskrivelser av alle lokalitetene i Oppegård</i>	18
4	REFERANSER	102

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

I forordet til første utgave av naturtypehåndboka (Direktoratet for Naturforvaltning 1999) står følgende: "Det er et politisk mål at alle landets kommuner skal gjennomføre kartlegging og verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold på sine arealer (St. meld. nr. 58 (1996/97) 1996-97). Den kommunale kartleggingen omfatter naturtyper, vilt, rødlistearter, ferskvannslokaliteter og marint biologisk mangfold."

Naturtypekartleggingen i Oppegård kommune ble opprinnelig gjennomført i 2004-5. Den gang lå fokus på å avgrense, klassifisere og verdisette lokalitetene, mens beskrivelsene ofte var svært kortfattede og mangelfulle. En del av disse registreringene ble foretatt i forbindelse med MiS-kartlegging i kommunen og senere inkludert i naturtyperegistreringene. Nyere naturtyperegistreringer er i så måte bedre, men med unntak av registreringene gjort av BioFokus det siste året, så mangler det stort sett foto fra lokalitetene. Hverken amfibiekartleggingene eller eikeregistreringene som er foretatt i kommunen er gjort med tanke på naturtyper, og beskrivelsene av disse er derfor til dels mangelfulle.

Dette oppdraget har ikke inkludert feltarbeid, og det var ikke forventet at det skulle foretas nevneverdige endringer i teksten på de eksisterende naturtypebeskrivelsene. Mindre endringer var i mange tilfeller likevel nødvendig for å få tekstene til å henge sammen eller for å fylle ut manglende opplysninger.

I forbindelse med oppdateringen og samordningen av data i en felles database har BioFokus produsert SOSI-filer for naturtypetemaet. Disse er oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus sammen med egenskapsdataene. Fylkesmannen og kommunen har kvalitetssikret datasettet og Naturbase skal oppdateres med foreliggende data, som inneholder alle registrerte naturtyper i kommunen.

2 Metode

Det gamle naturtypedatasettet ble overført til en oppdatert versjon av Natur2000 og eksisterende tekst ble plassert på riktig plass i basen. Mange av naturtypebeskrivelsene manglet en del nødvendig informasjon, og slik informasjon ble etter beste evne lagt inn i basen. Dette gjaldt spesielt informasjon som hvor lokaliteten ligger, når lokaliteten ble oppsøkt og av hvem. Mange av beskrivelsene av lokalitetene var meget kortfattede og gjorde det vanskelig å legge til nødvendig informasjon, samt gjøre vurderinger av verdi, skjøtsel/hensyn, bruk og påvirkning, samt vurdere trusler mot lokalitetene på en forsvarlig måte. Mange av de eldre naturtypene har derfor i stor grad beholdt sine opprinnelige vurderinger og beskrivelser, med mindre det var en opplagt grunn til å endre noe. En del av lokalitetene er derfor dårlig beskrevet/vurdert og burde vært oppsøkt på nytt i felt.

Alle nye og eldre, uregistrerte lokaliteter ble lagt inn i basen og beskrevet etter DN-håndbok 13, 2. reviderte utgave (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Det henvises til denne, og da spesielt kapitlene 2 - 6, for en nærmere redegjørelse av kriterier for utvelgelse av naturtyper og verdisetting av dem. Figurene ble digitalisert i kartprogrammet Quantum GIS, mens sosifilene ble laget i ArcGis og SosiGis.

3 Resultater

3.1 Nye naturtyper 2012

En del tidligere kartlagte lokaliteter, samt lokaliteter kartlagt det siste året, lå ikke inne i naturbase. Enkelte endringer i tidligere registrerte lokaliteter har heller ikke vært oppdatert i basen. Her gis en kort oppsummering av hvilke nye og endrete data som nå er lagt inn i Oppegårds naturbase.

- Brattli kartla noen lokaliteter i 2008 som ikke lå inne i naturbase. Disse er nå lagt inn i basen.
- Sandås har kartlagt amfibier over flere år i Oppegård (Sandås 2011), og noen av dammene som inneholdt amfibier var ikke avgrenset og beskrevet. BioFokus har på bakgrunn av denne informasjonen og ortofoto/kartdata avgrenset fire nye lokaliteter i 2012.
- Løvåsen har vinteren 2010 og 2011 avgrenset 128 eiker innenfor Svartskog landskapsvernområde som oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik. Av disse er 124 eiker lagt inn i naturbase som punktforekomster (se fig. 2) og beskrevet som naturtyper. 68 av disse lå fra før av tilgjengelig på naturbase, de resterende er nye.
- I forbindelse med reguleringsplan for Bålerud, ble 24 naturtyper avgrenset i 2010 (Thylén og Blindheim 2011). Atten av naturtypene utgjør nye avgrensninger, mens 6 av lokalitetene er oppdateringer av tidligere registrerte naturtyper.
- BioFokus, ved Anders Thylén, kartla et område ved Sjødal, sørvest i Oppegård, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog i Akershus i 2011. En endret lokalitet og fire nye lokaliteter er nå inkludert i basen som følge av denne kartleggingen.
- I tillegg til disse nyregistrerte og endrede lokalitetene, er det foretatt enkelte endringer i de gamle dataene. Dette gjelder både kartavgrensninger og endringer av lokalitetsnavn, verdiendringer, naturtypeendringer og endringer i beskrivelsene av lokalitetene.


3.2 Oppegårds naturtyper

I dette kapittelet gis en oppsummering av hovedtrendene for alle naturtypedataene i Oppegård kommune per 1. mai 2012.


De 310 registrerte lokalitetene består av 124 punktforekomster (eiker avgrenset av Løvåsen, se fig. 2) og 186 polygoner (fig. 1). Alle de 124 eikene ligger i realiteten (men ikke alltid i forhold til de noe unøyaktige kartavgrensningene) innenfor andre avgrensede naturtyper, og hele 65 av punktene ligger innenfor lokalitet nr. 19 Solheim - Oppegård Vestre. Alle punktforekomstene er omskrevet noe, de fleste har fått endret navn (navnene er fortsatt ofte lange og kompliserte) og 28 forekomster har fått endret (høynet) verdi.

Tabell 1 viser antall ulike naturtyper registrert i Oppegård, fordelt på lokalitetenes verdi. Skog er den hovednaturtypen som utgjør det klart største arealet med nesten 80 %, mens antallet skoglokaliteter utgjør under en tredjedel av totalen (fig. 4). Kulturlandskap har flest lokaliteter med nesten 60% av lokalitetene, mens arealet bare utgjør i underkant av 8 % (fig. 4). Hovedårsaken til de store forskjellene i antall og areal, er at skogslokaliteter generelt er større enn lokaliteter i kulturlandskapet, samt at det store antallet registrerte «hule eiker» i Oppegård trekker gjennomsnittsstørrelsen på kulturlandskapslokalitetene ned. En annen faktor som også virker inn er at mange av de middels store lokalitetene innenfor Svartskog landskapsvernområde ofte er registrert som skogslokaliteter, mens store deler av områdene i realiteten burde vært registrert

som gjengroende kulturmark (som, som regel, ikke er noen prioritert naturtype etter DN-håndbok 13).



Figur 1 Lokaliseringen av naturtyper (polygoner) i Oppegård.




Figur 2 Lokalisering av forskriftseiker (Store gamle trær – eik) i Oppegård.


Tabell 1 Fordelingen av ulike naturtyper i Oppegård.

Hovednaturtype	Naturtype	A	B	C	Totalt
Ferskvann/våtmark	Dam	2	9	2	13
	Rik kulturlandskapssjø	1			1
	Viktig bekke­drag		1	1	2
	Naturlig fisketomme innsjøer og tjern	1			1
	Evjer, buker og vik­er		1	1	2
Kulturlandskap	Artsrik veikant		1	2	3
	Hagemark		1	2	3
	Naturbeitemark			3	3
	Parklandskap	2	1		3
	Slåttemark			2	2
	Småbiotoper		3	16	19
Kyst og havstrand	Store gamle trær	2	43	103	148
	Rikt strandberg		1	1	2
	Strandeng og strandsump			2	2
Myr og kilde	Intakt lavlandsmyr i innlandet		1	2	3
Skog	Gammel barskog	1	5	11	17
	Gammel lauvskog			3	3
	Gråor-heggeskog		2	2	4
	Kalkskog		1	1	2
	Rik blandingskog i lavlandet	1	3	5	9
	Rik edellauvskog	1	14	9	24
	Rik sumpskog	4	17	16	37
Sørvendt berg og rasmark	Kantkratt	1	2	3	6
Andre viktige forekomster	Annen viktig forekomst			1	1
Totalt		16	106	188	310


Av de totalt 310 avgrensede naturtypene i Oppegård er 16 vurdert som svært viktige (A-verdi), 106 som viktige (B-verdi) og 188 som lokalt viktige (C-verdi) (fig. 3). Arealmessig er fordelingen annerledes, der det samlede arealet B-verdi-lokaliteter er størst og arealet av C-verdi-lokalitetene er minst (fig. 3). Det er særlig to årsaker til at den observerte arealfordelingen avviker såpass kraftig fra antallsfordelingen. Den viktigste årsaken er at større områder per definisjon skal verdivurderes høyere enn små områder. Derfor vil det være en overvekt av store områder med en høy verdivurdering og likeledes mange små lokaliteter med en lav verdivurdering. Gjennomsnittsstørrelsen på A-områdene i Oppegård er på 68 dekar, mot henholdsvis 15 og 5 dekar for B- og C-områdene. Den andre hovedårsaken er at alle de 124 punktforekomstene (eiker) er satt til 0,1 dekar, samtidig som det er en meget stor andel C- og B-verdier blant disse (kun to eiker er vurdert til A-verdi). De fleste lokalitetene i Oppegård er små, og kun 6 lokaliteter er på over 100 dekar (fig. 5).



Figur 3 Antall og areal (ha) av alle lokalitetene sortert på verdi.



Figur 4 Fordelingen av hovednaturtyper i antall og andel (arealets dekningsgrad). F/v = Ferskvann/våtmark, K = Kulturlandskap, Kh = Kyst og havstrand, Mk = Myr og kilde, S = Skog, Sb = Sørvendt berg og rasmark, A = Andre viktige forekomster.



Figur 5 Fordelingen av de 310 lokalitetene på 5 arealklasser. Arealet er angitt i dekar (daa).

3.3 Kartleggingsstatus

Ser man på naturtypekartet i Oppegård er det tydelig at de utvalgte naturtypene har en klumpet fordeling. Spesielt tett med figurer er det innenfor Svartskog landskapsvernområde og det er også forholdsvis tett nordvest i kommunen, særlig i og rundt Delingsdalen NR. Det er vanskelig å anslå hvor godt naturtypekartlagt kommunen er, men det er sannsynlig at det fortsatt gjenstår områder med forekomster av spesielt viktig natur som bør kartlegges og avgrenses. Et større område som kanskje er noe underkartlagt er Mastemyr – Kolbotn-området. Her er det et potensial for forekomster av viktig natur i kulturlandskapet.

Dammer er tilsynelatende godt kartlagt, ettersom en stor andel av dammene i kommunen er oppsøkt og undersøkt for amfibier. Derimot er beskrivelsen av damlokalitetene som oftest mangelfulle og verdisetningen noe usikker. Kulturlandskapet er relativt godt kartlagt i Oppegård, men et fokus på Store gamle trær utenfor Svartskog LVO vil nok gi en god del flere avgrensinger. Skog er tilsynelatende godt kartlagt innenfor kommunen, selv om det fortsatt kan finnes områder som innehar viktig skognatur for det biologiske mangfoldet.

3.4 Rødlistearter

Norsk rødliste for arter (Kålås m.fl. 2010) angir statusen til alle arter som står i fare for å dø ut i Norge, eller allerede antas å ha død ut. Artene vurderes på en skala fra livskraftig til utdødd (tab. 2). Noen artsgrupper og enkeltarter er ikke rødlistevurdert eller har ikke vært egnet for vurdering.

Tabell 2 Definisjoner for IUCN sine rødlistekategorier. Arter plassert i kategoriene nedenfor streken er ikke med i rødlisten.

Rødlistekategorier		
EX	Utdødd	En art er <i>Utdødd</i> når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd.
EW	Utdødd i vill tilstand	Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager og lignende.
RE	Regionalt utdødd	En art er <i>Regionalt utdødd</i> når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.
CR	Kritisk truet	En art er <i>Kritisk truet</i> når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for <i>Kritisk truet</i> er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år).
EN	Sterkt truet	En art er <i>Sterkt truet</i> når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for <i>Sterkt truet</i> er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år).
VU	Sårbar	En art er <i>Sårbar</i> når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for <i>Sårbar</i> er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år).
NT	Nær truet	En art er <i>Nær truet</i> når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid.
DD	Datamangel	En art settes til kategori <i>Datamangel</i> når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlighet at arten ville blitt med på Rødlista dersom det fantes tilstrekkelig informasjon.
LC	Livskraftig	En art tilhører kategorien <i>Livskraftig</i> når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.
NE	Ikke vurdert	En art tilhører kategorien <i>Ikke vurdert</i> når det ikke er gjort noen vurdering for arten. Dette kan for eksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse.
NA	Ikke egnet	En art tilhører kategorien <i>Ikke egnet</i> når den ikke skal bedømmes på nasjonalt nivå. Dette gjelder her i hovedsak fremmede arter (arter kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller menneskelig aktivitet etter år 1800) eller er tilfeldige gjester.

I forbindelse med kartleggingene som ligger til grunn for lokalitetsavgrensingene, ble det registrert en del arter som står oppført på rødlisten. Artenes rødlistestatus per i dag, samt gjeldende norske navn på artene, er i stor grad oppdatert. Totalt finnes det 90 registreringer av 36 ulike rødlistearter innenfor lokalitetene i Naturbase (tab. 3). Dette gjenspeiler på ingen måte virkeligheten, og utgjør nok ikke en gang toppen av det berømte isfjellet. For eksempel er det ikke registrert en eneste rødlistet insektart, enda det kan forventes at det finnes mer enn hundre ulike rødlistede insektarter innenfor naturtypelokalitetene i kommunen. I Artskart ligger det totalt ca. 900 (300 uten fugl)

enkeltfunn av rødlistearter i Oppegård kommune. Heller ikke dette er spesielt imponerende, og det er opplagt at det er et behov for å bedre kunnskapen om hvilke interessante arter som faktisk finnes i kommunen. Bedre kunnskap om artsmangfoldet i kommunen vil også gjøre fremtidige verdivurderinger av viktige naturtyper enklere, ettersom man da vet mer om hvilke arter som forekommer innenfor lokalitetene og hvilke som finnes i nærområdet, og som derfor burde kunne forekomme også innenfor lokalitetene.

Tabell 3 Rødlistearter registrert innenfor lokalitetene. RL-kategori= rødlistekategori (se tab.2).
Antall = antall lokaliteter arten er registrert i.

Artsgruppe	Norsk navn	Vitenskapelig navn	RL-kategori	Antall
Sopp	oksetungesopp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT	1
	skaffjordstjerne	<i>Geastrum pectinatum</i>	NT	1
	rynkeskinn	<i>Phlebia centrifuga</i>	NT	3
	ospepigg	<i>Radulodon erikssonii</i>	VU	1
	drueblå kremle	<i>Russula azurea</i>	NT	1
	blodflekakorallsopp	<i>Ramaria sanguinea</i>	NT	1
	rosaskiveslørsopp	<i>Cortinarius calochrous</i>	EN	1
	børstebrunpigg	<i>Hydnellum mirabile</i>	VU	1
	flekkjuke	<i>Oligoporus hydnoidea</i>	EN	1
	eikehårskål	<i>Proliferodiscus tricolor</i>	VU	6
Lav	bleikdoggnål	<i>Sclerophora nivea</i>	NT	2
	stautnål	<i>Chaenotheca phaeocephala</i>	VU	1
		<i>Caloplaca lucifuga</i>	VU	1
Moser	muddermose	<i>Physcomitrella patens</i>	VU	1
	krystallgaffelmose	<i>Riccia cavernosa</i>	VU	1
Karplanter	solblom	<i>Arnica montana</i>	VU	1
	rankstarr	<i>Carex acutiformis</i>	EN	1
	dronningstarr	<i>Carex pseudocyperus</i>	NT	7
	vasstelg	<i>Dryopteris cristata</i>	EN	1
	hengepiggrør	<i>Lappula deflexa</i>	NT	1
	bukkebenurt	<i>Ononis arvensis</i>	EN	1
	oslosildre	<i>Saxifraga osloënsis</i>	NT	3
	nikkesmelle	<i>Silene nutans</i>	NT	2
	myrstjerneblom	<i>Stellaria palustris</i>	EN	2
	alm	<i>Ulmus glabra</i>	NT	7
	stavklokke	<i>Campanula cervicaria</i>	NT	1
	ask	<i>Fraxinus excelsior</i>	NT	9
	krusfrø	<i>Selinum carvifolia</i>	NT	9
	svalerot	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	RE	1
	hartmansstarr	<i>Carex hartmanii</i>	EN	1
	bittergrønn	<i>Chimaphila umbellata</i>	EN	1
Edderkoppdyr		<i>Tetragnatha striata</i>	VU	1
Amfibier og reptiler	spissnutefrosk	<i>Rana arvalis</i>	NT	2
	storsalamander	<i>Triturus cristatus</i>	VU	7
	småsalamander	<i>Triturus vulgaris</i>	NT	8
Fugl	strandsnipe	<i>Actitis hypoleucos</i>	NT	1
Totalt				90

3.5 Lokalitetsbeskrivelser

I det følgende presenteres en tabell med alle naturtypene sortert alfabetisk, samt en fullstendig områdebeskrivelse for hver av de 310 lokalitetene sortert etter lokalitetsnummer.

Tabell 4 Alfabetisk oversikt over alle naturtypene i Oppegård. NR=LokalID. Areal er oppgitt i hektar.

Lokalitet	ID	Hovednaturtype	Naturtype	Utforming	Verdi	Areal
Bekkensten	60	Andre viktige forekomster	Annen viktig forekomst		C	4,4
Bekkenstenbekken	312	Skog	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	B	0,07
Bekkenstenfeltet	13	Kulturlandskap	Hagemark	Bjørkehage	B	64,23
Bekkenstenfeltet Ø	12	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	19,3
Bekkenstenveien 13, 60 m NV for mobilmast, ved grind	1002	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Bekkenstenveien 7, 20 m NV for mobilmast	1003	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Bekkenstenveien 7, 20 m S for mobilmast	1005	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Bekkenstenveien 7, 50 m NV for mobilmast	1001	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Bekkenstenveien 7, 50 m NØ for mobilmast, inntil vei	1004	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Bekkenstenveien 7, 50 m S for mobilmast	1006	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Bekkenstenveien 70	316	Kulturlandskap	Slåttemark	Frisk/tørr, middels baserik eng	C	0,36
Bekkenstenveien ved høyspent	1042	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Bekkenstenvn. 5 m N for vei. 15 m N for barnepark	1024	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Bestemorstranda	71	Sørvendt berg og rasmark	Kantkratt	Urterik kant	B	22,59
Bjørnehue Ø	67	Skog	Rik sumpskog		B	11,71
Bjørnsrud	8	Kulturlandskap	Naturbeitemark		C	23,73
Bjørnsrud øst	9	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	52,04
Bråtan N	84	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	A	18,44
Bråtan NV	85	Skog	Rik edellauvskog		C	6,69
Bukt ved Vassbonn	130	Skog	Rik sumpskog	Viersump i lavlandet	C	8,18
Bålerud	17	Kulturlandskap	Parklandskap	Parker	A	15,04
Bålerudbrygga sør	310	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	Sørlig	B	14,14
Dam sørvest for Søndre Oppegård	56	Ferskvann/våtmark	Dam		B	0,37
Dam sørøst for Ingierstrand	10	Ferskvann/våtmark	Dam		B	0,88
Dam ved Korsveien	115	Ferskvann/våtmark	Dam	Eldre fisketom dam	C	2,15
Dam ved Skjervika	15	Ferskvann/våtmark	Dam		B	6,29
Dam vest for Søndre Oppegård	55	Ferskvann/våtmark	Dam		B	0,54
Delingsdalen	1	Skog	Rik sumpskog		A	104,31
Delingsdalen nord	7	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	B	13,53
Delingsdalen nordvest	5	Skog	Rik sumpskog		C	16,45
Delingsdalen sørvest	3	Skog	Rik sumpskog		B	73,33
Delingsdalen vest	4	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	5,2
Delingsdalen øst	6	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	B	126,9
Eidsdalen	120	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	11,24
Eidsdalen, nedre del	121	Kulturlandskap	Småbiotoper	Kantsamfunn	C	1,7
Ekornrud	123	Kulturlandskap	Store gamle trær	Ask	C	0,83
Ekornrud øst	124	Skog	Rik edellauvskog		C	8,54
Fiskern	158	Skog	Rik sumpskog		C	12,66
Fløysbonnmyra	141	Myr og kilde	Intakt lavlandsmyr i innlandet	Ombrotrofe og minerotrofe myrtyper	C	27,63
Framveien 18	306	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,39
Framveien 49	307	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,38
Framveien 64	304	Kulturlandskap	Store gamle trær	Stor eik	B	0,16
Furuåsen N	92	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	38,34
Furuåsen Ø	95	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	4,24
Gjersjø bru SØ	83	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	12,58
Gjersjøelva	74	Ferskvann/våtmark	Viktig bekkedrag		B	63,43
Gjersjøen golfbane 1	164	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdam	B	0,86
Gjersjøen golfbane 2	165	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdam	B	0,66
Greverud golfbane	167	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdam	C	0,33
Greverudbekken øvre del	107	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	C	23,8

Grytetjern	114	Myr og kilde	Intakt lavlandsmyr i innlandet	Ombrotrofe og minerotrofe myrtyper	C	12,88
Grønmo, 60 m SØ for ID89, ved hjørne på strømgjerde	1090	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Grønmo, 70 m NØ for vognskjul, 10 m N for høyspentlinje	1086	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Grønmo, 70 m SØ for barnehage ved åkerkant	1089	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Grønmo, 80 m Ø for barnehage, 5 m S for høgspent	1088	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Grønmo, nordre åkerkant ved skiløype, 70 m Ø for Roald Amundsensvei	1085	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Grønmo, nordre åkerkant ved skiløype, 80 m Ø for Roald Amundsensvei	1084	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Grønmo, Ø for vognskjul ved gjerde til barnehage	1087	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Holen V	106	Kulturlandskap	Artsrik veikant		B	4,8
Holene N	108	Skog	Gammel barskog		C	13,98
Hvitebjørn	80	Kulturlandskap	Store gamle trær	Ask	B	6,3
Hvitebjørn 2	79	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	C	29,28
Hvitebjørn N	78	Skog	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	C	15,31
Hvitebjørn NØ	77	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	13,47
Hvitebjørn SØ	82	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	15,72
Hvitebjørn Ø	81	Skog	Rik edellauvskog		C	15,69
Ingierstrandveien 130	315	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	Sørlig	C	0,4
Ingierstrandveien Ø I	313	Kulturlandskap	Store gamle trær	Furu	C	0,06
Ingierstrandveien Ø II	314	Kulturlandskap	Store gamle trær	Furu	C	0,59
Kantorodden midtparti	133	Skog	Rik edellauvskog	Or-askefog	B	18,92
Kantorodden vest	134	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	B	32,57
Kantorodden øst	132	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	B	61,44
Kolbotn kirke	139	Kulturlandskap	Småbiotoper	Kantsamfunn	B	2,9
Kolbotn trelast	166	Ferskvann/våtmark	Dam	Eldre fisketom dam	B	0,2
Kolbotntjern	116	Ferskvann/våtmark	Naturlig fisketomme innsjøer og tjern	Små myrtjern og myrpytter	A	8,47
Kolbotntjern, sumpskog	117	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C	23,27
Kolbotnvannet sør	122	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	28,42
Kolbotnvannet, bukt i S	168	Ferskvann/våtmark	Evjer, bukter og viker	Bukter og viker	B	1,63
Kolbotnveien ved Vassbonn	128	Kulturlandskap	Artsrik veikant		C	1,26
Kruttmølleåsen sør	69	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C	8,37
Kruttmølleåsen Ø	73	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	B	33,94
Kurud SØ	110	Skog	Gråor-heggeskog	Flommarksskog	C	3,26
Kurud V	96	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	B	65,36
Kurud Ø	111	Skog	Rik sumpskog	Viersump i lavlandet	B	8,34
Langslora	105	Ferskvann/våtmark	Rik kulturlandskapssjø	Næringsrik utforming	A	192,12
Langslora øst	104	Skog	Rik sumpskog		B	23,26
Laugskollen	113	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	43,26
Leirskallen	58	Skog	Rik sumpskog	Viersump i lavlandet	C	1,31
Lille Rørvik	135	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	19,43
Linnekastet, barskog	151	Skog	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	A	93,21
Linnekastet, kalkskog	150	Skog	Kalkskog	Lågurtkalkskog i kyststrøk	B	16,91
Linnekastet, kantkratt	148	Sørvendt berg og rasmark	Kantkratt		A	10,04
Linnekastet, strand	149	Kyst og havstrand	Strandeng og strandsump		C	5,95
Linnekastveien 13 N	318	Skog	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	C	4,9
Linnekastveien vest	308	Kyst og havstrand	Strandeng og strandsump		C	0,25
Linnekastveien øst	147	Skog	Rik edellauvskog	Or-askefog	B	23,38
Ljansbruket sør	72	Skog	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	C	20,67
Mastemyr vest 1	75	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	25,83
Mastemyr vest 2	76	Skog	Gråor-heggeskog	Liskog/ravine	B	3,42
Mellom Oppegård Østre og E18	91	Skog	Gråor-heggeskog	Liskog/ravine	C	13,93
Nord for Bålerud	21	Skog	Rik edellauvskog		B	46,75
Nordre Gjersjøli	119	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	A	236,64
Nordøst for Oppegård Østre 1	35	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	0,85
Nordøst for Oppegård Østre 2	36	Kulturlandskap	Småbiotoper	Kantsamfunn	B	5,23
Nydammen sør	16	Skog	Rik sumpskog		B	59
Nyjordåsen V	109	Skog	Rik sumpskog		C	23,13
Oppegård kirke	18	Kulturlandskap	Parklandskap	Kirkegårder	A	8,74

Oppegård kirke, 30 m V for nr 15, i åkerkant	1016	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 50 m V for parkering, 10 m S for nr 17	1018	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 50 m V for parkering, veikant	1017	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Oppegård kirke, 60 m N for kirke, ved vei	1019	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 60 m V for kirkegård, 10 m Ø for 7 og 8	1009	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 70 m V for kirkegård, sammen med nr. 8	1007	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 70 m V for kirkegård, ved nr. 7	1008	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 1 m S for høyspent	1011	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 10 m S for nr. 14	1015	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 15 m S for nr. 13	1014	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 3 m V for nr. 12	1013	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 5 m S for nr. 11	1012	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Oppegård kirke, ved inngang	1020	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	A	0,1
Oppegård Søndre	41	Kulturlandskap	Parklandskap	Parker	B	20,67
Oppegård Østre	26	Kulturlandskap	Store gamle trær	Ask	C	3,37
Oppegård Østre nord 1	27	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	3,75
Oppegård Østre nord 2	28	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	0,86
Oppegård Østre nord 3	29	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	0,46
Oppegård Østre nord 4	30	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	1,45
Oppegård Østre nord 5	31	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	1,47
Oppegård Østre nord 6	32	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	0,3
Oppegård Østre nord 7	33	Kulturlandskap	Småbiotoper	Kantsamfunn	C	5,61
Oredalen	14	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C	61,94
Prosted N	61	Sørvendt berg og rasmark	Kantkratt	Urterik kant	C	6,99
Prosted Ø	11	Skog	Rik edellauvskog		B	20,49
Revedalen	2	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	A	62,52
Roald Amundsens vei 145	303	Kulturlandskap	Store gamle trær	Stor eik	B	0,27
Roald Amundsens vei 154	300	Kulturlandskap	Store gamle trær	Stor eik	B	0,17
Roald Amundsens vei 156	301	Kulturlandskap	Store gamle trær	Stor eik	C	0,14
Roald Amundsens vei 159	302	Kulturlandskap	Store gamle trær	Furu	C	0,61
Roald Amundsens vei nord for Oppegård Østre	34	Kulturlandskap	Artsrik veikant		C	31,32
Rosenholm	140	Skog	Rik sumpskog	Viersump i lavlandet	B	33,15
Rødkjelda I	161	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,13
Rødkjelda II	162	Kulturlandskap	Store gamle trær	Ask	C	0,17
Rødkjelda III	163	Kulturlandskap	Hagemark	Eikehage	C	2,37
Rødstein	59	Skog	Rik edellauvskog	Or-askekog	B	12,14
Sandbukta Ø	68	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B	8,98
Sandbuktfeltet	70	Skog	Gammel lauvskog	Gammel bjørkesuksesjon	C	35,89
Sjødal	160	Kulturlandskap	Store gamle trær	Ask	C	0,07
Sjødalen	98	Skog	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	B	44,18
Sjødalstrand S	99	Skog	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	C	10,56
Skjervika sør 1	86	Skog	Rik sumpskog	Viersump i lavlandet	B	15,78
Skjervika sør 2	88	Skog	Grøor-heggeskog	Liskog/ravine	B	13,84
Skjervika V	87	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	13,47
Skogsdam sør for Østre Oppegård	25	Ferskvann/våtmark	Dam		A	0,23
Snipetjern	143	Myr og kilde	Intakt lavlandsmyr i innlandet		B	14,75
Snipetjern N	144	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C	7,95
Snipetjern sør	142	Skog	Rik sumpskog	Varmekjær kildelauvskog	A	13,24
Solheim - Oppegård Vestre	19	Skog	Rik edellauvskog		A	321,31
Solheim vest	20	Skog	Rik sumpskog		B	18,64
Solheim, 10 m V for høyspent	1028	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Solheim, 10 m Ø for parkering. Ved oldtidsvei-skilt	1021	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Solheim, 20 m V for brønnhus	1029	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Solheim, 20 m V for steingjerde	1010	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Solheim, 3 m N for parkering, ved skiløype	1022	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Solheim, 30 m V for brønnhus	1030	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Solheim, 90 m N for parkering, 5 m Ø for skiløype	1057	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Solheim, mellom vei og danseplattung	1023	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Solheim. 3 m Ø for høyspent	1027	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Solheim. I barnepark	1025	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1

Solheim. I hagen inntil huset	1026	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Store Rørvik	136	Ferskvann/våtmark	Evjer, bukter og viker	Bukter og viker	C	3,49
Store Rørvik øst	137	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	B	6,99
Storebukta	138	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C	5,74
Strandkollen	66	Sørvendt berg og rasmark	Kantkratt	Urterik kant	C	11,75
Strandkollen sør	65	Sørvendt berg og rasmark	Kantkratt	Urterik kant	C	6,38
Strandskogen sør	62	Sørvendt berg og rasmark	Kantkratt	Urterik kant	B	3,49
Strandskogen sørøst 1	63	Skog	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	C	26,79
Strandskogen sørøst 2	64	Skog	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	B	16,75
Svartskogbrygga nord	311	Skog	Kalkskog	Lågurtkalkskog i kyststrøk	C	4,9
Svartskogveien 20	309	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	3,79
SØ for Dal	94	Skog	Gammel barskog		C	5,08
Søndre Oppegård i eplehage I	1127	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård i eplehage II	1128	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård Søndre 7	97	Skog	Rik sumpskog		C	7,33
Søndre Oppegård, 10 m V for hovedbygning	1113	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård, 110 m NV for Rudøya, 60 m V for ID103	1103	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, 240 m SV for vognskjul	1093	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, 390 m Ø for tømmerlåve, 50 m Ø for høyspent, ved smal, lang åker	1091	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, 390 m Ø for tømmerlåve, 50 m Ø for høyspent, ved smal, lang åker. 20 m NØ for ID91	1092	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya	1097	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 15 m V for ID98	1099	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 5 m V for ID97	1098	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 5 m V for ID99	1100	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, allé mellom hus I	1111	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, allé mellom hus II	1112	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, allé mellom hus III	1110	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning I	1126	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning II	1125	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning III	1124	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning IV	1123	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning IX	1118	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning V	1122	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VI	1121	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VII	1120	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VIII	1119	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning X	1117	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning XI	1116	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning XII	1114	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård, mellom ID108 og stabbur	1109	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, sør på Rudøya, 180 m V for ID94, ved traktorvei	1095	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård, ved hønsehus	1105	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, ved hønsehus. 10 m V for 105	1107	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, ved hønsehus. 5 m V for 105	1106	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, ved stabbur	1108	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, Vest på Rudøya	1096	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård, åkerholme 150 m V for Sjødalveien	1094	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Søndre Oppegård, 70 m NV for Rudøya, 45 m V for ID100	1102	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Søndre Oppegård, 70 m NV for Rudøya. 40 m V for ID100	1101	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Sør for Grønmo	40	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	0,59
Sør for Oppegård Søndre 1	49	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	0,73
Sør for Oppegård Søndre 2	50	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	0,71
Sør for Oppegård Søndre 3	51	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	B	1,16
Sør for Oppegård Søndre 4	52	Kulturlandskap	Småbiotoper	Kantsamfunn	C	2,41
Sør for Oppegård Søndre 5	53	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	B	29,12
Sør for Oppegård Søndre 6	54	Skog	Rik edellauvskog		B	141,57
Sør for Oppegård Vestre	22	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	2,3
Sør for Oppegård Østre	39	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,2

Torbjørnrud	89	Kulturlandskap	Naturbeitemark	C	2,64	
Torbjørnrud vest	90	Kulturlandskap	Naturbeitemark	C	1,66	
Trolldalen	154	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	B	32,41
Trolldalen nord 1	152	Skog	Rik edellauvskog		B	17,05
Trolldalen nord 2	153	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	C	8,11
Trolldalen øst	155	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C	15,74
Tussebekken	103	Ferskvann/våtmark	Viktig bekke­drag	Parti som binder sammen andre naturmiljøer	C	17,16
Tussetjern	101	Skog	Rik edellauvskog		C	10,26
Tussetjern nord	100	Skog	Rik sumpskog	Viersump i lavlandet	C	2,47
Tussetjern sør	102	Skog	Rik sumpskog	Viersump i lavlandet	C	2,83
Tverrveien S	159	Ferskvann/våtmark	Dam		A	9,86
Tårnåsen	145	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	24,02
Vassbonn vest	129	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	C	7,65
Vassbotn	131	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	C	4,79
Ved Oppegård Vestre	23	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	2,45
Ved Oppegård Østre	24	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdam	B	0,52
Vest for Bålerud	57	Kulturlandskap	Hagemark	Eikehage	C	2,21
Vest for Bålerud II	317	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	4,88
Vestenga N	146	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C	12,17
Vestre Oppegård, 130 m V for hus, 50 m Ø for ID65	1066	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, 15 m S for ID48	1049	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppegård, 150 m V for hus, 55 m S for ID64	1065	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, 30 m S for ID49	1050	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, 40 m NV for ID63	1064	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, 40 m Ø for sti, 50 m NØ for ID59	1061	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, 50 m Ø for ID58, 30 m Ø for åkerhjørne	1062	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, 60 m S for eikerekke	1048	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	A	0,1
Vestre Oppegård, eikehage, 10 m Ø for oldtidsvei	1033	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppegård, eikehage, 30 m Ø for oldtidsvei	1031	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, eikehage, 70 m N for ID31	1032	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppegård, i eikerekke I	1047	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppegård, i eikerekke II	1046	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppegård, i eikerekke III	1045	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppegård, nord i eikerekke	1043	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppegård, nordvestre hjørne av åker, 2 m Ø for ID58	1059	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, nordvestre hjørne av åker, 5 m V for sti/åker	1058	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård, sti mot hundesletta, 30 m V for utedo	1060	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård. Eikelunden I	1041	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård. Eikelunden II	1040	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård. Eikelunden IV	1037	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård. Eikelunden V	1036	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård. Nord i eikelunden	1039	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppegård. På åkerholme 130 m SV for hus	1034	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppgård, i eikerekke IV	1044	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Vestre Oppgård. Eikelunden VI	1035	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Vestre Oppgård. Eikelunden III	1038	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Ødegård skog	118	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	8,39
Øst for Grønmo	93	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	C	20,46
Øst for Oppegård Søndre 1	42	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	C	8,82
Øst for Oppegård Søndre 2	43	Skog	Gammel lauvskog	Gammelt ospeholt	C	2,23
Øst for Oppegård Søndre 3	44	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	6,71
Øst for Oppegård Søndre 4	45	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	0,72
Øst for Oppegård Søndre 5	46	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	1,98
Øst for Oppegård Søndre 6	47	Kulturlandskap	Småbiotoper	Åkerholmer	C	5,16
Øst for Oppegård Søndre 7	48	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	1,38
Øst for Oppegård Østre 1	37	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	B	29,98
Øst for Oppegård Østre 2	38	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	9,68
Øst for Østre Greverud	112	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	B	69,63
Østre Oppegåd, 25 m N for ID72, ved åkerkant	1071	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård 180 m Ø for låve, 5 m N for ID75	1076	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 115 m N for ID72. I NØ-hjørne av åker, 100	1069	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1

m V for E18						
Østre Oppegård, 150 m N for hus, langs åkerkant	1068	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 180 m S for ID72. I SØ-hjørne av åker	1074	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 180 m Ø for låve, 20 m N for ID76	1077	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 180 m Ø for låve, 80 m V for ID72	1075	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Østre Oppegård, 200 m Ø for åkerholme	1072	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Østre Oppegård, 40 m S for 72, i dump ved traktorvei	1073	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 50 m N for ID72. ved åkerkant	1070	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 60 m S for åkerholme I	1082	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 60 m S for åkerholme II	1081	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 80 m S for åkerholme	1083	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, 80 m Ø for vognskjul, 40 m V for ID75	1078	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østre Oppegård, på åkerholme	1080	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	B	0,1
Østre Oppegård, ved vognskjul bak låve	1079	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østredammen, 2 m V for steingjerde, 50 m NV for dam	1054	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østredammen, 20 m N for ID55	1056	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østredammen, 5 m V for steingjerde, 1 m N for ID52	1053	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østredammen, 5 m V for steingjerde, 50 m V for dam	1052	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østredammen, 50 m SV for dammen	1051	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Østredammen, 60 m NV for dam	1055	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,1
Åsen	126	Kulturlandskap	Store gamle trær	Eik	C	0,74
Åsen S	157	Skog	Rik sumpskog		C	10,04
Åsen SV	127	Skog	Gammel lauvskog		C	8,86
Åsen sør	125	Ferskvann/våtmark	Dam	Eldre fisketom dam	B	0,52
Åsen V	156	Skog	Rik edellauvskog		B	12,98

3.5.1 Beskrivelser av alle lokalitetene i Oppegård

1 Delingsdalen

Rik sumpskog – Verdi: **A** Areal : 104,31 daa

Innledning: Delingsdalen ble undersøkt i forbindelse med første runde av verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Den sentrale delen av Delingsdalen ble nærmere undersøkt av Bendiksen (2002) og Bendiksen & Svalastog (1997). Deler av området ble også besøkt i 2003 (Bratli 2005), og det ble befart under MiS-registreringene i 2004 (Reiso). Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i bunnen av Delingsdalen, fra parkeringsplassen ved Ingierstrand og sørover mot Bjørnsrud.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av åpen sump, dels sumpskog med svartor, gran og bjørk. Gjennom dalen passerer en bekk og det er gravd tverrgrøfter til denne. I det åpne partiet finnes bestand av vassrørkvein – *Calamagrostis canescens* og innslag av knappsiv – *Juncus conglomeratus*, klourt – *Lycopus europaeus* og skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*. Den rødlistede arten dronningstarr – *Carex pseudocyperus* (NT) er også registrert. Sumpskogen fortsetter nordover utenfor det opprinnelige verneforslaget i en smalere sone langs bekken helt ned til parkeringsplassen ved Ingierstrand, men nedenfor dammen er lokaliteten ganske påvirket. Ovenfor dammen inngår lind på tørrere mark. Stedvis forekommer sump- og høystaudepreget vegetasjon med arter som bekkekarse – *Cardamine amara*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, hvitbladtistel – *Cirsium helenioides*, sumphaukeskjegg – *Crepis paludosa*, sølvbunke – *Deschampsia cespitosa*, skogsnelle – *Equisetum sylvaticum*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, gaukesyre – *Oxalis acetosella*, hengeving – *Phegopteris connectilis*, krypsleie – *Ranunculus repens*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica*, skogstjerneblom – *Stellaria graminea*, hestehov – *Tussilago farfara* og lokalt større bestand av strutseving – *Matteuccia struthiopteris*. I bunnsjiktet inngår *Conocephalum conicum* – krokodillemoser, palmemoser – *Climacium dendroides*, skyggehusmoser – *Hylocomiastrum umbratum*, spriketormoser – *Sphagnum squarrosum* og krusfagermoser – *Plagiomnium undulatum*. På berg finnes blant annet rottehaler – *Isoetes macrospora*, glansperlemoser – *Lejeunea cavifolia* og putevrinoser – *Tortella tortuosa*. På bergvegger mellom parkeringsplassen ved Ingierstrand og dammen vokser kravfulle moser som flatfellmoser – *Neckera complanata*, krusfellmoser – *N. crispa* og den suboseaniske arten kystkransmoser – *Rhytidiadelphus loreus*. Skogen er i all hovedsak gammel og med en god del død ved. På granlæger er granrustkjuke – *Phellinus ferrugineofuscus* registrert. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN, sterkt truet) inngår i lokaliteten.

Artsmangfold: Den rødlistede arten dronningstarr – *Carex pseudocyperus* (NT) er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning: De søndre 2/3 av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturresevat.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomst av et større område med eldre skog, en god del død ved og forekomst av velutviklet rik sumpskog. Flere kravstore arter er påvist og det er sannsynlig at det forekommer flere rødlistearter knyttet til sumpskogen og til død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

2 Revedalen

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **A** Areal : 62,52 daa

Innledning: Revedalen ble undersøkt i forbindelse med første runde av verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993), hvor lokaliteten ble angitt som et lokalt verneverdig spesialområde. Revedalen ble senere undersøkt av Bendiksen & Svalastog (1997) og

Bendiksen (2002). Området ble også besøkt i 2004 og lokaliteten er forlenget noe lenger mot sør, hvor den avgrenses av hogstflater. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Revedalen ligger vest for Bjørnsrud. Dalen er en mindre paralleldal vest for Delingsdalen, og den er del av et smalt daldrag som strekker seg videre til Torbjørnsrud.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dalbunnen varierer i bredde fra smale passasjer hvor store svartortrær danner en rekke til bredere partier med rik sumpskog. Innenfor lokaliteten finnes ca 100 store svartortrær, samt stor bjørk, gran, osp og alm. Viktige arter er skogburkne – *Athyrium filix-femina*, gråstarr – *Carex canescens*, langstarr – *C. elongata*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, sølvbunke – *Deschampsia cespitosa*, enghumleblom – *Geum rivale*, firblad – *Paris quadrifolia*, krypsleie – *Ranunculus repens*, rød jonsokblom – *Silene dioica*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica*, hestehov – *Tussilago farfara* og vendelrot – *Valeriana sambucifolia*. Videre inngår blant annet bekkeblom – *Caltha palustris*, gulstarr – *Carex flava*, slirestarr – *C. vaginata*, trollurt – *Circaea alpina*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, springfrø – *Impatiens noli-tangere*, klourt – *Lycopus europaeus*, gulldusk – *Lysimachia thyrsiflora*, åkermyste – *Mentha arvensis* og strutseving – *Matteuccia struthiopteris*. I de fuktigste partiene vokser bekkekarse – *Cardamine amara* og skogsivaks – *Scirpus sylvaticus* og lengst i sør myrkongle – *Calla palustris* og mannasøtgras – *Glyceria fluitans*. I bunnsjiktet inngår palmemose – *Climacium dendroides*, skogfagermose – *Plagiomnium affine*, krusfagermose – *P. undulatum*, storkransmose – *Rhytidiadelphus triquetrus*, spriketormose – *Sphagnum squarrosum* og stortujamose – *Thuidium tamariscinum*. Utenfor sumpskogen inngår en sone med lågurtskog med snerprørkvein – *Calamagrostis arundinacea*, fingerstarr – *Carex digitata*, markjordbær – *Fragaria vesca*, skogfiol – *Viola riviniana* og småbregneskog med fugletelg – *Gymnocarpium dryopteris*, gauksyre – *Oxalis acetosella* og hengeving – *Phegopteris connectilis*. Området er ikke grøftet, det finnes noe død gran- og løvvved, og det er lite hogstpåvirket. På loddrette bergvegger vokser den noe kravfulle mosen putevrimose – *Tortella tortuosa* og krusfellmose – *Neckera crispa*. Bendiksen (2002) fant en rik soppflora i området, hvorav mange indikerer næringsrik grunn. Den sjeldne arten drueblå kremle – *Russula azurea* ble registrert. Andre mindre vanlige arter er trevlesoppen *Inocybe fuscicula*, og stor melrødskevessopp *Entoloma lividialbum*. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN, sterkt truet) inngår i lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomst av gammel svartorsumpskog med noe død ved. En truet vegetasjonstype uten spesielle inngrep gjør at lokaliteten vurderes å kunne ha mange interessante arter utover de allerede påviste.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

3 Delingsdalen sørvest

Rik sumpskog – Verdi: **B** Areal : 73,33 daa

Innledning: Området ble undersøkt i forbindelse med første runde av verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993) og av Bendiksen (2002). Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Området består i følge Bendiksen (2002) av østvendte lipartier og flater fra bunnen av Delingsdalen opp til den øvre stien mellom Bjørnsrud og Revedalen. Det er småkupert med koller og forsenkninger og øverst går bekken fra Revedalen i et svingete løp.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik engpreget sumpskog preger de flate partiene. Granskog av varierende størrelse dominerer i liene, mens til dels storvokst svartor vokser i forsumpede partier. Stor bjørk inngår også. Skogen er tidligere plukkhogd. Viktige arter er skogburkne – *Athyrium filix-femina*, hvitbladtistel – *Cirsium helenioides*, myrtistel – *Cirsium palustre*, broddtelg – *Dryopteris carthusiana*, enghumleblom – *Geum rivale*, fugletelg – *Gymnocarpium dryopteris*, skogsalat – *Mycelis muralis*, hengeving – *Phegopteris connectilis*, blåkoll – *Prunella vulgaris*, krypsleie – *Ranunculus repens*, teiebær – *Rubus saxatilis*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica*, hestehov – *Tussilago farfara* og vendelrot – *Valeriana sambucifolia*. Tørrere partier domineres av snerprørkvein – *Calamagrostis arundinacea*. Her vokser også markjordbær – *Fragaria vesca*, blåveis – *Hepatica nobilis*, legeveronika – *Veronica officinalis* og skogfiol – *Viola riviniana*. Prakthinnemose – *Plagiochila asplenoides*, krusfagermose – *Plagiomnium undulatum*, fjærkransmose – *Rhytidiadelphus subpinnatus* og storkransmose – *R. triquetrus* inngår i bunnsjiktet. Mot nord inngår østvendte lier på vestsiden av Delingsdalen. I små søkk og forsenkninger her finnes lågurtskog, rik sumpskog og høystaudevegetasjon. Her er det sannsynligvis foretatt småflatehogst og plukkhogst i skogen. Noe selje og bjørk finnes. Langs bekken øst for hovedstien nordover fra Bjørnsrud er det et svært frodig belte med stor bjørk, jonsokkoll – *Ajuga pyramidalis*, snerprørkvein – *Calamagrostis arundinacea*, fingerstarr – *Carex digitata*, hengeaks – *Melica nutans*, mysegras – *Milium effusum*, gauksyre – *Oxalis acetosella*, storkransmose – *Rhytidiadelphus triquetrus*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica* og skogfiol – *Viola riviniana*. På loddrett bergvegg finnes fine forekomster med krusfellmose – *Neckera crispa* og dessuten svartburkne – *Asplenium trichomanes*. Lokaliteten har en rik storsoppflora med mange næringskrevende arter, bl.a. gul slørsopp – *Cortinarius delibutus*, duftslørsopp – *C. percomis*, purpurslørsopp – *C. purpurascens*, svartrød riske – *Lactarius badiosanguineus*, grammatriske – *L. deterrimus*, svovelriske – *L. scrobiculatus*, stankkremle – *Russula foetens*, skjellpigsopp – *Sarcodon imbricatum*, silkemusserong – *Tricholoma columbetta* og såpemusserong – *T. saponaceum*. Videre ble hjorteslørsopp – *C. hinnuleus* og branngul slørsopp – *C. saniosus* observert. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN, sterkt truet) inngår i lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Den østre halvdel av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av rik sumpskog og til dels gammel skog med delvis rik og frodig vegetasjon. Tidligere hogster, noe yngre skog og lite dødved trekker verdien ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

4 Delingsdalen vest

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: **C** Areal : 5,2 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert under MiS-registreringene. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Delingsdalen, sørøst for Ingierstrand.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter et lite lågurtskogsområde med relativt storvokst granskog og en del gammel bjørk, foruten hassel og osp. Blåveis – *Hepatica nobilis* er registrert. Lokaliteten grenser inn mot den rike skogen i Delingsdalen og dammen ovenfor Ingierstrand.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eldre lågurtpreget granskog. Liten størrelse og manglende artsfunn og elementfunn trekker verdien ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

5 Delingsdalen nordvest

Rik sumpskog – Verdi: C Areal : 16,45 daa

Innledning: Området ble undersøkt i forbindelse med verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Delingsdalen nordvest ble senere undersøkt av Bendiksen & Svalastog (1997) og Bendiksen (2002). Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består i følge Bendiksen (2002) av et langstrakt parti i forlengelsen av Revedalen, parallelt med og vest for selve Delingsdalen. Hovedstien går gjennom og langs området.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I lokaliteten finnes relativt fattig svartorsumpskog med svartor på stylerøtter og sumpvegetasjon omkring, gran og bjørk inngår også. Karakteristiske arter er skogørkvein - Calamagrostis purpurea, bukkeblad - Menyanthes trifoliata, hengeving - Phegopteris connectilis, myrhatt - Potentilla palustris og myrfiol - Viola palustris og i bunnsjiktet grantorvmose - Sphagnum girgensohnii ispedd spriketormose - Sphagnum squarrosum.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er en del påvirket av ferdsel.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av fattig svartorsumpskog og sumpvegetasjon. Mnglende elementer og arter, fattigere vegetasjon og mye ferdsel trekker verdien ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

6 Delingsdalen øst

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: B Areal : 126,9 daa

Innledning: Området ble undersøkt i forbindelse med verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Dette området ble senere undersøkt av Bendiksen & Svalastog (1997) og Bendiksen (2002). Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2002 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for midtre del av Delingsdalen og strekker seg i en tarm nordover til Hvitebjørnåsen. Størstedelen av lokaliteten er vernet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den nordøstlige delen består i følge Bendiksen (2002) av et stort rikskogsparti i slake vestvendte ller og søkk. Det grenser mot fattigere skogspartier i bratt lende ned mot Delingsdalen i vest og Hvitebjørn gård i nordøst. Mot nord fortsetter lokaliteten utenfor det opprinnelige verneforslaget et stykke vest for jordene ved Hvitebjørn. I nordre del inngår en liten svartorsumpskog med rik flora. Området er gammelskogspreget med mye stående og liggende død ved, det aller meste i tidlige nedbrytningsstadier. Grantrærne har varierende størrelse, til dels er trærne store og gamle, det er naturlige glenner og naturlig granforyngelse. I øvre del finnes noe hassel og det finnes store trær av osp, selje, lavlandsbjørk og i søkket opp mot Hvitebjørn sommerek og lind. I lågurtskogskogen vokser bl.a. hvitveis - Anemone nemorosa, snerprørkvein - Calamagrostis arundinacea, fingerstarr - Carex digitata, fugleteig - Gymnocarpium dryopteris, gaukesyre - Oxalis acetosella og skogfiol - Viola riviniana. Blåveis - Hepatica nobilis er ganske vanlig. Småbregneskog inngår også, og i fuktigere partier høystauteskog og sumpskog. Her vokser skogburkne - Athyrium filix-femina, bekkelarse - Cardamine amara, sølvbunke - Deschampsia cespitosa, mjødurt - Filipendula ulmaria, krypsoleie - Ranunculus repens, skogsivaks - Scirpus sylvaticus, skogsvinerot - Stachys sylvatica og hestehov - Tussilago farfara. I bunnsjiktet inngår storkransemose - Rhytidadelphus triquetrus og stortujamose - Thuidium tamariscinum. Området har i følge Bendiksen (2002) rik soppflora med krevede arter som praktslørsopp - Cortinarius cumatilis (NT), klumpslørsopp - C. varius, duftvokssopp - Hygrophorus agathosmus, gulbrun vokssopp - H. discoideus, lillastilket trevlesopp - Inocybe cinnamomea, fageriske - Lactarius hyssiginus, skjellpiggsopp - Sarcodon imbricatum og fingerfrynse - Telephora palmata, dessuten en stor forekomst med ametystopp - Laccaria amethystina som representerer en utpostlokalitet for en kysttilknyttet art som sjelden opptrer i rene barskoger. Lenger sør i lokaliteten inngår også vestvendte ller på østsida av og nær bunnen av Delingsdalen. I en bred bekkesone i kløfta opp mot Hvitebjørn finnes relativt næringskrevende sumpvegetasjon med skogburkne - Athyrium filix-femina, maigull - Chrysosplenium alternifolium, mjødurt - Filipendula ulmaria, krypsoleie - Ranunculus repens og skogstjerneblom - Stellaria nemorum. Granskogen her er gammel, men tidligere plukkhogd, med mye læger av liten til midlere nedbrytningsgrad. Småbregneskog tar over oppover i liene. Gammel granskog med lågurtvegetasjon inngår i liene lenger sør. Her vokser næringskrevende sopparter som klumpslørsopp - Cortinarius varius, duftbrunpig - Hydnellum suaveolens og den relativt sjeldne barskogsformen av maisslørsopp - C. olidus. Traktsoppen Clitocybe strigosa er også funnet. Den er sjelden og tidligere ikke kjent fra andre steder østafjells. Helt i sør inngår et mindre område i slak helling øst for Delingsdalen. Balle (1995) kartla området som høystauteskog, i tillegg finnes noe lågurtskog. Vegetasjonen er svært frodig, og skogen er flersjiktet med mange gamle grantrær og relativt mye død ved. Flere store svartortrær finnes også. Hvitbladtistel - Cirsium helenioides forekommer rikelig, ellers finnes skogburkne - Athyrium filix-femina, snerprørkvein - Calamagrostis arundinacea, bekkelarse - Cardamine amara, maigull - Chrysosplenium alternifolium, mjødurt - Filipendula ulmaria, åkermynthe - Mentha arvensis, gaukesyre - Oxalis acetosella, krypsoleie - Ranunculus repens, teiebær - Rubus saxatilis, brunrot - Scrophularia nodosa, skogsvinerot - Stachys sylvatica og stortujamose - Thuidium tamariscinum. Av storsopper finnes svovelriske - Lactarius scrobiculatus og skjellpiggsopp - Sarcodon imbricatum. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN, sterkt truet) inngår i lokaliteten.

Artsmangfold: Praktslørsopp (NT) er påvist.

Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet et større område med noe rikere, gammel granskog med en del død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

7 Delingsdalen nord

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: B Areal : 13,53 daa

Innledning: Området ble registrert under MiS-registreringene. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for midtre del av Delingsdalen, på østsiden av krafledning.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I lokaliteten inngår eldre ensjiktet granskog i sør med en del død ved som går over til fattigere gran-bjørkesump nordover, med noe innslag av svartor. Sumpen domineres av gran og bjørk og skogen er relativt ung.

Bruk, tilstand og påvirkning: Den søndre tuppen av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet noe fattig sump med høyt vannspeil, stort løvinnslag og endel død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

8 Bjørnsrud

Naturbeitemark – Verdi: **C** Areal : 23,73 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter engene rundt det nedlagte småbruket Bjørnsrud og gjengroende kulturmark i overgangen til rike skogtyper i Delingsdalen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Omkring engene er det rikelig med store løvtrær som osp, selje og bjørk i kulturpåvirket skog. Stedvis er det mye hassel. De løvrike arealene antas å være av stor betydning for fuglelivet. Kulturmarka er ikke i bruk, men representerer en naturtype det nå er svært lite igjen av i kommunen.

Verdivurdering: Kulturmarka er ikke i bruk, men representerer en naturtype det nå er svært lite igjen av i kommunen, og lokaliteten vurderes derfor som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: For å hindre videre gjengroing må engpartiene slås ekstensivt og løvoppslag bør fjernes.

9 Bjørnsrud øst

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **B** Areal : 52,04 daa

Innledning: Området ble undersøkt i forbindelse med verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Delingsdalen nordvest ble senere undersøkt av Bendiksen & Svalastog (1997) og Bendiksen (2002). Det inngår også i MiS-registreringene 2004. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør i følge Bendiksen (2002) en sørlig og trang forlengelse av Delingsdalen øst for Bjørnsrud mot grusvei parallelt med motorveien. Lokaliteten grenser her helt inn til veiskjæring langs motorveien. Etter befaring i 2004 ble lokaliteten forlenget langs bekken opp mot jordene ved Bjørnsrud.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Balle (1995) kartla området som gråor-heggeskog, men skogen klassifiseres i følge Bendiksen best som rik svartorsumpskog, karakterisert blant annet av stor svartor. Her finnes velutviklete bestand med strutseving - *Matteuccia struthiopteris*, foruten hvitbladtistel - *Cirsium helenioides* og krypsleie - *Ranunculus repens*. Ellers finnes sløke - *Angelica sylvestris*, skogburkne - *Athyrium filix-femina*, bekkekarse - *Cardamine amara*, engsnelle - *Equisetum pratense*, mjørdurt - *Filipendula ulmaria*, hengeving - *Phegopteris connectilis*, skogstjerneblom - *Stellaria nemorum* og skogsvinerot - *Stachys sylvatica*. I en smal sone i tilstøtende ller finnes trollbær - *Actaea spicata*, snerprørkvein - *Calamagrostis arundinacea*, hassel - *Corylus avellana* og stor osp - *Populus tremula*. Etter befaring i 2004 ble lokaliteten forlenget langs bekken opp mot jordene ved Bjørnsrud, hvor svartorskogen fortsetter i en sone langs bekken. Her er det stor svartor og rik flora med sumpskogsarter som bekkekarse - *Cardamine amara*, langstarr - *Carex elongata*, mjørdurt - *Filipendula ulmaria*, springfrø - *Imatiens noli-tangere*, strutseving - *Matteuccia struthiopteris* og krypsleie - *Ranunculus repens*. Mosefloraen er også rik med blant annet putevrimose - *Tortella tortuosa* på berg. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN) inngår i lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Hoveddelen av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av rik sumpskog med eldre svartor.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

10 Dam sørøst for Ingierstrand

Dam – Verdi: **B** Areal : ,88 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en liten oppdemmet dam i bekken ovenfor Ingierstrand. Lokaliteten ligger i tilknytning til lokalitet 1- Delingsdalen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten oppdemmet dam. Ved besøk i 2004 ble sterile planter, trolig dronningstarr, observert. I kanten finnes også arter som vassgro - *Alisma plantago-aquatica*, svartor - *Alnus glutinosa*, sennegrass - *Carex vesicaria*, hvitbladtistel - *Cirsium helenioides*, mjørdurt - *Filipendula ulmaria*, lyssiv - *Juncus effusus*, strutseving - *Matteuccia struthiopteris*, krypsleie - *Ranunculus repens*, skogsvinerot - *Stachys sylvatica*, hestehov - *Tussilago farfara* og vendelrot - *Valeriana sambucifolia*. Dammen omkranses av fattige berg og lågurtskog.

Artsmangfold: I kanten av dammen er den rødlistede arten dronningstarr - *Carex pseudocyperus* (NT) funnet.

Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er oppdemmet.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes under noe tvil som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en nær truet art

Skjøtsel og hensyn:

11 Prosted Ø

Rik edellauvskog – Verdi: **B** Areal : 20,49 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av Jon T. Kleppslund i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av rik edelløvskog i smal kløft på østsiden av veien ved Prosted.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rik edelløvskog i smal kløft og en smal sone med rik sumpskog langs bekken i bunnen av kløfta. Foruten furu og gran inngår osp, hengebjørk, vanlig bjørk, svartor, hassel, alm, spisslønn og lind. Skogen er frodig og artsrik, men påvirket av ferdsl og hogst. Det er lite død ved, men rikelig med moserike bergvegger og blokker. I skrentene i overgang mot fattige furuskogstyper inngår en del lind. I lokaliteten finnes artsrik flora med blant annet trollbær - *Actaea spicata*, hvitveis - *Anemone nemorosa*, snørørkvein - *Calamagrostis arundinacea*, bekkeblom - *Caltha palustris*, fingerstarr - *Carex digitata*, liljekonvall - *Convallaria majalis*, tysbast - *Daphne mezereum*, breiflangre - *Epipactis helleborine*, enghumleblom - *Geum rivale*, mjødurt - *Filipendula ulmaria*, markjordbær - *Fragaria vesca*, mye blåveis - *Hepatica nobilis*, knollerte knapp - *Lathyrus linifolius*, leddved - *Lonicera xylosteum*, hengeaks - *Melica nutans*, gaukesyre - *Oxalis acetosella*, firblad - *Paris quadrifolia*, hengeving - *Phegopteris connectilis*, kantkonvall - *Polygonatum odoratum*, krypsoleie - *Ranunculus repens*, skogsvinerot - *Stachys sylvatica*, ballblom - *Trollius europaeus*, teiebær - *Rubus saxatilis*, hestehov - *Tussilago farfara*, tveskjeggveronika - *Veronica chamaedrys*, legeveronika - *V. officinalis*, korsved - *Viburnum opulus*, skogvikke - *Vicia sylvatica* og skogfiol - *Viola riviniana*. På berg vokser svartburkne - *Asplenium trichomanes* og den noe basekrevende arten putevrinose - *Tortella tortuosa*. Videre ble kravfulle arter som rottehaemose - *Isoetecium alopecuroides*, krusfellmose - *Neckera crispa* og den suboseaniske arten kystkransmose - *Rhytidadelphus loreus* funnet.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er en del påvirket av ferdsl.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes under tvil som lokalt viktig (C-verdi), men har potensial til å utvikles til en viktig lokalitet. Frodig og rik lokalitet, men noe ung skog og en del hogstpåvirkning, samt manglende funn av rødlistearter og viktige elementer er årsaken til vurderingen.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte, men granforyngelse kan tas ut.

12 Bekkenstenfeltet Ø

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: B Areal : 19,3 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Jon T. Kleppslund under MiS-registreringene i 2004. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Bekkenstenfeltet

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rik svartorsumpskog langs fuktdrag. Skogen er hogd, grøfta og tilplanta med gran, men noe stor svartor står igjen.

Artsmangfold: Den rødlistede arten dronningstarr - *Carex pseudocyperus* (NT) og slakkstarr er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er sterkt påvirket, skogen er hogd, grøfta og tilplantet med gran. Markdekket var ikke ødelagt ved befringen, så det er mulig å restaurere biotopen.

Verdivurdering: Lokaliteten ville normalt ikke blitt tatt med, men får en viktig verdi (B-verdi), da lokaliteten er meget rik og har forekomst av dronningstarr og slakkstarr. Verdien forutsetter at skogen skjøttes med tanke på tilbakeføring til svartorsumpskog.

Skjøtsel og hensyn: Grøfter må tettes igjen, mest mulig gran må fjernes, og skogen tilbakeføres til en svartorsumpskog.

13 Bekkenstenfeltet

Hagemark – Bjørkehage Verdi: B Areal : 64,23 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av Jon T. Kleppslund i forbindelse med MiS-kartlegging i 2004. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Bekkensten og ned mot Ingierstrandveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av hagemarkpreget løvskog i flate partier øst for Bekkensten.

Lågurtskog inngår i skrentene rundt det flate partiet, og mot nord ned mot Ingierstrandveien. Her går skogen over i lågurtskog med sumpskogsfragmenter langs bekkesig og i småkløfter, og det finnes en del steinblokker og bergvegger. I dette partiet finnes blant annet stor, gammel og hul lind. Ellers preges skogen av storvokst bjørk, til dels stor osp, noe eik, gran, hassel, alm og ask. Mot sørøst er det en god del hassel, og stedvis er det oppslag av gran. Skogen har trolig vært beitet tidligere. Floraen er artsrik, urte- og grasdominert, med arter som trollbær - *Actaea spicata*, jonsokkoll - *Ajuga pyramidalis*, hvitveis - *Anemone nemorosa*, gulaks - *Anthoxanthum odoratum*, lakrismjelt - *Astragalus glycyphyllos*, fingerstarr - *Carex digitata*, bleikstarr - *C. pallescens*, hvitbladtistel - *Cirsium helenioides*, markjordbær - *Fragaria vesca*, hvitmaure - *Galium boreale*, enghumleblom - *Geum rivale*, fugleteig - *Gymnocarpium dryopteris*, blåveis - *Hepatica nobilis*, knollerte knapp - *Lathyrus linifolius*, hengeaks - *Melica nutans*, myskegras - *Milium effusum*, skogsalat - *Mycelis muralis*, gaukesyre - *Oxalis acetosella*, vanlig nattfiol - *Platanthera bifolia*, skogsvinerot - *Stachys sylvatica*, skogkløver - *Trifolium medium*, tveskjeggveronika - *Veronica chamaedrys*, korsved - *Viburnum opulus*, skogvikke - *Vicia sylvatica* og skogfiol - *Viola riviniana*. På berg vokser svartburkne - *Asplenium trichomanes* og på gammel lind den suboseaniske laven blyhinnelev - *Leptogium cyanescens* og krypsilkeose - *Homalothecium sericeum*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av lokaliteten bærer tydelig preg av å være tidligere beitet.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet eldre hagemark med forekomst av en del gamle edelløvtrær.

Forekomster av elementer som død ved og hule edelløvtrær trekker også verdien opp.

Skjøtsel og hensyn: Foryngelse av gran bør fjernes. Gjeninnføring av begrenset beite eller slått vil være bra.

14 Oredalen

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: C Areal : 61,94 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Langs bekken gjennom Oredalen, helt ned til idrettsbanen finnes rik svartorsumpskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen er hogd stort sett i hele området, men et mindre området mot vest er intakt. Langs bekken er en god del svartor spart, slik at det fortsatt er en del større trær igjen. Ellers preges skogbildet av mye tett, ung svartor, noe hegg og i dalsidene en god del ung bjørk. Det er lite død ved, men noe finnes i den vestre delen. Av interessante arter kan nevnes langstarr – *Carex elongata* og mye klourt – *Lycopus europaeus*. Bunnslaget er rikt med kravfulle mosearter. Ellers finnes blant annet vassgro - *Alisma plantago-aquatica*, bekkedarse – *Cardamine amara*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, mannasøtgras – *Glyceria fluitans*, fredløs – *Lysimachia vulgaris*, åkermynthe – *Mentha arvensis*, krypsoleie – *Ranunculus repens*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*, slyngsøtvier – *Solanum dulcamara* og hestehov – *Tussilago farfara*. Spredt finnes bratte, beskyttede bergvegger hvor bl.a. krusfellmose – *Neckera crispa* og putevrimose – *Tortella tortuosa* er registrert. Små fragmenter av skogen vil kunne klassifiseres som svartorstrandskog, en vegetasjonstype som anses som sterkt truet (EN), og rik sumpskog inngår også (også sterkt truet).

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er hogd stort sett i hele området, men et mindre området mot vest er intakt. Under høyspentledningen ved idrettsbanen er også skogen hogd.

Verdivurdering: Selv om lokaliteten er hogd er den vurdert å være lokalt viktig (C-verdi), fordi en del stor svartor og en rik flora med regionalt sjeldne arter fortsatt finnes. Opprinnelig har skogen hatt større verdi. På sikt vil trolig verdien øke ettersom den vokser til, hvis man forsøker å gjenskape den opprinnelige løvskogen.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Oppslag av gran bør fjernes

.....

15 Dam ved Skjervika

Dam – Verdi: **B** Areal : 6,29 daa

Innledning: Lokaliteten omtales av Strand (1994, 1996) og er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dette er en dam ved Skjervika, avsnørt fra Gjersjøen av hovedveien, som er lagt på fylling mellom dammen og Gjersjøen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omtales av Strand (1994, 1996), men uten funn av amfibier. I dammen finnes rik sumpvegetasjon med myrkongle - *Calla palustris*, mye sverdlilje - *Iris pseudacorus*, elveneselle - *Equisetum fluvatile*, andemat - *Lemna minor* og bukkeblad - *Menyanthes trifoliata*.

Artsmangfold: Det foreligger gamle funn av to rødlistede moser, muddermose - *Physcomitrella patens* (NT) og krystallgaffelmose - *Riccia cavernosa* (VU) fra Skjervika, mest sannsynlig i eller rett ved denne lokaliteten. Status for disse er ukjent.

Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er kunstig avsnørt fra Gjersjøen gjennom en fylling.

Verdivurdering: Grunnet manglende påviselige funn av interessante arter og en god del påvirkning vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn:

.....

16 Nydammen sør

Rik sumpskog – Verdi: **B** Areal : 59 daa

Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Wesenberg (1996) og ble besøkt av Sigve Reiso i forbindelse med MiS-registreringer i 2004. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dette er en artsrik sumpskogslokalitet med tilstøtende østvendt skogsløp sør for Nydammen like vest for E6 og ca 500 m vest for Gjersjø bru.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Wesenberg fant flere sjeldne karplanter og hevder at lokaliteten hører til de botanisk mest viktige i Oppegård. Viktige arter er trollurt - *Circaea alpina*, langstarr - *Carex elongata* og storrap - *Poa remota*, som alle finnes i store mengder. Ved sørenden finnes den sjeldne arten nubbestarr - *Carex loliacea* og ved utløpet av bekken i Gjersjøelva den vel så sjeldne slakkstarr - *Carex remota*. I tillegg finnes arter som myrkongle - *Calla palustris*, bekkedarse - *Cardamine amara*, sennegrass - *Carex vesicaria*, maigull - *Chrysosplenium alternifolium*, mjødurt - *Filipendula ulmaria*, springfrø - *Impatiens noli-tangere*, sverdlilje - *Iris pseudacorus*, hanekam - *Lychnis flos-cuculi*, klourt - *Lycopus europaeus*, strutseving - *Matteuccia struthiopteris*, åkermynthe - *Mentha arvensis*, maurarve - *Moehringia trinervia*, firblad - *Paris quadrifolia*, grøflesoleie - *Ranunculus flammula*, skjoldbærer - *Scutellaria galericulata*, skogsvinerot - *Stachys sylvatica*, rustjerneblom - *Stellaria longifolia*, skogstjerneblom - *S. nemorum* og bekkeveronika - *Veronica beccabunga*. En del store svartor står igjen. Lokaliteten var fortsatt sterkt hogstpåvirket ved besøk i 2004, men alle de sjeldne artene fantes fortsatt.

Artsmangfold: Granrustkjuke – *Phellinus ferrugineofuscus* og rynkeskinn – *Phlebia centrifuga* (NT) ble påvist sammen med krusfellmose – *Neckera crispa* i 2004. Slakkstarr og nubbestarr ble påvist i 1996.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er hogd, og den er sterkt påvirket av kjørespor, grøfter og hogstavlfall.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en artsrik sumpskog med forekomster av flere interessante karplanter. Stor hogstpåvirkning med kjørespor og grøfter gjør at verdien ikke blir høyere.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør restaureres til opprinnelig sumpskog, trolig blandingsskog med or og gran, muligens også ask. Den opprinnelige hydrologien bør gjenskapes. Ellers anbefales fri utvikling.

.....

17 Bålerud

Parklandskap – Parker Verdi: **A** Areal : 15,04 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bålerud gård, vest for Oppegård kirke på nordsiden av veien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I hagen på Bålerud gård står det flere svært store og gamle eiketrær og noen store osp- og asketrær i et parklandskap. Ett eller flere av eiketrærne kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik" og bør derfor inventeres med tanke på hulteter, død ved og insektpotensial. Også de grove asketrærne

Artsmangfold: På trærne vokser det flere svært sjeldne lavararter, blant annet skorpelaven *Caloplaca lucifuga* (VU), som her ble funnet for første gang i Norge (Bratli & Haugan 1997). Den vokser på store, gamle eiketrær et fåtall steder i Sørøst-Norge. Også den sjeldne sterkt eiketilknyttede skorpelaven stautnål – *Chaenotheca phaeocephala* (VU) finnes i hagen. Karakteristiske arter for gammel eik er også *Amandinea punctata*, *Arthonia vinosa*, rødhodenål – *Calicium lichenoides* og *Pertusaria flavida*, hvorav særlig sistnevnte er sjelden. På ask (NT) ble regionalt sjeldne arter som *Acrocordia gemmata* og bleikdoggnål – *Sclerophora nivea* (NT) funnet, sammen med blant annet allélav – *Anaptychia ciliaris* og *Opegrapha rufescens*, alle arter forbundet med rikbarkstrær i kulturlandskapet. Området er også viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998).

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjøttes parkmessig, ved beskæring og fjerning av død ved. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår som en sentral og viktig del av det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av forekomst av meget grove eike- og asketrær med forekomst av flere rødlistede lavararter. Potensialet for interessante insekter knyttet til trærne vurderes som stor.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av med mindre det er helt nødvendig og nedfallen død ved bør få bli liggende eller flyttes til en egnet lokalitet. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Eventuelle hulheter må ikke tettes igjen.

.....

18 Oppegård kirke

Parklandskap – Kirkegårder Verdi: A Areal : 8,74 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rundt Oppegård kirke er det en parkpreget lund med store edelløvtrær, ask, spisslønn og eik. Fire av trærne er vurdert som utvalgt naturtype “hul eik”. En svært stor, gammel eik står utenfor kirken og dette treet måler 455 cm i omkrets, har en liten, men tydelig hulhet og begynnende grov sprekkedebark. Treet har vid krone, men det er usikkert om det er død ved i kronen og på stammen. De andre eikene måler 330, 330, og 210 cm i omkrets. Ingen har synlige hulheter, men de to groveste har noe grov sprekkedebark.

Artsmangfold: På trærne finnes en del rikbarksarter, blant annet skjellglye – *Collema flaccidum*, bleiktjafs, *Evernia prunastris*, ekormose – *Leucodon sciurioides*, broddtråkmose – *Pseudoleskeella nervosa*, barkragg – *Ramalina farinacea*, askeragg – *R. fraxinea* og messinglav – *Xanthoria parietina*. I gressplen vokser gullstjerne – *Gagea lutea* og moskusurt – *Adoxa moschatellina* vokser på en grunn knaus. På eika vokser blant annet skorpelavene *Amandinea punctata* og grønnsotnål – *Calicium viride*, begge typiske for store ruvende eiker i kulturlandskapet. Lokaliteten er også verdifull for fugl (Dale et al. 1998). Lokaliteten har et godt potensial for interessante trelevende insekter knyttet til grove edelløvtrær.

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjøttes parkmessig, ved beskæring og fjerning av skadete og døde trær og grener, noe som ikke gagnar mangfoldet knyttet til død ved. Deler av hulheter i den største eika er gjenfylt med sement og treet er bardunert. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomst av flere grove eiker hvorav en meget grov og hul eik. En nærmere undersøkelse av insekter, lav og sopp knyttet til treet vil være verdifullt for å få en sikrere verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Eiketruene bør holdes noe fristilt. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av og nedfallen død ved bør få bli liggende eller flyttes til en egnet lokalitet i nærheten. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Hulheter må ikke tettes igjen.

.....

19 Solheim - Oppegård Vestre

Rik edellauskog – Verdi: A Areal : 321,31 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 og Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Nordover fra Oppegård kirke til jordene på Oppegård Vestre og Østre, østover ved Grønmo, rundt Solheim og videre nordover rundt Oppegård Vestre og Østre finnes et stort område med rik edelløvsog. Grensen er trukket noe omtrentlig mot nord, hvor skogen etterhvert går over mot yngre, nå løvdominert, hogd skog og fattigere furu- og granskogsmiljøer.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Opprinnelig har dette vært hagemark, men kulturmarka er nå i sterk gjengroing hvor særlig ung ask stedvis danner tette bestand. Store deler av skogen inneholder stor og gammel eik, enkelte trær er svært gamle. Nærmere 100 eiketruer kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Ellers inngår en god del ask, foruten hassel, stor einer, spisslønn og lind. Holt med stor osp finnes også, blant annet like nord for Bekkenstenveien. Store gamle edelløvtrær, blant annet lind og ask, finnes spredt over det meste av lokaliteten. Blant annet står det en stor ask ved barnehagen. Gammel bjørk finnes også. På skrinne koller er furu vanlig, enkelte trær med meget store dimensjoner. Stedvis er det tette bestand med gran. Om våren ses tepper av blåveis – *Hepatica nobilis* i skogen. Den regionalt sjeldne arten moskusurt – *Adoxa moschatellina* finnes mellom kirken og Bekkenstenveien. Litt senere dominerer tepper av hvitveis – *Anemone nemoralis* og marianøkleblom – *Primula veris* har spredte populasjoner. Hele området er opprinnelig kulturmark, men gjengroingen er kommet såpass langt at det nå mer har karakter av skog. Særlig er det mye tett oppslag av ung ask. Opprinnelig hagemark med stor eik preger det meste av området. Stedvis finnes typen på skrinne mark på koller, gjerne med innblanding av furu. Her er bergknauser vanlig og floraen er relativt fattig med arter som tjæreblom – *Lychnis viscaria* og smørbukk – *Sedum telephium*. Kantkonvall – *Polygonatum odoratum* inngår også på slike steder. På litt friskere mark er floraen rikere med blant annet fingerstarr – *Carex digitata*, liljekonvall – *Convallaria majalis*, markjordbær – *Fragaria vesca*, knollerteknapp – *Lathyrus linifolius*, skogsalat – *Mycelis muralis*, gaukesyre – *Oxalis acetosella*, vanlig nattfiol – *Platanthera bifolia*, teiebær – *Rubus saxatilis*, tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*, legeveronika – *V. officinalis* og skogfiol – *Viola riviniana*. Innslaget av kulturmarksarter er tydelig over hele området, kanskje særlig nord for gårdene, i åkerkanter og åpninger i skogen. Blant annet er gulmaure – *Galium verum*, flekkgrisor – *Hypochoeris maculata* og smalkjempe – *Plantago lanceolata* registrert. Her finnes for det meste ung, frodig edelløvsog som er i relativt tidlig suksjonsfase fra opprinnelig beitemark og åker. Stedvis finnes også sumppreget vegetasjon langs bekkesig. Disse områdene har mindre verdi, men binder sammen partier med hagemarkpregete skog med gammel eik. Flere steder finnes kantsamfunn mot åker, blant annet med den regionalt

sjeldne arten krusfrø – *Selinum carvifolia*. Eikeildkjuke – *Phellinus robustus* er registrert. På eiketrærne finnes ellers eikemusling – *Daedalea quercina*, eikebroddsopp - *Hymenochaete rubiginosa* og eikebarksopp – *Peniophora quercina*. Den truede arten ospepig – *Radulodon erikssonii* (VU) er registrert på død eik. Særlig i åpne partier og skogkanter er det registrert rikbarksarter på trærne, for eksempel ekornmose – *Leucodon sciuroides* og gulbånd – *Metzgeria furcata*. Inne i lokaliteten finnes også en liten dam med liten salamander – *Triturus vulgaris* (lokalitet 25). Området er også viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998).

Artsmangfold: Ospepig – *Radulodon erikssonii* (VU) er registrert på død eik sammen med eikeildkjuke.

Bruk, tilstand og påvirkning: Opprinnelig har dette vært hagemark, men kulturmarka er nå i sterk gjengroing hvor særlig ung ask stedvis danner tette bestand. Med unntak av de nordligste delene ligger lokaliteten innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår som en sentral og viktig del av det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. Det er mange verdifulle kulturminner, blant annet godt bevarte steingjerder, og den gamle kongeveien går gjennom området.

Verdivurdering: Et stort og variert område med mye verdifull kulturmark, mange rødlistearter og enkelte truede naturtyper som totalt sett vurderes som svært viktig (A-verdi). Skjøtselstiltak må likevel igangsettes for å unngå en degradering av verdiene.

Skjøtsel og hensyn: Restaurering og vedvarende skjøtsel er nødvendig for å gjenskape den opprinnelige, lysåpne hagemarken. Slått, forsiktig beite og manuell rydding av kratt og løvoppslag må vurderes brukt i de sentrale delene av lokaliteten. Eiketrærne må få utvikle seg fritt, og død ved må få stå/lige i fred. Der gjengroingen har kommet så langt at edelløvskog dominerer, bør naturen overlates til fri utvikling.

.....

20 Solheim vest

Rik sumpskog – Verdi: **B** Areal : 18,64 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en smal sone med rik svartor-askskog langs bekk vest for Solheim og nordover mot idrettsplassen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen er relativt tett og ung, og er et suksesjonsstadium etter tidligere beita områder. Svartor, ask, hegg og gran preger tresjiktet, særlig er det mye ung ask, men også eldre asketrær finnes. Under en kraftlinje er flere store trær nylig hogd. Vegetasjonen er svært frodig langs bekken med arter som trollbær – *Actaea spicata*, storklokke – *Campanula latifolia*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, sumphaukeskjegg – *Crepis paludosa*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, springfrø - *Impatiens noli-tangere*, strutseving – *Matteuccia struthiopteris*, firblad – *Paris quadrifolia*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica*, skogstjerneblom – *Stellaria nemorum*, vendelrot – *Valeriana sambucifolia* og korsved – *Viburnum opulus*. På ask vokser blant annet de kravfulle mosene glansmose – *Homalia trichomanes* og krypsilkemose – *Homalothecium sericeum*. Området er også viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998), og grenser inn mot hagemarkpreget eikeskog.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området utgjør tidligere beitemark. En kraftlinje krysser lokaliteten i sør. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår som en viktig del av det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en større rik sumpskog. Mye ung skog, mangel på kontinuitet i tresjiktet og mye askeoppslag trekker verdien ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

21 Nord for Bålerud

Rik edellauvskog – Verdi: **B** Areal : 46,75 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005 og deler av den er reinventert av Terje Blindheim og Anders Thylen, BioFokus, i 2011. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er noe endret av BioFokus høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten strekker seg fra Bålerud nordover i retning idrettsplassen og vestover mot Rødstenveien. Naturgrunnlaget er rikt og det meste av området er tidligere kulturpåvirket gjennom beite.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter ulike edelløvskogstyper, vesentlig alm-lindeskog og hagemarkpreget lågurteikeskog. På skrinne koller inngår også noe skrinne eikeskog og lavfurskog. Eik dominerer sammen med spisslønn, hassel, lind og ask, og det inngår en del gran. Store, gamle eike- og asketrær inngår. Området er opprinnelig kulturmark med hagemark og beiter, men preges nå av gjenvoksing mange steder. Ved Bålerud går skogen over til parkpreget tun og hager med mye stor eik. Området har artsrik flora med blåveis og marianøkleblom. Ellers finnes blant annet trollbær, fagerklokke, fingerstarr, liljekonvall, hvitmaure, kantkonvall, kratthiol og skoghliol. Området er også viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998), og inngår som en viktig del i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. I kanten mellom skog og åpen mark finnes også en liten dam, som muligens kan ha betydning for amfibier.

Artsmangfold: Området er potensielt interessant for insekter, sopp og lav som er knyttet til gammel eik og andre treslag dersom de er gamle og aller helst utvikler hulheter. Det er også et visst potensial for markboende sopp knyttet til de rikeste partiene. På eiketrær i den sørvestlige delen av området ble det funnet eikehårskål (VU 2010) på eik som målet 40-60 cm i diameter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Etter opphør av beite har området vært under gjengroing de siste tiårene.

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på gamle og grove eiker.

Verdivurdering: Et relativt stort område med rik edelløvskog og eikehagemark og med en storvokst eik og ask, samt noe dokumentert arts mangfold tilsvarer minst B-verdi. Mangel på riktig store og gamle trær, samt begrenset med artsfunn gjør at verdien ikke settes høyere.

Skjøtsel og hensyn: Delene med gammel eikehagemark kan evt åpnes noe. Rydding bør imidlertid gjøres forsiktig og i etapper over flere år, for å unngå løvoppslag. Gamle trær må spares. Videre må det ryddes jevnlig, alternativt innføres dyrebeite.

.....

22 Sør for Oppegård Vestre

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : 2,299999999999998 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en åkerholme beliggende sør for Oppegård Vestre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med stor, gammel eik, en del mindre eiketrær, mye ung ask, hassel og einer. Det største eiketreet måler 315 cm i omkrets, har en vid krone med noe døde grener. Treet har vært noe beskåret, har lav mosedekning, små barksprekker og ingen synlige hulheter. Engarter som rødknapp – *Knautia arvensis* finnes også, men floraen forøvrig preges av nitrofile ugras.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten har isolert sett relativt lav verdi og vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en gammel eik.

Skjøtsel og hensyn: De store eiketrærne kan fristilles noe bedre. Eik og andre store edelløvtrær må ellers overlates til fri utvikling og all dø ved må få stå/ligge i fred.

23 Ved Oppegård Vestre

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 2,450000000000002 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Oppegård Østre og Vestre, noe sørvest for Oppegård Vestre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med flere store, gamle eiketrær med sprekkebark, ask og en del mindre eiketrær. Fem eiketrær på 270, 330, 340, 350 og 350 cm i omkrets står innenfor lokaliteten. De to smaleste trærne har tydelige hulheter ved basis og de tre største har noe grov sprekkebark. Det er uvisst om det der mye død ved i kronen og om det finnes dødvedpartier på stammene, men det er sannsynlig at det er noe, til tross for beskjæringer. Det er lite mosedekke på stammene. Undervegetasjonen har eng/kantpreg med arter som ryllik – *Achillea millefolium*, firkantperikum – *Hypericum maculatum*, rødknapp – *Knautia arvensis*, knollerteknapp – *Lathyrus linifolius* og skogkløver – *Trifolium medium*, men floraen preges også av nitrofile ugras.

Bruk, tilstand og påvirkning: Alle trærne har vært beskåret i senere tid, noe som er uheldig for arter knyttet til død eikeved. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av forekomst av flere grove eiketrær, hvorav to har hulheter.

Lokaliteten vurderes ikke høyere på grunn av beskjæringer av døde grener, gjengroing og manglende artsfunn.

Skjøtsel og hensyn: Tett oppslag av ung skog og kratt skygger ut de store eiketrærne, som nå er i ferd med å fristilles. Eik og andre store edelløvtrær må ellers overlates til fri utvikling og all dø ved må få stå/ligge i fred.

24 Ved Oppegård Østre

Dam – Gårdsdam Verdi: **B** Areal : ,52 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Sandaas (2011) undersøkte dammen med tanke på amfibier. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten åkerdam rett vest for Roald Amundsens vei, ved tunet på Oppegård østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes en pen forekomst med den sjeldne arten storandemat - *Spirodela polyrrhiza*. Ellers forekommer lyssiv – *Juncus effusus*, andemat – *Lemna minor*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus* og dunkjevle – *Typha latifolia*.

Artsmangfold: Småsalamander (NT) og storandemat er påvist på lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av gårdsdam med småsalamander og storandemat.

Skjøtsel og hensyn:

25 Skogsdam sør for Østre Oppegård

Dam – Verdi: **A** Areal : ,23 daa

Innledning: Strand (1994, 1996) og Sandaas (2011) kartla amfibier i dammen. Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skogkanten sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdammen omtales av Strand (1994, 1996), som angir forekomst av småsalamander *Triturus vulgaris* (NT), og Sandaas (2011) som også angir storsalamander *T. cristatus* (VU) og buttsnutefrosk.

Artsmangfold: Småsalamander (NT) og storsalamander (VU) er registrert i dammen.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av at dammen innehar begge salamanderartene.

Skjøtsel og hensyn:

26 Oppegård Østre

Store gamle trær – Ask Verdi: **C** Areal : 3,37 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter deler av tunet på Oppegård østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes flere store asketrær og et lite parti langs veien med tørreng/kantkrattvegetasjon. Her vokser arter som dunhavre – *Avenula pubescens*, hvitmaure – *Galium boreale*, gulmaure – *G. verum*, skogkløver – *Trifolium medium* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*. Det er også noe alm og spisslønn i lokaliteten.

Artsmangfold: Stor ask (NT) og noe alm (NT) forekommer.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. Trærne skjottes sannsynligvis parkmessig, med beskæring av grener.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor ask og artsrik veikant. Trærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på eng- og veikantpartier. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten.

.....

27 Oppegård Østre nord 1

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: C Areal : 3,75 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en skogkledd parti mellom åker og vei i midtre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med tørrbakke- og krattvegetasjon og en del ask, eik og furu. Det er mye krusfrø – *Selinum carvifolia*, dessuten arter som dunhavre – *Avenula pubescens*, fagerklokke – *Campanula persicifolia*, hvitmaure – *Galium boreale*, rødknapp – *Knautia arvensis*, knollerteknapp – *Lathyrus linifolius*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare* og kantkonvall – *Polygonatum odoratum*.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert kantsamfunn og tørrbakkeparti med forekomst av en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og noe rydding av løvoppslag i åker- og veikant. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten.

.....

28 Oppegård Østre nord 2

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: C Areal : ,86 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i sørøstre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med mye krusfrø – *Selinum carvifolia*, en god del ung ask – *Fraxinus excelsior*, kantkonvall – *Polygonatum odoratum* og rødknapp – *Knautia arvensis*.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert kantsamfunn og tørrbakkeparti med forekomst av en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten.

.....

29 Oppegård Østre nord 3

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: C Areal : ,46 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i søndre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med noe tørrbakke- og ugrasflora og en god del ung ask – *Fraxinus excelsior*. Lokaliteten er tatt med fordi den inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av kantsamfunn og tørrbakkeparti.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten.

.....

30 Oppegård Østre nord 4

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : 1,45 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i midtre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – *Selinum carvifolia*, en god del ung ask – *Fraxinus excelsior*, noe spisslønn – *Acer platanoides*, dunhavre – *Avenula pubescens*, fagerklokke – *Campanula persicifolia*, prikkperikum – *Hypericum perforatum*, rødknapp – *Knautia arvensis*, knollerteknapp – *Lathyrus linifolius*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert kantsamfunn og tørrbakkeparti med forekomst av en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten.

.....

31 Oppegård Østre nord 5

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : 1,47 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i nordre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – *Selinum carvifolia*, fagerklokke – *Campanula persicifolia* og prestekrage – *Leucanthemum vulgare*.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som vokser i skogkanter og tørre enger.

Bruk, tilstand og påvirkning: Søndre del av lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert kantsamfunn og tørrbakkeparti med forekomst av en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og eventuelt rydding av løvoppslag. Unngå gjødsling av lokaliteten.

.....

32 Oppegård Østre nord 6

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : ,3 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i nordøstre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – *Selinum carvifolia* og prestekrage – *Leucanthemum vulgare*.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som vokser i skogkanter og tørre enger.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert og artsrik kantsamfunn og tørrbakkeparti med forekomst av en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og eventuelt rydding av løvoppslag. Unngå gjødsling av lokaliteten.

.....

33 Oppegård Østre nord 7

Småbiotoper – Kantsamfunn Verdi: **C** Areal : 5,61 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en kantsone rundt nordre del av åkerkant, nord for Roald Amundsens vei og Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Smal åkerkant med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – *Selinum carvifolia* spredt langs kanten, og arter som fagerklokke – *Campanula persicifolia*, rødknapp – *Knautia arvensis*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare*, nattfiol – *Platanthera* sp. og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*. Små eiketær finnes også i lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: En mindre del av lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert og artsrik kantsamfunn og tørrbakkeparti med forekomst av en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og veikanter og noe rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten.

34 Roald Amundsens vei nord for Oppegård Østre

Artsrik veikant – Verdi: **C** Areal : 31,32 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dette er en stor veikantlokalitet langs Roald Amundsens vei mellom Oppegård Østre og E6. Videre er et stort ruderatpreget engområde på begge sider av E6 inkludert.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På lokaliteten dominerer ugrasvegetasjon, men det er også mye krusfrø - *Selinum carvifolia*. Krusfrø finnes også spredt langs hele strekningen sammen med engarter som for eksempel engknoppurt – *Centaurea jacea*, hvitmaure – *Galium boreale*, rødknapp – *Knautia arvensis*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare*, nattfiol – *Platanthera bifolia* og skogkløver – *Trifolium medium*. På en liten knaus vokser blodstorkenebb – *Geranium sanguineum* og flekkgrisøre – *Hypochoeris maculata*.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger. Det er et potensial for interessante insekter i deler av lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av artsrik veikant og engpartier med forekomst av en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og veikanter og noe rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten.

35 Nordøst for Oppegård Østre 1

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : ,85 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en åkerholme beliggende nordøst for Oppegård Østre, sør for Roald Amundsens vei.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – *Selinum carvifolia*, jonsokkoll – *Ajuga pyramidalis*, markjordbær – *Fragaria vesca*, hvitmaure – *Galium boreale*, rødknapp – *Knautia arvensis*, knollerteknapp – *Lathyrus linifolius* og prestekrage – *Leucanthemum vulgare*. På holmen står også eldre eik og noe einer.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som vokser i skogkanter og tørre enger.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rikt kantsamfunn på åkerholme med forekomst av en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og noe rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten.

36 Nordøst for Oppegård Østre 2

Småbiotoper – Kantsamfunn Verdi: **B** Areal : 5,23 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Oppegård Østre, langs åkerkant sør for Roald Amundsens vei.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerkant med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet vokser krusfrø – *Selinum carvifolia* spredt rundt åkeren. Ellers finnes fagerklokke – *Campanula persicifolia*, knoppurt – *Centaurea jacea*, rødknapp – *Knautia arvensis*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare* og skogkløver – *Trifolium medium*. På en knaus inngår en del større eiketrær. Totalt seks eiketrær innenfor lokaliteten er vurdert som “forskriftseiker” og antas å være viktige for det biologiske mangfoldet.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av noen grove eiketrær og et rikt kantsamfunn med en rødlistet karplante.

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engarealene og noe rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred.

37 Øst for Oppegård Østre 1

Rik edellauskog – Lågurt-eikeskog Verdi: **B** Areal : 29,98 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et parti med alm-lindeskog, lågurt-eikeskog og gjengroende hagemark øst for Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er mye eik, flere av trærne er store og gamle, foruten spisslønn, ask og lind. Fem av eiketrærne er vurdert som "forskriftseiker". Floraen er temmelig rik, blant annet med hvitveis – *Anemone nemorosa*, liljekonvall – *Convallaria majalis*, blåveis – *Hepatica nobilis*, rødknapp – *Knautia arvensis*, knollerte knapp – *Lathyrus linifolius*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare*, firblad – *Paris quadrifolia*, kantkonvall – *Polygonatum odoratum*, marianøkleblom – *Primula veris*, skogkløver – *Trifolium medium*, korsved – *Viburnum opulus* og skogfiol – *Viola riviniana*. Feltsjiktet bærer preg av å være kulturmark, nå under gjengroing. På ask og på berg vokser de kravfulle mosene glansmose – *Homalia trichomanoides* og gulbånd – *Metzgeria furcata*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av skogen har trolig tidligere vært beitemark og åker. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av gamle eiketrær og andre gamle trær stående i rik edelløvsog.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

38 Øst for Oppegård Østre 2

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 9,68 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en smal sone rundt østre kant av åker, øst for Oppegård Østre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en smal sone rundt åker øst for Oppegård Østre. Store eiketrær med grov sprekkebark står flere steder i åkerkanten og en del yngre trær finnes også. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er sannsynlig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". Eng- og kantarter inngår, men nitrofile ugras dominerer.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av bl.a. stor eik. Eiketrærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne langs åkeren kan holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av lokaliteten må unngås.

.....

39 Sør for Oppegård Østre

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : ,2 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Oppegård Østre, innenfor et oppdyrket areal.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av en åkerholme med en stor frittstående eik. På denne vokser kulturmarksarten askeragg – *Ramalina fraxinea*, sammen med andre rikbarksarter som allélav – *Anaptychia ciliaris*, ekommose – *Leucodon sciurioides*, skåldoggelav – *Physconia distorta*, leppedoggelav – *P. perisidiosa* og barkragg – *Ramalina farinacea*. Eiketreet kommer sannsynligvis innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik" og bør sjekkes bedre i felt.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik. Treet bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet bør holdes fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling tett opp til lokaliteten bør unngås.

.....

40 Sør for Grønmo

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : ,59 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Grønmo og nord for Søndre Oppegård, innenfor et oppdyrket areal.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten åkerholme med relativt store eiker, ask og spisslønn. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". Rik engpreget flora inngår med blant annet liljekonvall – *Convallaria majalis*, kratthumleblom – *Geum urbanum*, kantkonvall – *Polygonatum odoratum* og marianøkleblom – *Primula veris*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det viktige kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av relativt stor eik og ask. Trærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av lokaliteten må unngås.

.....

41 Oppegård Søndre

Parklandskap – Parker Verdi: **B** Areal : 20,67 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på tunet til Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På tunet på Oppegård Søndre finnes flere meget store eiketrær, foruten stor lind og spisslønn. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er sannsynlig at flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". Inn mot tunet er det også en lindeallé. På trærne finnes flere rikkbarksarter, blant annet en god del lindelav – *Parmelina tiliacea*, dessuten bleiktjafs - *Evernia prunastri*, barkrugg - *Ramalina farinacea*, ekormose – *Leucodon sciurioides* og broddtråkleiose - *Pseudoleskeella nervosa*. Noen av kjempeeikene er ifølge grunneier nylig døde og disse er felt. Hule trær er også nylig hugget. På stubben etter den største eika vokser oksetungesopp – *Fistulina hepatica* (NT). Arten er knyttet til store, gamle eiketrær. På stammen av de døde trærne fantes også soppen *Bulgaria inquinans* og på lønn vokser lønnkjuke – *Oxyporus populinus*.

Artsmangfold: Oksetungesopp (NT) er påvist på den største eika.

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjottes parkmessig ved beskjæringer og felling av uønskede trær. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår som en viktig del av det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av flere grove edelløvtrær, hvorav noen grove og dels hule eiker. Lokaliteten bør sjekkes på nytt for å fastslå om verdiene er i behold eller større enn antatt, til tross for at de groveste eiketrærne er felt.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av, og nedfalne grener og stammedeler bør få bli liggende eller flyttes til en egnet eksponert lokalitet i nærheten. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Eventuelle hullheter må ikke tettes igjen og ingen trær bør felles. Styving må vurderes som alternativ til felling.

42 Øst for Oppegård Søndre 1

Rik edellauskog – Lågurt-eikeskog Verdi: C Areal : 8,82 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i vestre kant av åker, øst for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området inneholder gjengroende hagemarkpreget rik edelløuskog. Både stor ask, eik, lind og osp inngår i tresjiktet. Flere av eikene har grov sprekkebark. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". I undervegetasjonen inngår eng- og kantarter, blant annet kransmynte – *Clinopodium vulgare*, liljekonvall – *Convallaria majalis*, markjordbær - *Fragaria vesca*, firkantperikum – *Hypericum maculatum*, rødknapp – *Knautia arvensis*, marianøkleblom – *Primula veris* og skogfiol – *Viola riviniana*., og er tydelig gammel kulturmark som nå er under gjengroing. Et lite fuktparti med en liten grunn dam som trolig tørker ut utover sommeren finnes også i en forsøkningsk. Her er det noe fuktvegetasjon.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er tydelig gammel kulturmark som nå er under gjengroing. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det viktige kulturlandskapet på Svartskogsplatået

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik og andre gamle trær. Trærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Den nordøstre delen av området bør overlates til fri utvikling. Den resterende delen kan åpnes opp ved fjerning av løvoppslag og beitedyr kan slippes til. La all død ved av grovere dimensjoner ligge.

43 Øst for Oppegård Søndre 2

Gammel lauskog – Gammelt ospesholt Verdi: C Areal : 2,23 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kanten av åker nordøst for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et lite ospesholt med store trær i kanten av åker øst for Søndre Oppegård. Videre langs bekk finnes også litt svartorskog.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten anslås å ha lokal verdi (C-verdi) grunnet forekomst av solbelyst, gammelt ospesholt. Manglende interessante utforminger og arter, samt liten størrelse trekker verdien ned, men lokaliteten burde vært undersøkt bedre.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

44 Øst for Oppegård Søndre 3

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 6,71 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for den midterste av tre åkerholmer øst for Oppegård Søndre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerkant med store gamle eiketrær, stor osp, ask og lind. Flere store eiketrær står inne i skogen innenfor åkeren også. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". Ellers finnes både steinrøyser og et godt bevart steingjerde. Undervegetasjonen har kulturmarkspreg med blant annet firkantperikum – *Hypericum maculatum*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik og andre gamle trær. Trærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av lokaliteten må unngås og det ville vært en fordel med ekstensiv slått eller forsiktig beite på lokaliteten.

.....

45 Øst for Oppegård Søndre 4

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : ,72 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den vestre av tre åkerholmer øst for Oppegård Søndre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten ligger på åkerholme med relativt stor eik og ask. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". Kulturmarkspreget vegetasjon og noen knauser med bergrørkvein – Calamagrostis epigejos, blåklomme – Campanula rotundifolia, markjordbær - Fragaria vesca, firkantperikum – Hypericum maculatum, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, kantkonvall – Polygonatum odoratum, marianøklebånd – Primula veris, tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys og legeveronika – V. officinalis inngår. Det er også fine forekomster med marianøkleblom – Primula veris på åkerholmen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik og ask. Trærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av lokaliteten må unngås.

.....

46 Øst for Oppegård Søndre 5

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 1,98 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den midtre av tre åkerholmer øst for Oppegård Søndre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en åkerholme med stor eik og ask, samt einer. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". Her finnes knauser og kulturmarkspreget vegetasjon med liljekonvall – Convallaria majalis, markjordbær - Fragaria vesca, firkantperikum – Hypericum maculatum, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, kantkonvall – Polygonatum odoratum, tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys og legeveronika – V. officinalis. Flere vanlige beitemarksopp ble registrert, blant annet kritt vokssopp – Camarophyllus virgineus, silkerødskevessopp – Entoloma sericellum, mønjevokssopp – Hygrocybe coccinea og mye kjeglevokssopp – Hygrocybe conica.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik og ask. Trærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: De store edelløvtrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av lokaliteten må unngås og det ville vært en fordel med ekstensiv slått eller forsiktig beite på lokaliteten.

.....

47 Øst for Oppegård Søndre 6

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : 5,16 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den østligste av tre åkerholmer øst for Oppegård Søndre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med furu, eik og einer. Kun relativt fattig vegetasjon finnes. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik".

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik. Trærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av lokaliteten må unngås.

.....

48 Øst for Oppegård Søndre 7

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 1,38 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for den østligste av tre åkerholmer beliggende øst for Oppegård Søndre.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerkant med kulturmarkspreget undervegetasjon og et par store eiketrær. To av eiketrærne kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik" og den groveste har en omkrets på 280 cm.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik. Trærne bør undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskæring og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme.

.....

49 Sør for Oppegård Søndre 1

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : ,73 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 900 m sør for Bålerud og er den østre av tre små åkerholmer omgitt av dyrket mark. **Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:** Åkerholme med stor eik og kulturmarkspreget undervegetasjon og noen knauser med blåklomme – *Campanula rotundifolia*, markjordbær - *Fragaria vesca*, hvitmaure – *Galium boreale*, firkantperikum – *Hypericum maculatum*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik".

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av rik tørrengvegetasjon.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes delvis fristilte. Gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme.

.....

50 Sør for Oppegård Søndre 2

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **C** Areal : ,71 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 900 m sør for Bålerud og er den midtre av tre små åkerholmer omgitt av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med kulturmarkspreget undervegetasjon og knauser med engknoppurt – *Centaurea jacea*, markjordbær - *Fragaria vesca*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare*, smalkjempe – *Plantago lanceolata* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av rik tørrengvegetasjon.

Skjøtsel og hensyn: Gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme.

.....

51 Sør for Oppegård Søndre 3

Småbiotoper – Åkerholmer Verdi: **B** Areal : 1,1599999999999999 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 900 m sør for Bålerud og er den vestre av tre små åkerholmer omgitt av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en stor eik, kulturmarkspreget vegetasjon og noen knauser med blåklomme – *Campanula rotundifolia*, markjordbær - *Fragaria vesca*, hvitmaure – *Galium boreale*, firkantperikum – *Hypericum maculatum*, rødknapp – *Knautia arvensis*, knollerte knapp – *Lathyrus linifolius*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare*, smalkjempe – *Plantago lanceolata* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*. Eiketreet er ikke sjekket godt i felt, men måler 225 cm i diameter, er hult og kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik".

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av stor hul eik og noe tørrengvegetasjon.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme.

.....

52 Sør for Oppegård Søndre 4

Småbiotoper – Kantsamfunn Verdi: **C** Areal : 2,41 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger 900 m sør for Bålerud og utgjør en nordvendt kantområde mot dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nordvendt åkerkant med kulturmarkspreget undervegetasjon og flere store eike- og ospetrær, blant annet en ganske stor grov eik. Utover dette er lokaliteten artsfattig og har liten verdi. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik".

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik. Utover dette er lokaliteten artsfattig og har liten verdi. En nordvendt beliggenhet begrenser forekomster av f.eks. interessante insekter.

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme.

.....

53 Sør for Oppegård Søndre 5

Rik edellauvskog – Lågurt-eikeskog Verdi: B Areal : 29,12 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger 700 m sør for Bålerud og utgjør et skogkledd parti omringet av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor åkerholme med lågurt-eikeskog og blåbærikekog iblandet gran og furu på skrinne mark. En del blokker og fjell i dagen finnes. I tresjiktet er det også osp, hassel, einer og spisslønn. En del stor eik inngår, hvorav minst to kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". Arter som trollbær – *Actaea spicata*, hvitveis – *Anemone nemorosa*, blåveis – *Hepatica nobilis* og skogfiol – *Viola riviniana* er registrert. På berg vokser svartburkne – *Asplenium trichomanes* og mosene krypsilkemose – *Homalothecium sericeum* og gulbånd – *Metzgeria furcata*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er lysåpen og ble trolig beitet for lang tid siden. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av lågurt-eikeskog og annen rik skog, i tillegg til et par grove eiketrær. Lokaliteten har derfor et godt potensial for å huse mange interessante insekter og sopp.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

54 Sør for Oppegård Søndre 6

Rik edellauvskog – Verdi: B Areal : 141,57 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Oppegård Søndre, sør for Bålerud og vest for Sjødalveien, og inkluderer rikere, skogkledd partier mellom dyrket mark og fattigere skog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et stort område med hagemarkpreget lågurt- og blåbærikekog omkranset av åker vest for Oppegård Søndre. Eikeskogen er best utviklet langs åkerkantene, særlig mot sør og nordøst nær gården. Noen grove eiketrær står langs jordekanten, og det største måler 320 cm i omkrets. På skrinne mark finnes blandingsskog med gran, furu, eik og litt hassel. På litt friskere mark, blant annet mot nordøst og i et parti mot sørvest er det alm-lindeskog med mye stor spisslønn, ask og hassel. Stedvis finnes store osper, og rundt en dam finnes svartorsump. De midtre partiene av lokaliteten har fattig furuskog på skrinne mark og partier med sumppreget granskog som er uten interesse i denne sammenheng. Især i sør og nord er kulturpåvirkningen tydelig og skogen har hagemarkpreg med urte- og grasrikt feltsjikt, blant annet med mye liljekonvall - *Convallaria majalis*. Det er en relativt rik flora med hvitveis - *Anemone nemorosa*, fingerstarr – *Carex digitata*, liljekonvall – *Convallaria majalis*, mye blåveis – *Hepatica nobilis* og skogfiol – *Viola riviniana*. På eik ble eikebevre – *Exidia truncata* funnet. På bergvegger er det bra forekomster med kravfulle arter som ryemose – *Antitrichia curtipendula*, krypsilkemose – *Homalothecium sericeum*, gulbånd – *Metzgeria furcata* og flatfellmose – *Neckera complanata*.

Bruk, tilstand og påvirkning: I sør og nord er kulturpåvirkningen tydelig og skogen har hagemarkpreg. Størstedelen av lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en større forekomst av rik edelløvskog med til dels eldre skog og med god vegetasjonstypevariasjon, samt flere grove eiketrær i kant mot åker.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

55 Dam vest for Søndre Oppegård

Dam – Verdi: B Areal : ,54 daa

Innledning: Dammen omtales av Strand (1994, 1996), Sandaas (2011) og er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Denne dammen ligger i skogen vest for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen omtales av Strand (1994, 1996), som angir forekomst med småsalamander – *Triturus vulgaris* (NT) og buttsnutefrosk – *Rana temporaria*. I 2004 ble padde - *Bufo bufo* observert. Storsalamander skal også være observert (Sandaas 2011). Det er sannsynlig at salamanderne benytter begge dammene (lokalitet 54 og 55), og til sammen utgjør de et viktig levested for disse artene.

Artsmangfold: Småsalamandere - *Triturus vulgaris* (NT) er registrert i dammen og storsalamander (VU) skal også være observert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået.

Fremmede arter: I følge grunneier er det satt ut karpe.

Verdivurdering: Dam med småsalamander (NT) og antatt storsalamander (VU) gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Om dammen har en forekomst av storsalamander, bør verdien justeres til høyeste verdi (A-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Forekomsten av karpe bør om mulig fjernes, da den kan utgjøre en trussel mot amfibiene og virvelløse dyr i dammen.

.....

56 Dam sørvest for Søndre Oppegård

Dam – Verdi: B Areal : 37 daa

Innledning: Dammen omtales av Strand (1994, 1996) og er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i skogen sørvest for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen omtales av Strand (1994, 1996), som kun angir forekomst av buttsnutfrosk. I 2004 ble flere småsalamandere - Triturus vulgaris (NT) observert, sammen med padde – Bufo bufo. Det er sannsynlig at salamanderne benytter begge dammene (lokalitet 54 og 55), og til sammen utgjør de et viktig levested for denne truede arten.

Artsmangfold: Småsalamander - Triturus vulgaris (NT) er registrert i dammen.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplataet.

Verdivurdering: Dam med småsalamander gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B verdi).

Skjøtsel og hensyn:

.....

57 Vest for Bålerud

Hagemark – Eikehage Verdi: C Areal : 2,21 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er endret av BioFokus ved Anders Thy1én etter feltbesøk sammen med Terje Blindheim høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud. Deler av lokaliteten er nå blitt skilt ut som annen biotop.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, straks vest for Bålerud gård, inntil Roald Amundsens vei.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lite skogområde med noe stor eik, ask og lind. Skogen er nokså påvirket, og det er relativt fattig flora. Enkelte osp-, bjørk- og eiketær er store og grove. Litt lind inngår også. Fingerstarr og korsved vokser i feltsjiktet.

Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter, men på sikt er potensial for arter knyttet til gammel eik.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke gammel eller godt utviklet, men enkelte litt store trær forekommer.

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på gamle og grove eiker.

Verdivurdering: Lite holt med hagemark med noe gamle trær, men forøvrig uten spesielle naturelementer. Vurderes som lokalt viktig (C-verdi) som del av eikelandskapet rundt Oppegård kirke.

Skjøtsel og hensyn: Småtrær og kratt bør ryddes rundt de store trærne.

.....

58 Leirskallen

Rik sumpskog – Viersump i lavlandet Verdi: C Areal : 1,31 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Leirskallen, mellom liten vei og tett opp til E18 på motsatt side av rasteplass.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten sumpskog nær E18 ved Leirskallen omkranset av ruderatpreget eng (lokalitet 34). Her finnes noe gråseljekratt (VU, noe truet) og sumpvegetasjon med arter som vassgro – Alisma plantago-aquatica, sennegrass – Carex vesicaria, hvitbladistel – Cirsium helenioides, myksivaks – Eleocharis mamillata, mjødur – Filipendula ulmaria, knappsiv – Juncus conglomeratus, andemat – Lemna minor, takrør – Phragmites australis, skogsivaks – Scirpus sylvaticus, kjempepiggeknope – Sparganium erectum og dunkjevele – Typha latifolia.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe påvirket av beliggenheten helt opp til E18.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en meget liten rik sumpskog med forekomst av en truet vegetasjonstype. Lokaliteten er preget av nærheten til E18 og av kanteffekter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

59 Rødstein

Rik edellauvskog – Or-askeskog Verdi: B Areal : 12,14 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005 og reinventert av Terje Blindheim i 2011. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er endret av BioFokus høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud. Området er tidligere MiS kartlagt i forbindelse med oppdatering av skogbruksplan.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, sørøst for Rødstein. Skogen står på rike løsmasser som stedvis gjennomtrenges av grunnvann med kildeskog som resultat. I vest inngår noe grunnere mark inn mot bergvegsmiljø. Det renner en liten bekk gjennom lokaliteten som stedvis har gravd seg noe ned i løsmassene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen veksler på kanten i vest som er frisk til tørr og må kunne karakteriseres som alm-lindeskog med leddved, trollbær, blåveis, skogsalat, og i tresjiktet mye lind. Vegetasjonen langs bekkens nedre deler er påvirket av kildesig og kan karakteriseres som varmekjær kildeløvskog av snelle-asktype, som er regnet som en akutt truet vegetasjonstype. Øvrige arealer er for det meste or-askeskog med innslag av arter som tysbast, skogsvinerot, springfrø og firblad. I tresjiktet inngår blant annet spisslønn, alm, ask, lind, gråor og osp, samt en del gran. Skogen er generelt storvokst, men den er nokså påvirket og inneklemt av omkringliggende bebyggelse og det er hogd en del trær. Langs sidene er det en del bergvegger og liggende død ved av ulike treslag finnes spredt.

Artsmangfold: Lokaliteten må betegnes som en viktig viltbiotop, særlig for spurvefugl. På noe lengre sikt, når kvaliteter knyttet til gammel skog får utvikles, vil det være større potensial for et rikt mangfold knyttet til svært produktiv og rik løvskog. Knyttet til død ved er det påvist rynkeskinn (NT iht. Norsk rødliste 2010), granrustjuka og vassjuka. Det er et middels potensial for sjeldne og trua markboende sopp.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området har trolig vært påvirket av beite for lang tid tilbake og det har vært gjennomført uthogster av gran i områder som i dag er preget av yngre krattpreget skog. Områdets kvaliteter er i dag helt klart knyttet til skogverdiene. Det går en enkel strømlinje sør i området. Mindre deler av lokaliteten påvirkes av rydding knyttet til denne.

Fremmede arter: Det er mye edelgran og platanlønn, særlig i nordre del av området, både innenfor og utenfor lokalitetens grenser. Begge treslagene sprer seg mye i området.

Verdivurdering: Området huser den sjeldne naturtypen ask-snelleskog, samt de rike vegetasjonstypene or-askeskog og alm-lindeskog som er mindre vanlige på denne siden av Oslofjorden. Lokalitetens potensial i dag og på sikt for å huse et rikt biologisk mangfold tilsier verdi som viktig (B-verdi) selv om arealet er noe begrenset og fremmede arter påvirker lokaliteten negativt.

Skjøtsel og hensyn: Fremmede treslag som edelgran og platanlønn bør fjernes, også i områdene rundt lokaliteten. Ellers fri utvikling. Utsiktshogster innenfor lokalitetens grenser bør ikke forekomme.

.....

60 Bekkensten

Annen viktig forekomst – Verdi: **C** Areal : 4,400000000000004 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt første gang av Harald Bratli i forbindelse med første runde av naturtypekartleggingen. Reinventert av Terje Blindheim i forbindelse med ny reguleringsplan for Bålerud. Beskrivelsen oppsummerer de to undersøkelsene.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, ved Bekkensten. Området er mosaikkartet med strandberg, skrin furuskog, engvegetasjon og ruderatpreget vegetasjon. Langs veien er det mye tett løvskog som er kommet opp etter opphør av hevd. Berggrunnen er fattig, men rikere sig finnes.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I tilknytning til badestranda på Bekkensten finnes en del engpreget vegetasjon knyttet både til åpen furuskog, kantkratt og strandberg. Lokaliteten er artsrik med flere interessante og karakteristiske arter for kantkratt og tørrbakker langs Oslofjorden. Siden lokaliteten er vanskelig å definere er den merket som annen viktig forekomst under hovedtype kulturlandskap da en del av vegetasjonen er kulturbetinget/forstyrrelsesbetinget. I krattene inngår berberis, slåpetorn, geitved og flere rosearter. Registrerte arter inkluderer blant annet tårnurt, lakrismjelt, engknoppurt, kransmynte, gulmaure, blodstorkenebb, flekkgrisøre, skogflatbelg, bergmynte, smalkjempe, nikkesmelle og harekløver. Litt hassel finnes også. Vegetasjonen er temmelig preget av friluftslivet, men stedvis er det artsrikt og velutviklet vegetasjon, især mellom rose- og slåpetornkrattene. Det finnes soleksponert lavvokst furu opp til 50 cm i diameter. Langs veien er det mye osp og annet løv i tillegg til et parti med helt åpen eng i sør. Ved veien er det også inkludert en grov furugadd som har tørket ut forholdsvis nylig. Det finnes også noe eik og hassel i området.

Artsmangfold: Det kan være mange arter av insekter knyttet til den noe rike eng- og krattvegetasjonen, samt at de gamle furutrærne kan være et viktig levested for diverse insekter. Potensialet for andre artsgrupper vurderes som lavt. En furu hadde muligens gnag av reliktbukk, men dette funnet er ikke verifisert av ekspert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området brukes forholdsvis hardt av badegjester. Gammel hustuft finnes sentralt i området. I områder med mer skog er vegetasjonen forholdsvis intakt. Området er stedvis i ferd med å endre sitt kulturpreg pga. gjenvoksning etter tidligere mer aktiv hevd.

Fremmede arter: Ved den gamle hustuften vokser det mye såpeurt. Det er usikkert hvorvidt denne er i spredning, men det kan virke slik.

Verdivurdering: Områdets mosaikkpreg, form og forholdsvis harde bruk gjør at ingen av naturtypene får høye kvaliteter. Stedvis er også hevdens utlifredstillende. Foreløpig settes verdien derfor til lokal verdi (C-verdi), men evt. dokumentasjon av truede arter kan heve verdien.

Skjøtsel og hensyn: Områdene med åpen eng langs veien og arealer med krattskog bør slås/ryddes for å få fremme engkvalitetene. Nord i området bør det ryddes noe der skogen er tett. Furu, eik og hassel bør få stå igjen, men enkeltgreiner på eik og furu som skygger mye for vegetasjonen kan fjernes. Såpeurt bør slås ned etter blomstring for å hindre spredning. Slåpetornkrattet kan med fordel tynnes noe for å få frem den urterike vegetasjonen i dette området. Ca. halvparten av krattet bør kunne fjernes uten at dette går på bekostning av de artene som er knyttet til slåpen. Den gamle døde furua oppe ved veien må ikke fjernes.

.....

61 Prosted N

Kantkratt – Urterik kant Verdi: **C** Areal : 6,99 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Prosted og dekker kantområder på begge sider av Ingierstrandveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten lokalitet med artsrike kantkratt og veikantvegetasjon. Kantkrattene er best utviklet i nedre del nær stranda, men strekker seg også oppover i bratt skrent under lysåpen furuskog. Lokaliteten inneholder en del interessante karplantearter. Observerte arter inkluderer berberis – Berberis vulgaris, lakrismjelt – Astragalus glycyphyllos, fingerstarr – Carex digitata, blodstorkenebb – Geranium sanguineum, mye blåveis – Hepatica nobilis, svartertechnapp – Lathyrus niger og hvitbergknapp – Sedum album. Langs veien vokser blant annet skogflatbelg - Lathyrus sylvestris, tårnurt - Arabis glabra, lakrismjelt – Astragalus glycyphyllos og engknoppurt – Centaurea jacea. En stor lind står også i veikanten. På den vokser krypsilkemose – Homalothecium sericeum.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er mye påvirket av ferdsel og Ingierstrandveien krysser lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av til dels eksponerte bergknaus-, veikant- og kantkrattsamfunn.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen ved noe forsiktig rydding, og ekstensiv slått bør vurderes på engpartiene. Eldre furu må ikke hogges.

.....

62 Strandskogen sør

Kantkratt – Urterik kant Verdi: **B** Areal : 3,49 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom sjøen og veien, sør for Strandskogen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nær stranda finnes et lite område med strandengfragmenter og fuktvegetasjon langs sig fra kildeframsprang. Her finnes flere kravfulle arter som hjertebras – *Briza media*, hårstarr – *Carex capillaris*, gulstarr – *C. flava*, kornstarr – *C. panicea*, småsivaks – *Eleocharis quinqueflora*, myrsnelle – *Equisetum palustre*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, tettegras – *Pinguicula vulgaris*, tepperot – *Potentilla erecta* og blåknapp – *Succisa pratensis*. Flere av disse artene er sjeldne så nært Oslofjorden. På stranda finnes blant annet litt gåsemure – *Potentilla anserina* og strandkjempe – *Plantago maritima*. På bergene rundt og oppover mot veien finnes rik bergflatevegetasjon, urterik kant og kantkratt, med blant annet olavskjegg – *Asplenium septentrionale*, svartburkne – *A. trichomanes*, rundskolm – *Anthyllis vulneraria*, berberis – *Berberis vulgaris*, fingerstarr – *Carex digitata*, blodstorkenebb – *Geranium sanguineum*, mye blåveis – *Hepatica nobilis*, bergmynte – *Origanum vulgare*, kantkonvall – *Polygonatum odoratum*, hvitbergknapp – *Sedum album* og rognasal – *Sorbus intermedia*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten brukes noe til friluftsliv.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av rike og eksponerte kildeframsprang, bergknaus-, tørreng- og kantkrattsamfunn, med et godt potensial for interessante arter av karplanter og særlig insekter.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen ved noe forsiktig rydding, og ekstensiv slått bør vurderes på engpartiene. Eldre furu må ikke hogges.

63 Strandskogen sørøst 1

Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: C Areal : 26,79 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en nordøstvendt skråning og grunn kløft sørøst for Strandskogen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder rik lågurtskog i nordøstvendt skråning og grunn kløft sørøst for Strandskogen. Skogen preges av storvokst gran og er generelt hogstpåvirket. Det er innslag av en del løvtrær. Stedvis er skogen influert av diffust utflytende sigevann, som nederst drenerer ut i liten kløft. Her inngår sumpskogsarter som mjødurt – *Filipendula ulmaria* og hestehov – *Tussilago farfara*. Det er mye blåveis – *Hepatica nobilis* i området og nattfiol – *Platanthera* sp. ble sett. En del moserike bergvegger finnes, med blant annet kammose – *Ctenidium molluscum*, kystkransemose – *Rhytidiadelphus loreus*, flatfellmose – *Neckera complanata*, putevrimose – *Tortella tortuosa*.

Verdivurdering: Lokaliteten ansees å ha lokal verdi (C-verdi) grunnet mye hogstpåvirkning, men kan ved nærmere undersøkelser vise seg å ha flere interessante arter, særlig av markboende sopp.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

64 Strandskogen sørøst 2

Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: B Areal : 16,75 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Jon T. Kleppslund i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging og av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden og rett ved veien, sørøst for Strandskogen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rett ved veien sørøst ved Strandskogen finnes et lite område med rike hasselkratt, urterik lågurtskog og engpreget vegetasjon. Lind og eik inngår også i tresjiktet sammen med blant annet bjørk og gran. Det er mye blåveis – *Hepatica nobilis* og en pen forekomst med tusbast – *Daphne mezereum*. Ellers inngår lakrismjelt – *Astragalus glycyphyllos*, fingerstarr – *Carex digitata*, firblad – *Paris quadrifolia*, skogvikke – *Vicia sylvatica*, krattfiol – *Viola mirabilis* og skogfiol – *V. riviniana*.

Artsmangfold: Fiolgubbe (NT) skal være påvist i området og potensialet er godt for rødlistede sopp- og insekter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe opprotet og hogstpåvirket og har tidligere vært beitet.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet rik bakke med et potensial for interessante og rødlistede arter av sopp og insekter.

Skjøtsel og hensyn: Foryngelse av gran bør fjernes. Gjennføring av begrenset beiting eller helst slått vil være optimalt. Ellers noe rydding av løvoppslag. La hasselkjerr og død ved være i fred.

65 Strandskollen sør

Kantkratt – Urterik kant Verdi: C Areal : 6,38 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter slake bergflater mellom veien og fjorden og svaberg sør for Strandskollen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes rik bergknausvegetasjon og urterik kant, sammen med strandengfragmenter og tørrbakkeelementer. Floraen er artsrik og inneholder en del kravfulle arter. Her nevnes rundskolm – *Anthyllis vulneraria*, markmalurt – *Artemisia campestris*, svartburkne – *A. trichomanes*, fingerstarr – *Carex digitata*, bleikstarr – *C. pallescens*, blodstorkenebb – *Geranium sanguineum*, flekkgrisøre – *Hypochoeris maculata*, bergmynte – *Origanum vulgare*, kantkonvall – *Polygonatum odoratum*, sølvmyre – *Potentilla argentea*, hvitbergknapp – *Sedum album* og lodnebregne – *Woodsia ilvensis*. På bergene er det også en del putevrimose – *Tortella tortuosa*, som indikerer baserike forhold.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er en del brukt til friluftsliv og er derfor en noe preget av slitasje. En liten privat vei går igjennom lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av til dels eksponerte bergknaus-, tørreng- og kantkrattsamfunn.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen ved noe forsiktig rydding, og ekstensiv slått bør foretas på engpartiene. Grovere død ved må få bli liggende og eldre furu må ikke hogges.

66 Strandkollen

Kantkratt – Urterik kant Verdi: **C** Areal : 11,75 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på knauser og svaberg sør for Strandkollen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes rik bergknausvegetasjon og urterik kant, kantkratt og lenger fra stranda noe grandominert rik lågurtskog. Ved stranda er det litt strandengvegetasjon. Floraen er artsrik og inneholder en del kravfulle arter. Her nevnes fløyelsmarikåpe - *Alchemilla glaucescens*, katterfot – *Antennaria dioica*, rundskolm – *Anthyllis vulneraria*, markmalurt – *Artemisia campestris*, fingerstarr – *Carex digitata*, bleikstarr – *C. pallescens*, blodstorkenebb – *Geranium sanguineum*, flekkgrisøre – *Hypochoeris maculata*, bergmynte – *Origanum vulgare*, kantkonvall – *Polygonatum odoratum*, hvitbergknapp – *Sedum album* og nikkesmelle – *Silene nutans* (NT). På bergene er det også en del putevrimose – *Tortella tortuosa*, som indikerer baserike forhold. På skrinne furudominerte knauser inngår melbær - *Arctostaphylos uva-ursi*, som er ganske sjelden langs Oslofjorden. I skogen er det også en del blåveis – *Hepatica nobilis*. Floraen er jevnt over artsrik og inneholder en del karakteristiske arter for urterike kanter langs Oslofjorden.

Artsmangfold: Nikkesmelle – *Silene nutans* (NT) ble observert på lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er mye brukt til friluftsliv og er derfor en del preget av slitasje.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi), men det antas at nærmere undersøkelser av insektfaunaen på lokaliteten vil kunne heve verdien.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen ved noe forsiktig rydding, og ekstensiv slått bør foretas på engpartiene. Grovere død ved må få bli liggende og eldre furu må ikke hugges.

67 Bjørnehue Ø

Rik sumpskog – Verdi: **B** Areal : 11,71 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær stien øst for Bjørnehue og øst for veien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området inneholder en liten svartorsump nær stien vest for Bjørnehue. Her er det en del middels stor svartor i et flatt parti med stagnerende høy vannstand. Ung skog er dominerende som følge av hogstpåvirkning. Floraen er middels rik, blant annet ble gulstarr – *Carex flacca* sett, og ved basis av svartor og røtter ble blant annet palmemose – *Climacium dendroides* og kysttornemose – *Mnium hornum* registrert.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes å være viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en godt utviklet svartorsump. Ung skog trekker verdien noe ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

68 Sandbukta Ø

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **B** Areal : 8,98 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for veien og øst for Sandbukta og vest for Kruttmølleåsen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder rik sumpskog. Skogen domineres av svartor, gran og bjørk. Den sjeldne arten slakkstarr – *Carex remota* skal være observert. Skogen er relativt ung og det er hugget helt inntil. Her er det nå tett ospeoppslag. Det er lite død ved i biotopen.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av forekomsten av en rik slakkstarrsump. Dette til tross for ung skog uten spesielle elementer som død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

69 Kruttmølleåsen sør

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **C** Areal : 8,369999999999999 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Kruttmølleåsen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Relativt liten og påvirket rik sumpskog med høyt vannspeil. Gran og noe svartor inngår. Skogen er relativt ung og det er lite død ved.

Bruk, tilstand og påvirkning: Hovedsti og kraftledning krysser lokaliteten, som også ligger inntil hogstflater.

Verdivurdering: Grunnet ung skog og relativt lite areal gis lokaliteten lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

70 Sandbuktfeltet

Gammel lauvskog – Gammel bjørkesuksesjon Verdi: **C** Areal : 35,89 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for veien på åsen mellom Bestemorstranda og Gjersjøelva nordvest i kommunen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området preges av et større område med gammel bjørkeskog med urte- og grasrik lågurtvegetasjon i skogbunnen. Her er det rik flora med mye blåveis – *Hepatica nobilis* og andre kravfulle arter som fagerklokke – *Campanula persicifolia*, fingerstarr – *Carex digitata*, hvitmaure – *Galium boreale*, knollerte knapp – *Lathyrus linifolius*, myskegras – *Milium effusum*, tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys* og skogvikke – *Vicia sylvatica*. Den regionalt sjeldne arten skogbingel – *Mercurialis perennis* finnes også. Mot sør er et området med mye gammel osp og til dels lågurtgranskog i kløft inkludert. Her er det en del moserike bergvegger. Suboseaniske arter som kystjammemose – *Plagiommium undulatum* og kystkransemose – *Rhytidiadelphus loreus* er registrert. Hassel og lind inngår også, og på fuktigere mark svartor. Eik er så vidt registrert.

Artsmangfold: Skogbingel (*Mercurialis perennis*) forekommer.

Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere hadde løvskogen større utbredelse, men gran har overtatt i deler av den tidligere løvskogen.

Lokaliteten ligger på terrasser som tidligere skal ha vært bebodd, noe som tyder på at skogen tidligere kan ha vært kulturmark, eller i det minste sterkt kulturpåvirket. Innslaget av kulturmarksarter er fortsatt til stede, selv om dette preget ikke er så tydelig i dag.

Verdivurdering: Grunnet en ung naturtype, manglende funn av viktige elementer og spesielle arter, gis lokaliteten lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

71 Bestemorstranda

Kantkratt – Urterik kant Verdi: B Areal : 22,59 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom veien og fjorden på Bestemorstranda.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et relativt stort område med urterik kant, tørrbakkevegetasjon, kantkratt og bergknauser mellom veien og fjorden på Bestemorstranda. I øvre deler inngår noe furuskog i veksling med urterik åpen vegetasjon. Dette er en av de mest velutviklede forekomstene av artsrik kant- og tørrbakkevegetasjon langs Bunnefjorden i Oppegård. Floraen er artsrik med flere karakteristiske arter for miljøet, deriblant den sjeldne arten oslosildre - *Saxifraga osloensis*. I tillegg er trefingersildre *S. tridactylites* og den sørøstlige arten vårbendel – *Spergula morisonii* funnet fra før. Karakteristiske arter er også bergskrinneblom - *Arabis hirsuta*, hvitmaure – *Galium boreale*, gulmaure – *G. verum*, blodstorkenebb – *Geranium sanguineum*, rødknapp – *Knautia arvensis*, fjellrapp – *Poa alpina*, kantkonvall – *Polygonatum odoratum*, nyresildre – *Saxifraga granulata* og hvitbergknapp – *Sedum album*. I fuktige forsengkninger inngår knorrstarr – *Carex panicea* og blåknapp – *Succisa pratensis*. Blåveis – *Hepatica nobilis* og leddved – *Lonicera xylosteum* er også registrert.

Artsmangfold: Oslosildre - *Saxifraga osloensis* (NT) forekommer. Den utdødde arten svalerot – *Vincetoxicum rossicum* (RE) er tidligere funnet langs veien ved Bestemorstranda. Lokaliteten har et godt potensial for forekomst av ytterligere rødlistearter, spesielt av insekter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er påvirket av en del søppel og slitasje i forbindelse med friluftsliv og krysses på langs av en gangvei.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av forekomsten av en truet vegetasjonstype, en rødlistet karplante og et godt potensial for forekomster av rødlistete insekter.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes delvis åpen ved ekstensiv rydding av løvoppslag og kratt, og helst ved at egnede deler av lokaliteten slås.

72 Ljansbruket sør

Rik blandingskog i lavlandet – Boreonemoral blandingskog Verdi: C Areal : 20,67 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Ljansbruket, i en nordvendt skråning på begge sider av Ingierstrandveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av blandingskog med furu, gran og ulike løvtrær. En del ung ask finnes også. Generelt er vegetasjonen relativt fattig og noe påvirket av ferdsel og annen slitasje, men den huser en stor forekomst av den regionalt sjeldne arten skogbingel – *Mercurialis perennis* som her vokser på sin nordgrense på Østlandet (nordgrense på østsiden av Oslofjorden).

Artsmangfold: Skogbingel *Mercurialis perennis* forekommer.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe påvirket av ferdsel og annen slitasje og krysses av Ingierstrandveien.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet liten størrelse, noe ung skog, mye påvirkning og manglende forekomster av rødlistearter og spesielle elementer.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

73 Kruttmølleåsen Ø

Rik edellauskog – Alm-lindeskog Verdi: B Areal : 33,94 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den bratte skrenten på østsiden av Kruttmølleåsen, ned mot parkeringsplass ved Gjersjøelva.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På lokaliteten finnes alm-lindeskog i veksling med lågurtgranskog og fattigere skogtyper. Gran og furu inngår i blanding med ulike løvtrær, blant annet hassel, ask, spisslønn, gråor, svartor og rogn. Gammel lind inngår også.

Skogen er jevnt over gammel og det er noe død ved. På berg og i bratte skrenter finnes flere regionalt interessante arter, som bakkefiol –

Viola collina (en av tre kjente forekomster i kommunen), hengepiggrø – *Lappula deflexa* (NT) og bergasal – *Sorbus rupicola*, alle uvanlige arter i regionen. I sørenden av lokaliteten går det opp en liten bekkeløft. Her er det alm-lindeskog med blant annet spisslønn, hassel og ask. Langs bekken er det litt sumpskog. Registrerte arter omfatter blant annet mye trollbær – *Actaea spicata*, tåmurt – *Arabis glabra*, berberis – *Berberis vulgaris*, fingerstarr – *Carex digitata*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, mjødur – *Filipendula ulmaria*, blåveis – *Hepatica nobilis*, leddved – *Lonicera xylosteum*, maurarve – *Moehringia trinervia*, brunrot – *Schrophularia nodosa*, tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys* og skogvikke – *Vicia sylvatica*. Det er mye moserike bergvegger i området med interessante og kravfulle arter som kalkraggmose – *Anomodon viticulosus*, kammose – *Ctenidium molluscum*, matteblæremose – *Frullania tamarisci*, krypsilkemose – *Homalothecium sericeum*, rottehalmose – *Isoetecium alopecuroides*, flatfellmose – *Neckera complanata*, krusfellmose – *N. crispa*, lurvteppemose – *Porella cordaeana* og putevrimose – *Tortella tortuosa*. På bakken vokser *Plagiomnium undulatum* og den suboseaniske mosen *kystkransemose* – *Rhytidiadelphus loreus* er registrert med fine forekomster.

Artsmangfold: Hengepiggrø – *Lappula deflexa* (NT) er registrert. Potensialet for interessante arter av bakkelevende sopp, moser og lav er godt.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en større og dels gammel alm-lindeskog med rik bakke og med et potensial for forekomst av mange interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

74 Gjersjøelva

Viktig bekke drag – Verdi: B Areal : 63,43 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. Lokaliteten er slått sammen med BN00064076 (Gjersjøelva - kommunegrense-utløp) beliggende i Oslo kommune.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter Gjersjøelva, i fra Gjersjøen til utløpet i Oslofjorden. Deler av naturtypen ligger i Oslo kommune.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Elveløpet veksler mellom stilleflytende partier og dammer, små stryk og fosser. I elva finnes rik vann- og vannkantvegetasjon med arter som bekkeblom – *Caltha palustris*, kvasstarr – *Carex acuta*, sennegrass – *C. vesicaria*, elvesnelle – *Equisetum fluviatile*, mye sverdlilje – *Iris pseudacorus*, klourt – *Lycopus europaeus*, fredløs – *Lysimachia vulgaris*, kattehale – *Lythrum salicaria*, gul nøkkerose – *Nuphar lutea*, firblad – *Paris quadrifolia*, vasshøymol – *Rumex aquaticus*, gråselje – *Salix cinerea*, slyngsøtvier – *Solanum dulcamara* og brei dunkjelve – *Typha latifolia*. Langs elvebredden finnes en smal sone med stor svartor og litt hassel, stedvis med ganske rik undervegetasjon. På berg finnes moserike samfunn med blant annet svartburkne – *Asplenium trichomanes*, putevrimose – *Tortella tortuosa*, krypsilkemose – *Homalothecium sericeum*, gulbånd – *Metzgeria furcata* og krusfellmose – *Neckera crispa*. I selve elva finnes mosedeekte steiner, som har potensial for sjeldne mosearter. Nydammen under E18 ble undersøkt av Strand (1994, 1996) uten funn av amfibier. Ved utløpet av Nydammen er det stor svartor, og her vokser også langstarr – *Carex elongata*, sennegrass – *C. vesicaria*, sverdlilje – *Iris pseudacorus*, klourt – *Lycopus europaeus* og vasshøymol – *Rumex aquaticus*. Her finnes en smal sone med svartorskog. Trærne er til dels store og gamle. Litt hassel finnes også. Arter som springfrø – *Impatiens noli-tangere*, klourt – *Lycopus europaeus* og fredløs – *Lysimachia vulgaris* inngår i elvekanten. Elva er også laks- og sjøørretførende (Andersen 1995) og den har stor betydning for fuglelivet (Dale et al. 1998). Bl.a. er det mange observasjoner av strandsnipe (NT) i lokaliteten.

Artsmangfold: Strandsnipe (NT) observeres regelmessig, og en del andre interessante fulgearter er registrert på lokaliteten. Potensialet er ellers bra for insekter og moser.

Bruk, tilstand og påvirkning: Langs nedre del av elva er vegetasjonen temmelig påvirket av ulik aktivitet.

Del av helhetlig landskap: Sammen med kartlagte skoglokaliteter langs elva utgjør vassdraget et meget viktig område for biologisk mangfold.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet stort potensial for interessante arter av fugl, insekter og moser.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

75 Mastemyr vest 1

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: B Areal : 25,83 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen, og av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Gjersjøelva, nordover fra der Hvitebjørnveien krysser elven. Lokaliteten krysses av Mosseveien i nord. Lokaliteten fortsetter inn i Oslo (BN00064009, Gjersjøelva II), og samlet er dette en av de større svartorskogene i regionen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder en stor og velutviklet svartorsumpskog langs Gjersjøelva. Lokaliteten domineres av eldre svartor. Bjørk, selje, osp, spisslønn, ask og hegg inngår også. Det er gjennomgående lite død ved i lokaliteten. Området avgrenses mot elva hvor det er rik sump- og ferskvannsvegetasjon. Vegetasjon er frodig med flere karakteristiske og kravfulle sumpskogsarter, blant annet skal dronningstarr – *Carex pseudocyperus* (NT) være registrert. Utover dette finnes blant annet trollbær – *Actaea spicata*, bekkeblom – *Caltha palustris*, bekkemark – *Cardamine amara*, gullstjerne – *Gagea lutea*, springfrø – *Impatiens noli-tangere*, sverdlilje – *Iris pseudacorus*, hanekam – *Lychnis flos-cuculi*, klourt – *Lycopus europaeus*, fredløs – *Lysimachia vulgaris*, strutseving – *Matteuccia struthiopteris*, firblad – *Paris quadrifolia*, takrør – *Phragmites australis*, vasshøymol – *Rumex aquaticus*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*, skjoldbærer – *Scutellaria galericulata* og slyngsøtvier – *Solanum dulcamara*. Lokaliteten er også viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998).

Artsmangfold: Dronningstarr – *Carex pseudocyperus* (NT) skal være registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er kommet opp på tidligere kulturmark og er nå skjøttet og består av ensaldret storvokst svartor.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor svartorsumpskog med rik vegetasjon og gamle trær. Manglende elementer som død ved trekker noe ned, men lokaliteten er viktig for fugl, insekter og mange andre organismegrupper.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

76 Mastemyr vest 2

Gråor-heggeskog – Liskog/ravine Verdi: B Areal : 3,42 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen, og av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Gjersjøelva, mellom Gamle Mossevei og Hvitebjørnveien, sør for der Hvitebjørnveien krysser elva.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder gråor-heggeskog langs Gjersjøelva. Tresjiktet domineres av storvokst gråor, men også svartor og en del edelløvtrær. Mye død ved av gråor, samt noe av gran og hegg finnes. Lokaliteten er viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998).

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av gammel gråor-heggeskog med en del død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

77 Hvitebjørn NØ

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: B Areal : 13,47 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Hvitebjørn og følger Gjersjøelva i en smal kløft og fortsetter langs bekken mot vest opp mot Hvitebjørnveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Parallelt med Gjersjøelva ligger en rik svartorskog langs bekk i smal kløft, mens gammel lågurtgranskog inngår langs dalsidene. I nordre del drenerer bekken ut i smal kløft hvor storvokst granskog dominerer. Lokaliteten fortsetter langs bekken mot vest opp mot Hvitebjørnveien. Midtpartiet domineres av rik svartorsump med stagnerende grunnvann. Her er vegetasjonen artsrik med regionalt sjeldne arter som langstarr – Carex elongata og nubbestarr – C. loliacea. Arter som trollurt – Actaea spicata, bekkeblom – Caltha palustris, bekkekar – Cardamine amara, skogsnelle – Equisetum sylvaticum, mjødurt – Filipendula ulmaria og hestehov – Tussilago farfara inngår i sumpskogen. Mosefloraen er også rik og det er en del moserike bergvegger og død ved i form av grove læger i tidlige nedbrytningsstadier.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en artsrik sumpskog med grov død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

78 Hvitebjørn N

Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: C Areal : 15,31 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Hvitebjørn, ca 2 km vest for Kolbotn, og går langs bekk fra Hvitebjørnveien og vestover til beite.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av smal sone med blandingskog med storvokst gran og løvskog langs bekk fra Hvitebjørnveien og vestover til beite. En del stor osp inngår foruten hassel, lind, spisslønn og ask til dels av store dimensjoner. I beitekanter inngår også en liten løvskogsdominert kolle, og en del bergskrenter og steinblokker skaper større variasjon. Nærmest gården er det en del store edelløvtrær, men dette området beites hardt av hest. Floraen er artsrik med blant annet trollbær – Actaea spicata og blåveis – Hepatica nobilis. På steiner og ved basis av løvtrær finnes interessante mosearter som glansmose – Homalia trichomanoides og flatfellmose – Neckera complanata.

Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av området beites av hest.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik edelløvskog, artsrik flora og gamle edelløvtrær.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

79 Hvitebjørn 2

Rik edellauvskog – Alm-lindeskog Verdi: C Areal : 29,28 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt på vest- og østsiden av jorden ved Hvitebjørn, ca 2 km vest for Kolbotn.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rundt jorden på Hvitebjørn finnes rik edelløvskog. I sør har skogen karakter av gjengroende hagemark, som delvis beites av hest i dag. Litt innplantet gran inngår også her. Helt sør i beitekant inngår også tørrengfragmenter og urterik kant med fløyelsmarikåpe – Alchemilla glaucescens, hvitmaure – Galium boreale, marianøkleblom – Primula veris og skogkløver – Trifolium medium. I tresjiktet er det en god del lind og hassel, stor osp og spisslønn. Fuktige partier med svartor finnes også. Flere bergvegger har rik moseflora, kalkraggmose – Anomodon viticulosus, rottehallemose – Isoetium alopecuroides, gulbånd – Metzgeria furcata, flatfellmose – Neckera complanata og broddfagermose – Plagiomnium cuspidatum er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning: I sør har skogen karakter av gjengroende hagemark, og deler av lokaliteten beites av hest. Noe innplantet gran forekommer.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik edelløvskog av ung karakter, men med eldre trær og med fragmenter av tørreng og kantkratt.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Det kan også være aktuelt å åpne opp deler av lokaliteten og skjytte den som en beitehage.

.....

80 Hvitebjørn

Store gamle trær – Ask Verdi: **B** Areal : 6,3 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på tunet på Hvitebjørn, ca. 2 km vest for Kolbotn.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På tunet på Hvitebjørn står flere gamle asketrær med rikkbarksarter. Den regionalt sjeldne laven bleikdoggnål - *Sclerophora nivea* (NT) finnes her. Hjelmbleremose - *Frullania dilatata*, ekornmose – *Leucodon sciurioides*, putehårstjerne - *Syntrichia ruralis* og flere andre rikkbarksarter finnes også. Det ble ikke notert om trærne hadde hulheter eller død ved - som er meget viktige elementer for insekter og sopp tilknyttet store gamle trær.

Artsmangfold: Bleikdoggnål - *Sclerophora nivea* (NT) og ask (NT).

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) på bakgrunn av forekomsten av bleikdoggnål - en art som indikerer forekomst av gamle asketrær. Trærne bør undersøkes på nytt for en sikrere vurdering av lokalitetens grenser og verdi.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av og nedfallen død ved bør få bli liggende eller flyttes til en egnet lokalitet. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Eventuelle hulheter må ikke tettes igjen.

.....

81 Hvitebjørn Ø

Rik edellauvskog – Verdi: **C** Areal : 15,69 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av kolle øst for Hvitebjørn, ca 2 km vest for Kolbotn.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På sørsiden av kolle vest for gården finnes rik edelløvskog med mye ask og en del lind, hassel og spisslønn. Arter som fagerkløkke – *Campanula persicifolia*, hvitmaure – *Galium boreale*, blåveis – *Hepatica nobilis*, marianøkleblom – *Primula veris* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys* inngår.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er beitet av hest og er nokså hagemarkpreget.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik edelløvskog med rik flora, men uten død ved, gammelskog og uten funn av elementer og interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

82 Hvitebjørn SØ

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **B** Areal : 15,72 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for et lite beite sørøst for Hvitebjørn, ca. 2 km vest for Kolbotn. Mot sør er avgrensingen mer diffus i overgang mot tørrere typer på småkoller og hogstflater i skogen ned mot den rike sumpskogen ved Nydammen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en sumpskogslokalitet sør for et lite beite sørøst for Hvitebjørn. Her finnes rik sumpskog med artsrik flora. Skogen domineres av gammel gran og svartor. Stor osp inngår også. Flere regionalt sjeldne arter er registrert, her nevnes spesielt storrap – *Poa remota*, foruten en lang rekke kravfulle arter som bekkeblom – *Caltha palustris*, bekkedarse – *Cardamine amara*, langstarr – *Carex elongata*, slirestarr – *C. vaginata*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, grøftesoleie – *Ranunculus flammula*, krypssoleie – *R. repens* og skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*.

Artsmangfold: Lokaliteten og området som helhet har stort potensial for høyt mangfold.

Bruk, tilstand og påvirkning: Sumpskogen er delvis beita og går i nordenden gradvis over i beita skog.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må ses i sammenheng med Nydammen S samt øvrige sumpskoger i dette området.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en velutviklet rik sumpskog med artsrik flora.

Skjøtsel og hensyn: Hogstpåvirkede lokaliteter bør restaureres. Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

83 Gjersjø bru SØ

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **B** Areal : 12,58 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Gjersjø bru, på østsiden av Gjersjøbruåsen, ca 1,5 km vest for Kolbotn.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rik sumpskog med relativt ung skog.

Artsmangfold: Dronningstarr - *Carex pseudocyperus* (NT) skal være registrert i området.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av mangelfull informasjon, men den kan ha høyere verdi og bør undersøkes nærmere.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

84 Bråtan N

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **A** Areal : 18,44000000000001 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Bråtan i forlengelsen av Delingsdalen på sørøstsiden av E18. Lokaliteten strekker seg fra veiskjæringa ved E18 et stykke sørover i en trang dal hvor den avgrenses av hogstflate i sørøst.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter en sumpskog i forlengelsen av Delingsdalen på sørøstsiden av E18. Den er egentlig en forlengelse av den rike sumpskogen i lokalitet 9, men splittes av E18. Til dels er granskogen storvokst, men skogen omkring er delvis hogd. Gran og stor svartor dominerer. I sumpskogen inngår en rekke kravfulle arter, blant annet en stor forekomst med nubbestarr – *Carex loliacea* og dronningstarr – *C. pseudocyperus* (NT). Ellers inngår blant annet vassreverumpe – *Alopecurus aequalis*, langstarr – *Carex elongata*, sumphaukskjegg – *Crepis paludosa*, mannasøtgras – *Glyceria fluitans* og skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*. På gran vokser gammelgranlav – *Lecanactis abietina*.

Artsmangfold: En større forekomst av dronningstarr (NT) og nubbestarr forekommer.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er grøftet og tilplantet, men grunnvannet står fortsatt høyt.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av en rik svartorsumpskog med gammel svartor og gode forekomster av dronningstarr og nubbestarr.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Det bør vurderes om grøftene skal fylles igjen og om granforyngelse bør fjernes.

.....

85 Bråtan NV

Rik edellausvskog – Verdi: **C** Areal : 6,69 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av jordet ved Bråtan.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På nordsiden av jordet ved Bråtan ligger en liten linde- og hasselforekomst der en liten kløft munner ut på jordet. Storvokst gran inngår også. Lokalitetene ligger i bratt skrent med litt rasmark og høye bergvegger. I bunnen av kløfta inngår også en liten svartorsump med kravfulle sumpskogsarter.

Artsmangfold: Lokaliteten har potensial for interessante sopp og insektarter og bør undersøkes nærmere.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en liten forekomst med rik edellausvskog og svartorsump.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

86 Skjervika sør 1

Rik sumpskog – Viersump i lavlandet Verdi: **B** Areal : 15,78 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordvest for Sandvika i nedre del av bekke drag og rundt dammen ved Skjervika, ned mot Gamle Mossevei.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av gråselje- og orekratt i sump rundt dammen ved Skjervika. En del kravfulle sumparter inngår, blant annet bekkeløp – *Cardamine amara*, bekkeblom – *Caltha palustris*, mjødur – *Filipendula ulmaria*, sverdlilje – *Iris pseudacorus* og skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*. Skogtypen er sjelden i kommunen, og tas med også fordi den inngår i et kompleks av viktige skogtyper rundt Skjervika. Gråseljekratt regnes for øvrig som en truet vegetasjonstype (VU, noe truet).

Bruk, tilstand og påvirkning: Sumpkrattet er påvirket av utfylling og det er en del ruderatarter, samt en del søppel.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten og dens verdi må ses i sammenheng med de andre tiliggende lokalitetene ved Skjervika.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en truet vegetasjonstype og flere kravfulle karplantearter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Søppel bør fjernes fra lokaliteten.

.....

87 Skjervika V

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: **C** Areal : 13,47 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for skogkledd ravine som munner ut i Skjervika, nordvest for Sandvika. I øvre del grenser lokaliteten til hogstflate.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av storvokst lågurtgranskog i bratt skrent på vestsida av Skjervika. Stedvis langs et bekkeløp og sigevannspåvirkede forsenkninger finnes sumpskogspartier og fragmenter av gråorskog inngår i flate partier i en liten kløft mot vest. Her er det også noe strutseving – *Matteuccia struthiopteris*. Andre arter inkluderer blant annet fingerstarr – *Carex digitata*, hvitbladtistel – *Cirsium helenioides*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, liljekonvall – *Convallaria majalis*, firblad – *Paris quadrifolia*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica* og skogfiol – *Viola riviniana*. Flere markerte bergvegger blant annet med svartburkne – *Asplenium trichomanes* og putevrimose – *Tortella tortuosa* finnes. Den suboseaniske mosen kystkransemose – *Rhytidiadelphus loreus* inngår, og øverst i skrenten er det noe lind – *Tilia cordata*.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten og dens verdi må ses i sammenheng med de andre tiliggende lokalitetene ved Skjervika.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av gammel granskog med brudd i dødvedkontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

88 Skjervika sør 2

Gråor-heggeskog – Liskog/ravine Verdi: **B** Areal : 13,84 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skogkledd ravine mellom Åsen og Sandvika, langs bekken som munner ut i Skjervika. I øvre del grenser skogen til hogstflate.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs bekken som munner ut i Skjervika er det i nedre del et område med velutviklet gråor-heggeskog. I tillegg til stor gråor finnes også stor gran. Mye læger ble også observert både av gran og gråor. Av arter kan nevnes skogburkne – *Athyrium filix-femina*, bekkeblom – *Caltha palustris*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, fugleteig – *Gymnocarpium dryopteris*, mye strutseving – *Matteuccia struthiopteris*, firblad – *Paris quadrifolia*, hengeving – *Phegopteris connectilis*, krypsleie – *Ranunculus repens*, skogstjerneblom – *Stellaria nemorum* og hestehov – *Tussilago farfara*. Dette er trolig kommunens best utviklede gråor-heggeskog, og den utgjør sammen med andre skoglokaliteter og dammen ved Skjervika en liten konsentrasjon av viktige naturtyper.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten og dens verdi må ses i sammenheng med de andre tiliggende lokalitetene ved Skjervika.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av gammel og til dels rikere gråor-heggeskog med mye død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

89 Torbjørnrud

Naturbeitemark – Verdi: **C** Areal : 2,64 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for den nedlagte plassen Torbjørnrud.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ved den nedlagte plassen Torbjørnrud finnes små, gjengroende engfragmenter i veksling med bergknauser, som tidligere trolig ble brukt til slått eller beite. Artsrik flora finnes fortsatt med blant annet engknoppurt – *Centaurea jacea*, engnellik – *Dianthus deltoides*, hvitmaure – *Galium boreale*, rødknapp – *Knautia arvensis*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare*, tiriltunge – *Lotus corniculatus*, engtjæreblom – *Lychnis viscaria*, smalkjempe – *Plantago lanceolata* og småengkall – *Rhinanthus minor*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området ble tidligere brukt til slått eller beite.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rester etter slåttemark/beitemark med rik flora.

Verdien vil sannsynligvis øke betraktelig hvis hevdregimet gjenopptas.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ryddes for løvoppslag og beite, eller aller helst slått av engpartiene, bør innføres. Lokaliteten må ikke gjødsles.

.....

90 Torbjørnrud vest

Naturbeitemark – Verdi: **C** Areal : 1,66 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Torbjørnrud, på nordvestsiden av bygningene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vest for Torbjørnrud ligger et lite område med tørrengfragmenter og bergknauser som tidligere trolig ble brukt til slått eller beite. Små fragmenter med ganske rik flora er registrert, dunhavre – *Avenula pubescens*, engknoppurt – *Centaurea jacea*, engnellik – *Dianthus deltoides*, hvitmaure – *Galium boreale*, gulmaure – *G. verum*, rødknapp – *Knautia arvensis*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare*, engtjæreblom – *Lychnis viscaria*, smalkjempe – *Plantago lanceolata*, skogkløver – *Trifolium medium* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*. Artsrik engvegetasjon er sjelden i kommunen og dette er et av få steder hvor dette fortsatt finnes. Siden jorda ikke drives lenger vil gjengroingen fortsette og engfloraen vil på sikt endres.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området ble tidligere trolig brukt til slått eller beite.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rester etter slåttemark/beitemark med rik flora.

Verdien vil sannsynligvis øke betraktelig hvis hevdregimet gjenopptas.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ryddes for løvoppslag og beite, eller aller helst slått av engpartiene, bør innføres. Lokaliteten må ikke gjødsles.

.....

91 Mellom Oppegård Østre og E18

Gråor-heggeskog – Liskog/ravine Verdi: **C** Areal : 13,93 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Oppegård Østre og grenser i øst mot E18.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området inneholder godt utviklet gråor-heggeskog langs bekk i leirravine. Gran, selje og osp, samt noe edelløvtrær og hasselkratt kommer inn på kantene. Mye død ved av gråor i bunn av ravinen, også noe død ved av hassel, gran, selje og bjørk på kantene. Høye østvendte bergvegger finnes.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av mye død ved, men med brudd i dødvedkontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

92 Furuåsen N

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: C Areal : 38,34000000000003 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Furuåsen, ca 700 m øst for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av ensjiktet rik granskog langs bekkesøkk med flate partier på sidene. Det er registrert mye liggende og stående død ved, der de fleste lægene er i tidlig nedbrytningsstadium. Foryngelse i gjenner gir stedvis et noe bedre sjikt. Rik eldre granskog med død ved er sjeldent i regionen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området krysses i nord av en kraftlinjegang. Størstedelen av lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik granskog med en del død ved, men med brudd i kontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

93 Øst for Grønmo

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: C Areal : 20,46 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Måkeskjær og lysløype øst for Oppegård kirke, og utgjør et skogsparti mellom dyrket mark i nord og sør.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av ensjiktet rik granskog langs bekkesøkk og på et flatt parti øst for bekken. Granskogen er i sammenbruddsfase og det er registrert en del liggende og stående død ved. De fleste lægene er i tidlig nedbrytningsstadium.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området krysses helt i sørøst av lysløype.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik granskog med brudd i dødvedkontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

94 SØ for Dal

Gammel barskog – Verdi: C Areal : 5,08 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Gamle Mossevei og E18, sørøst for Dal.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av eldre barskog i østvendt skråning. Skogen har varierende sjiktning, også med en del gamle trær, og noe død ved som følge av vindfall. Området er vindutsatt grunnet ungsog og flater rundt biotopen.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eldre granskog med brudd i dødvedkontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

95 Furuåsen Ø

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: C Areal : 4,24 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Kolmleåsen og Kurud, og vest for E18.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av eldre ensjiktet granskog. En del død ved av gran, der mesteparten er i tidlige nedbrytningsstadier finnes, noen få stokker er mer nedbrutte.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av gammel granskog med brudd i kontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

96 Kurud V

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: B Areal : 65,36 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Kurud og grenser mot E18 i vest.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av et kolleparti med eldre sjiktet barskog. Gran dominerer, men det er også noe innslag av furu, bjørk og gråor. Skogen er trolig en av de eldste og største gammelskogskvalitetene i kommunen. Død ved i alle nedbrytningsstadier finnes, og tidlige nedbrytningsstadier dominerer.

Artsmangfold: Det er gjort to funn av den sjeldne beversagsopp *Lentinellus castoreus*. Potensial for at interessante arter knyttet til død granved kan forekomme.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av gammel granskog med en god dødvedkontinuitet.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

97 Søndre Oppegård Søndre 7

Rik sumpskog – Verdi: C Areal : 7,33 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 700 m sør for Oppegård kirke, øst for Sjødølveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av et flatt parti med svartorsumpskog omkranset av jorder. Skogen er relativt ung i vest, noe bedre utviklet i øst og det er stort innslag av bjørk og gran. Noe død ved finnes, men mest av små dimensjoner.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en liten forekomst med relativt ung svartorsumpskog uten påviste spesielle elementer eller arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

98 Sjødalen

Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: B Areal : 44,18 daa

Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt av BioFokus ved Sigve Reiso i 2004. Lokalitetsbeskrivelse og grenser er oppdatert av BioFokus ved Anders Thylén etter feltbesøk høsten 2011, i forbindelse med kartlegging av edelløvsog på oppdrag fra DN.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Sjødal sør i Oppegård kommune, og utgjør en kløft langs et bekkedrag som fører vestover ned mot Sjødølstrand.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik blandingsskog, med gradienter fra rik gransog og edelløvsog ved bekken og mot fattigere gransog og karrig furusog på sidene. På nordsiden er det til dels bratte, blokkrike skrånninger og bergvegger hvor furusog tar over oppover. Mot sør er det svakere helling opp mot en rygg med moserik gransog. Langs selve bekken er det en del bratte partier med mye fall og bergvegger. Stedvis er det flattere partier med dypere og rikere jordsmonn. Edelløvtrær som lind, spisslønn, ask, svartor og alm forekommer rikelig. Andre partier er mer grandominerte. En del hassel finnes i et spredt busksjikt, mens feltsjiktet er lågurtpreget. Skogen er flersjiktet, og stedvis er det relativt mye død ved, spesielt av gran men også av andre treslag. Grove graner (65 cm i brysthøydiameter) forekommer i de produktive partiene langs bekken. Enkelte grove linder finnes også i nedkant av bergveggene.

Artsmangfold: Stedvis rik lågurtflora med arter som blåveis, skogstjerneblom, vendelrot og hvitbladtistel. I fattigere gransog vokser knerot. Av vedboende sopp finnes på gran bl.a. rosenkjuke (NT iht. Norsk rødliste 2010), granrustkjuke og vasskjuke. Gammelgranlav vokser på en del graner.

Bruk, tilstand og påvirkning: I og inntil øvre deler av lokaliteten er det gjort noen mindre hogster. Her går også en liten gangvei, og rester etter en gammel jerngrube finnes i området.

Verdivurdering: Rik blandingsskog med relativt godt utviklet naturskogspreg. Et par signalarter og en rødlisteart knyttet til død ved finnes. Vurderes som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikles fritt, uten noen form for skoglige inngrep, utover nødvendig vedlikehold av gangsti.

.....

99 Sjødalstrand S

Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: C Areal : 10,56 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Sjødalstrand, helt sørvest i Oppegård kommune.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en vestvendt li i et grunt søkk. Skogen er ensjiktet, det er innslag av bjørk, selje og osp og det er registrert mye død ved i området. Fattige vegetasjonstyper dominerer, men noe rikere typer finnes i fuktig.

Artsmangfold: Granrustkjuke – Phellinus ferrugineofuscus skal være registrert i området.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av rikere blandingsskog med noe død ved, men manglende kontinuitet og spesielle elementer og arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

100 Tussetjern nord

Rik sumpskog – Viersump i lavlandet Verdi: C Areal : 2,470000000000002 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nordenden av Tussetjern ved Slorene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I nordenden av Tussetjern finnes litt gråseljekratt og sumpvegetasjon med bekkeblom – Caltha palustris, flasketarr – Carex rostrata, elvesnelle – Equisetum fluviatile, mjødurt – Filipendula ulmaria, sverdlilje – Iris pseudacorus, fredløs – Lysimachia vulgaris, bukkeblad – Menyanthes trifoliata, myrhatt – Potentilla palustris, skogsivaks – Scirpus sylvaticus og sjøsivaks – Schoenoplectus lacustris. Gråseljekratt regnes for øvrig som en truet vegetasjonstype (VU, noe truet), som dekker små arealer og er sjelden i kommunen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Innenfor krattet og sumpen finnes beitemark som beites hardt av hest.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet et lite og noe påvirket område med en truet vegetasjonstype.

Manglende funn av interessante arter og elementer trekker ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

101 Tussetjern

Rik edelløvsog – Verdi: C Areal : 10,26 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for badeplassen ved Tussetjern ved Slorene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lite edelløvsogsområde nord for badeplassen ved Tussetjern. Skogen er stort sett ung og nokså påvirket av ferdsel og hogst. Eik, ask, alm, spisslønn og hassel inngår i tresjiktet, flere av trærne er temmelig store.

Undervegetasjonen er relativt fattig med blant annet markjordbær – *Fragaria vesca*, kratthumleblom – *Geum urbanum*, lundrapp – *Poa nemoralis*, skogkløver – *Trifolium medium* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er stort sett ung og nokså påvirket av ferdsel og hogst.

Fremmede arter: Det finnes en del fremmede treslag som edelgran, platanlønn og hestekastanje på lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet et lite og mye påvirket område, ung skog og manglende funn av interessante arter og elementer.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

102 Tussetjern sør

Rik sumpskog – Viersump i lavlandet Verdi: **C** Areal : 2,83 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved utløpet av Tussebekken i Tussetjern ved Slorene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ved utløpet av Tussebekken i sør finnes litt gråseljekratt og sumpvegetasjon med vassgro – *Alisma plantago-aquatica*, svartor – *Alnus glutinosa*, kvasstarr – *Carex acuta*, flasketarr – *C. rostrata*, elvesnelle – *Equisetum fluviale*, mjørdurt – *Filipendula ulmaria*, sverdlilje – *Iris pseudacorus*, fredløs – *Lysimachia vulgaris*, kattehale – *Lythrum salicaria*, gråselje – *Salix cinerea* og istervier – *S. pentandra*. Gråseljekratt regnes som en truet vegetasjonstype (VU, noe truet), som dekker små arealer og er sjelden i kommunen.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en liten forekomst av den truede vegetasjonstypen gråseljekratt.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

103 Tussebekken

Viktig bekkedrag – Parti som binder sammen andre naturmiljøer Verdi: **C** Areal : 17,16 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Slorene, langs Tussebekkens nordre del.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs Tussebekkens nordre del finnes edelløvskog i en smal sone langs bekken, hvor alm, ask og hassel inngår i tresjiktet. Stedvis har skogen lågurtkarakter med stor gran, og på flatere partier hvor elva er mer stillegående, kommer svartorsumpskog inn, særlig i nedre del. Området er stedvis bratt og utilgjengelig og ligger inneklemt mellom veier og bebyggelse og preges av det. På tross av sterk påvirkning anses bekkedraget som viktig, da det inneholder sjeldne vegetasjonstyper og binder Tussetjern sammen med det viktige våtmarksområdet i Slorene. Det har også betydning for fuglelivet, blant annet ble fossefall observert og vannfaunaen kan være rik.

Bruk, tilstand og påvirkning: I Tussebekken har det vært to sagbruk og en mølle og gamle ruiner etter bygninger og anlegg finnes.

Området ligger inneklemt mellom veier og bebyggelse og preges av det. Hageavfall tipper flere steder.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet stor påvirkning, men lokaliteten kan inneha interessante arter og bør undersøkes nærmere.

Skjøtsel og hensyn: Ytterligere menneskelige påvirkninger må unngås. Skog og kratt må få utvikle seg fritt.

.....

104 Langslora øst

Rik sumpskog – Verdi: **B** Areal : 23,26 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av våtmarka i Langslora, i nedre del av Tussebekken og Greverudbekken.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På østsiden av våtmarka i Langslora, i nedre del av Tussebekken og Greverudbekken dominerer svartorskog og gråseljekratt. Mye av skogen er ung og tett, men også meget stor og gammel gråor og svartor finnes. På vegetasjonskart utarbeidet av Borch & Eggestad (2002) angis vegetasjonstypene viersump, gråseljeutforming, som er regnet som en noe truet (VU) vegetasjonstype (Aarrestad et al. 2001), og en kombinasjon av gråorheggeskog og svartorstrandskog. Sistnevnte er regnet som sterkt truet (EN). Langs Greverudbekkens nedre del finnes også en del stor svartor og en velutviklet populasjon med skavgras – *Equisetum hyemale*. Øvre del langs bekken er mer påvirket og har lavere verdi. Hegg – *Prunus padus* er også vanlig i tresjiktet, mens litt hassel – *Corylus avellana* og osp – *Populus tremula* kommer inn på tørr mark oppe i skråningene. Ask inngår også i tresjiktet. På grunn av den tette unge skogen er undervegetasjonen flere steder ganske glissen. Av arter kan nevnes kratthumleblom – *Geum urbanum*, mannsøtgras – *Glyceria fluitans*, mjørdurt – *Filipendula ulmaria*, humle – *Humulus lupulus*, fredløs – *Lysimachia vulgaris*, gaukesyre – *Oxalis acetosella*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica* og korsved – *Viburnum opulus*. Området har stor betydning for fuglelivet (Dale et al. 1998).

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er påvirket av tilgrensende bebyggelse, men viktig som randsone og del av de viktige naturområdene langs Tussebekken og Langslora.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av truede vegetasjonstyper og en del gamle trær.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

105 Langslora

Rik kulturlandskapssjø – Næringsrik utforming Verdi: **A** Areal : 192,12 daa

Innledning: I tillegg til flere kartlegginger av biologisk mangfold innenfor området, er lokaliteten feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Langslora er et viktig våtmarksområde ved utløpet av Dalselva, Tussebekken og Greverudbekken. Naturtypen ligger delvis i Ås kommune.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen består av ulike sumptyper: takrør-sivakssump, elvesnelle-starrsump, rikstarrsump og flytebladvegetasjon. Rikstarrsump regnes som en sterkt truet (EN) vegetasjonstype. Langslora er sterkt preget av gjengroing. Arter som kvass-starr – *Carex acuta*, selsnepe – *Cicuta virosa*, elvesnelle – *Equisetum fluviatile*, sverdlilje – *Iris pseudacorus*, takrør – *Phragmites australis*, vasshøymol – *Rumex aquaticus*, gulfrøstjerne – *Thalictrum flavum* og dunkjevle – *Typha latifolia* inngår. Den rødlistede arten myrstjerneblom – *Stellaria palustris* (EN) er registrert i sumpvegetasjonen. 82 arter av hekkefugl, hvorav flere rødlistearter, er registrert i Slorene (Borch & Eggstad 2002).

Artsmangfold: Området er kjent for et svært rikt fugleliv og er en viktig rasteplass for trekkende fugl. Det er observert 137 fuglearter i området, hvorav 14 er rødlistet. Dette gjør området til en svært viktig viltbiotop. Myrstjerneblom (EN) er registrert på lokaliteten i 1993.

Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere ble området benyttet til starrslått og beite. Boligutbyggingen har også medført kraftig tilførsel av kloakk, og dette har bidratt til oppslamming og næringstilførsel.

Verdivurdering: Lokaliteten utgjør hoveddelen av et svært viktig fugleområde og vurderes derfor som svært viktig (A-verdi). En sterkt truet planteart er påvist i området.

Skjøtsel og hensyn: I deler av lokaliteten bør slått og til dels beite gjeninnføres. Rensing av eventuelle utslipp fra nærliggende bebyggelse må vurderes.

106 Holen V

Artsrik veikant – Verdi: **B** Areal : 4,8 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en sørvendt skrent langs grusveien ved Holene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På lokaliteten finnes bergvegger og kantvegetasjon i overgang mot lågurtgranskog som raskt går over i fattigere barskogstyper oppover lia. Her står en liten bestand av stavklokke – *Campanula cervicaria* (NT) sammen med blant annet rødknapp – *Knautia arvensis*, skogflatbelg – *Lathyrus sylvestris*, skogkløver – *Trifolium medium* og legeveronika – *Veronica officinalis*. Under en ekskursion med Norsk botanisk forening i 1993 ble også lakrismjelt – *Astragalus glycyphyllos*, marianøklebånd – *Primula veris* og bakketimian – *Thymus pulegioides* funnet langs veien.

Artsmangfold: Stavklokke (NT) og bakketimian er regionalt sjeldne arter med svært få funn i Follo.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en sørvendt og rik kantvegetasjon med funn av interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør skjøttes med tanke på å fremme tørrengforekomstene. Lokaliteten kan slås ekstensivt og ryddes for løvoppslag, men må ikke gjødsles.

107 Greverudbekken øvre del

Rik edellauskog – Alm-lindeskog Verdi: **C** Areal : 23,8 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Greverudbekken, helt sørøst i kommunen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs Greverudbekken finnes et område med flere skogtyper. Langs bekken inngår smale soner med rik sumpskog dominert av svartor og stedvis en del ask. Lenger fra bekken i dalsidene finnes edelløvskog hvor særlig hassel og ask er vanlig, men noe alm, spisslønn og gråor inngår også. Stor gran finnes jevnt over hele området og stedvis er det dominans av selje eller osp. Skogen er nokså rotete og påvirket av bebyggelse på alle kanter, men det er til dels ganske bratt og uframkommelig langs bekken. Undervegetasjonen er relativt fattig, men alperips – *Ribes alpinum*, storklokke – *Campanula latifolia*, hvitbladtistel – *Cirsium helenioides*, hundekveke – *Elymus repens* og skogsvinerot – *Stachys sylvatica* ble registrert. Oppover bekken og nær bebyggelsen avtar områdets verdi.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er nokså rotete og påvirket av bebyggelse på alle kanter.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rike skogtyper. Skogen er en god del påvirket og ikke spesielt rik. Oppover bekken og nær bebyggelsen avtar områdets verdi.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

108 Holene N

Gammel barskog – Verdi: **C** Areal : 13,98 daa

Innledning: Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Greverudlia og nord for Gjersjøveien, helt sørøst i kommunen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder grunnlendt barblandingskog på sørvestvendte bergknauser. Furu dominerer i tresjiktet, men gran inngår også. Skogen har relativt god aldersspredning. Spredte forekomster av stående og liggende død ved samt gamle trær finnes.

Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av lokaliteten ser ut til å være hogd (Norgeskart 2012).

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) for arter knyttet til eldre furuskog og tørr død ved av furu. Lokaliteten må inventeres på nytt da det kan se ut som at den er hogd.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

109 Nyjordåsen V

Rik sumpskog – Verdi: C Areal : 23,13 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Nyjordåsen, på sørøstsiden av Gjersjøen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Område med nokså påvirket rikere sumpskog i grunne kløfter og langs bekkeled, samt noe lågurtgranskog på tørrere partier. En del storvokst gran og svartor dominerer skogbildet og noe død ved finnes. I bunnsjiktet inngår kravfulle moser.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er nokså påvirket.

Verdivurdering: Området vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en nokså påvirket rik sumpskog.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

110 Kurud SØ

Gråor-heggeskog – Flommarksskog Verdi: C Areal : 3,26 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten gråorheggeskog ned mot Gjersjøen, sørøst for Kurud.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten gråorheggeskog ned mot Gjersjøen ved Kurud. Foruten gråor inngår maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, springfrø – *Impatiens noli-tangere* og strutseving – *Matteuccia struthiopteris*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er en del påvirket.

Verdivurdering: Skogen er liten og påvirket og vurderes som lokalt viktig (C-verdi), men må ses i sammenheng med den rike sump- og sumpkrattvegetasjonen nord for lokaliteten (lokalitet 111). Samlet gir dette større variasjon og økt verdi til området sett under ett.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

111 Kurud Ø

Rik sumpskog – Viersump i lavlandet Verdi: B Areal : 8,34 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Kurud, ned mot bredden av Gjersjøen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av rik sumpvegetasjon, samt litt gråseljekratt og oreskog i liten vik i Gjersjøen øst for Kurud (figur 13). Deler av skogen og krattet er hogd, men feltsjiktet inneholder en rekke næringskrevende arter. Sumpvegetasjonen i bukta er imidlertid godt utviklet. Registrerte arter omfatter blant annet vassgro – *Alisma plantago-aquatica*, myrkongle – *Calla palustris*, kvass-starr – *Carex acuta*, selsnepe – *Cicuta virosa*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, springfrø – *Impatiens noli-tangere*, sverdlilje – *Iris pseudacorus*, hanekam – *Lychnis flos-cuculi*, klourt – *Lycopus europaeus*, vasshøymol – *Rumex aquaticus*, skjoldbærer – *Scutellaria galericulata*, slyngsøtvier – *Solanum dulcamara*, bekkeveronika – *Veronica beccabunga* og veikveronika – *V. scutellata*. Fra tidligere er den rødlistede arten myrstjerneblom – *Stellaria palustris* (EN) registrert ved Kurud, sannsynligvis i denne bukta, men arten ble ikke påvist ved feltbefaring. Skogen og gråseljekratt bør få anledning til å reetableres.

Artsmangfold: Myrstjerneblom (EN) er antagelig registrert i området i 1921.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en truet vegetasjonstype og en rik artssammensetning. Hogst og andre menneskelige påvirkninger trekker verdien ned.

Skjøtsel og hensyn: Skogen og gråseljekratt bør få anledning til å reetableres.

.....

112 Øst for Østre Greverud

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: B Areal : 69,63 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag:

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området inneholder relativt gammel granskog i vestvendt dalside og grunn kløft.

Lågurtgranskog dominerer, men også fattigere typer inngår. Langs bekk i øvre del er det små sumpskogspartier. Det er blant annet mye blåveis – *Hepatica nobilis*. Mye død ved finnes, vesentlig gran i ulike dimensjoner, det meste lite nedbrutt.

Artsmangfold: Den rødlistede arten skaffjordsstjerne – *Geastrum pectinatum* (NT) er tidligere registrert i eller rett ved den nye lysløypestraséen. Status for arten er usikker, den ble ikke sett under feltbefaring i 2004. Det er likevel egnede voksesteder for arten i området fortsatt.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er preget av friluftsliv, med flere stier og en nylig anlagt lysløype som går gjennom sørlige deler av lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av dels rik og gammel granskog med mye død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

113 Laugskollen

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: **C** Areal : 43,26 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med MiS-registreringene i 2004. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter østsiden av Laugskollen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I bunnen av dalen drenerer det en liten bekk, og det er flere bergvegger. Tresjiktet preges av høystammet og ganske jevnaldret gran, men også en god del løvtrær inngår. Alder og skogstruktur varierer en del, best utviklet er skogen i nord. Der er det relativt høy konsentrasjon av død ved, og vegetasjonen er i tillegg rik.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av gammel granskog. Kontinuitetsbrudd, manglende artsfunn og ikke spesielt gammel skog trekker ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

114 Grytetjern

Intakt lavlandsmyr i innlandet – Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper Verdi: **C** Areal : 12,88 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Grytetjern er et lite tjern på grensa til Ski, sør for Fløysbonn. Avgensningen går midt i tjernet og følger kommunegrensen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I tjernet er det store matter med flytetorv. Her dominerer ombrotrof og fattig myrvegetasjon med blant annet hvitlyng - Andromeda polifolia og hvitmyrak – Rhynchospora alba. Det er også mye pors – Myrica gale og takrør – Phragmites australis. Langs bredden finnes fragmenter av rikere sumpskog og kratt med svartor – Alnus glutinosa og gråselje – Salix cinerea. Her inngår arter som myrkongle - Calla palustris, langstarr – C. elongata, gulstarr – C. flava, kornstarr – C. panicea, flaskestarr – C. rostrata, sennegrass – C. vesicaria, sumphaukskjegg – Crepis paludosa, mjødurt – Filipendula ulmaria, sverdlilje – Iris pseudacorus og skjoldbærer – Scutellaria galericulata. Lokaliteten inneholder både elementer fra intakt lavlandsmyr, ferskvannssump, vannvegetasjon og rik sumpskog og vierkratt.

Artsmangfold: Små tjern og innsjøer under marin grense i Follo er ofte artsrike og kan inneholde sjeldne, truede, eller plantegeografisk/økologisk interessante arter. Det er fisk i vannet og ingen amfibier ble observert i 2009 (Sandaas 2011). Vannflora er ikke undersøkt.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en forholdsvis intakt fattigmyr med innlag av rik sumpskog.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

115 Dam ved Korsveien

Dam – Eldre fisketom dam Verdi: **C** Areal : 2,15 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Korsveien og sør for Tverrveien rett nord for opparbeidet areal.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam preget av gjengroing i gjengroende kulturlandskap. I dammen vokser blant annet mannasøtgras – Glyceria fluitans, andemat – Lemna minor, myrhatt – Potentilla palustris, skogsivaks – Scirpus sylvaticus, slyngsøtvier – Solanum dulcamara og en del dunkjeve – Typha latifolia. Ingen amfibier ble observert, og på grunn av gjengroing og skrot har dammen kun lav lokal verdi.

Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er i ferd med å gro igjen og har en del skrot.

Verdivurdering: Ingen amfibier ble observert, og på grunn av gjengroing og skrot har dammen kun lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fjerning av søppel. Det bør vurderes om dammen skal graves opp.

.....

116 Kolbotntjern

Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og myrpytter Verdi: **A** Areal : 8,470000000000006 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Strand (1994, 1996), av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av Sandaas i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lille Kolbotntjern ligger nord for Tverrveien og sør for Øvre Ekomrud ved Sofiemyr.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter et lite myrtjern. Forekomst av småsalamander - Triturus vulgaris (NT) er registrert fra tidligere, og i 2006 ble larver av både stor og liten salamander påvist (Sandaas 2006). I vannet er det en del flytematter med fattig myrvegetasjon og rik viersump med blant annet takrør – Phragmites australis langs kanten. Samlet er både tjernet og skogen omkring (lokalitet 117) et viktig levested for flere kravfulle arter. Vannvegetasjonen og annen vannfauna ble ikke undersøkt av Bratli (2005), men Sandaas (2006) hevder vannfaunaen er rik. Dessuten er tjernet muligens uten fisk.

Artsmangfold: Storsalamander (VU) og småsalamander (NT) er påvist i dammen.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av forekomster av små- og storsalamander.

Skjøtsel og hensyn:

.....

117 Kolbotntjern, sumpskog

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: C Areal : 23,27 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt Lille Kolbotntjern, nord for Tverrveien og sør for Øvre Ekornrud ved Sofiemyr.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rundt selve tjernet finnes rik sumpskog med dominans av svartor, foruten storvokst gran og bjørk på tørrere partier. Det ble registrert rik sump- og sumpskogsvegetasjon med flere næringskrevende arter. Her kan nevnes mye myrkongle – *Calla palustris*, langstarr – *Carex elongata*, gulstarr – *C. flava*, andemat – *Lemna minor*, gulldusk – *Lysimachia thyrsoflora*, myrhatt – *Potentilla palustris*, grøfsoleie – *Ranunculus flammula*, krypsoleie – *R. repens*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*, kjempepiggeknope – *Sparganium erectum* og dunkjevle – *Typha latifolia*. Samlet er både tjernet (lokalitet 116) og skogen omkring en viktig levested for flere kravfulle arter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Sumpskogen er grøfta og det er tilplantet med gran.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av svartorsumpskog og rik sumpvegetasjon.

Innplanting av gran og grøfting av sumpen trekker verdien kraftig ned.

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes gjenfylling av grøftene og granplantefeltet bør fjernes i håp om å restaurere lokaliteten.

.....

118 Ødegård skog

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: C Areal : 8,39 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med MiS-registreringene i 2004. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Tverrveien, øst for Myrvold og nord for idrettsplass.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av eldre granskog på flat mark i forsenkning mellom små koller.

Lokaliteten har en ganske godt skjermet beliggenhet med stabilt høy luftfuktighet. Vegetasjonen er rik med godt utviklet bunnsjikt. Skogen er mindre godt sjiktet og preges av eldre, høystammet gran.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet et lite område med rikere gammel granskog uten kontinuitet og lite død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

119 Nordre Gjersjøli

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: A Areal : 236,64 daa

Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig registrert av Jon T. Klepppsland i forbindelse med MiS-registreringer og inkludert i Bratli (2005), senere mer inngående undersøkt av Hofton (2006).

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østside av Gjersjøen og strekker seg fra Gjersjøen opp i lia mot bebyggelsen på Myrvoll. I nordøst avgrenses lokaliteten mot et større ruderatpreget område med fyllmasser.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hele lia ligger sørvestvendt til og har varmt lokalklima. Lokal variasjon i topografi med småkløfter og skar skaper et variert skogbilde hvor variasjon og næring og fuktighet gir grunnlag for ulike vegetasjonstyper. Grunnlendte furukauser veksler med gran- og løvdominerte partier og små, frodige bekkedaler. Gran er dominerende treslag. Dels er skogen gammel og med store dimensjoner og stedvis er det rikelig med død ved. Fattige furu- og granskogstyper dominerer der hvor jordsmonnet er skrint og tynt. På litt bedre mark tar gran over og lågurskog dekker store arealer. På fuktigere mark langs bekker i småkløfter og forsengkninger er løvinnslaget betydelig. Av løvtrær finnes foruten vanlige arter som gråor, selje, osp, bjørk og rogn, også edelløvtrær som svartor, spisslønn, alm, eik, ask, lind og hassel. Stedvis går skogen over i ren edelløvskog (alm-lindeskog, dels nesten rene lindebestander, og rike hasselkratt). Svartordominert sumpskog finnes i forsengkninger og langs bekker og fragmenter av svartorstrandskog finnes nede ved stranden. Stedvis er skogbildet preget av tett og ung løvskog med mye ung ask. På bergvegger og død ved finnes stedvis relativt godt utviklet kryptogamflora. Karplantefloraen i området er artsrik og inneholder flere regionalt og lokalt uvanlige arter. Ved befaring ble 128 arter registrert. Blant de mest interessante kan nevnes fagerklokke *Campanula persicifolia*, skogkarse *Cardamine flexuosa*, breiflangre *Epipactis helleborine*, tystbast *Daphne mezereum*, myske *Galium odoratum*, knerot *Goodyera repens*, blåveis *Hepatica nobilis*, vårerteknapp *Lathyrus vernus*, leddved *Lonicera xylosteum*, nattfiol *Platanthera bifolia*, tveskjeggveronica *Veronica chamaedrys*, korsved *Viburnum opulus* og krattfiol *Viola mirabilis*. Nede ved Gjersjøen finnes sverdlilje *Iris pseudacorus*, klourt *Lycopus europaeus*, skjoldbærer *Scutellaria galericulata*, slyngsøtvier *Solanum dulcamara* og gul frøstjerne *Thalictrum flavum* i vannkanten og på bergene blodstorkenebb *Geranium sanguineum*. Bare en karplante finnes på rødlisten, alm *Ulmus glabra*, som regnes som nær truet (NT). Mest interessant er forekomstene med sjeldne sopp som er registrert og beskrevet av Hofton (2006). Både markboende arter og vedboende sopp er godt representert. Til sammen er ni rødlistede sopparter funnet så langt, av disse er to regnet som sterkt truet (EN), mens resten er nær truet (NT). Spesielt må framheves funn av *Oligoporus hydnoidea* (EN), som bare er kjent fra Norge, med totalt 6-7 lokaliteter på sørlige del av Østlandet (Hofton 2006). Ellers ble rosaskiveslørsopp *Cortinarius calochrous* (EN), gullslørsopp *Cortinarius cf. aureofulvus* (NT), gifttrøskivesopp *Entoloma cf. sinuatum* (NT), stytejordstjerne *Geastrum quadrifidum* (NT), vedkorallsopp *Lentaria byssiseda* (NT), okerporekjuke *Junghuhnia luteoalba* (NT), svartonekjuke *Phellinus nigrolimitatus* (NT) og rynkeskinn *Phlebia centrifuga* (NT), samt en rekke andre sjeldne arter som tidligere sto på rødlisten, funnet (se Hofton 2006). Lokaliteten er også viktig for fugl og vilt og flere uvanlige arter er registrert. I Follo-sammenheng er dette et av de rikeste med hensyn til rødlistede sopparter. I tillegg inngår variert og dels sjeldne vegetasjonstyper, samt rik karplanteflora med flere lokalt til regionalt sjeldne arter. Mosefloraen er mangelfullt undersøkt men også flere interessante moser er registrert. Ytterligere undersøkelser vil sannsynligvis gi flere interessante funn av både sopp, karplanter og arter fra andre artsgrupper.

Artsmangfold: *Oligoporus hydnoidea* (EN), rosaskiveslørsopp *Cortinarius calochrous* (EN), gullslørsopp *Cortinarius cf. aureofulvus* (NT), gifttrøskivesopp *Entoloma cf. sinuatum* (NT), stytejordstjerne *Geastrum quadrifidum* (NT), vedkorallsopp *Lentaria byssiseda* (NT), okerporekjuke *Junghuhnia luteoalba* (NT), svartonekjuke *Phellinus nigrolimitatus* (NT), rynkeskinn *Phlebia centrifuga* (NT) og alm (NT) er bl.a. registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning: En pumpestasjon nede ved Gjersjøen er holdt utenfor. Lokaliteten bør skånes for nye inngrep.

Verdivurdering: En samlet vurdering av dette varierte området gir klar A-verdi. Mange truede arter, varierte og velutviklede skogtyper og et relativt stort areal er med på å trekke verdien opp.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

120 Eidsdalen

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: **C** Areal : 11,24 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av Tom H. Hofton i 2006. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av grandominert skog i trang, sørvendt kløft i Eidsdalen ned mot Gjersjøen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av grandominert skog i trang, sørvendt kløft ned mot Gjersjøen. Skogen er gjennomgående storvokst, men preget av skogsdrift og det er lite død ved. I tresjiktet inngår også noe hassel og ask. I nedre del langs bekken og ut mot vannet tar svartor mer og mer over. Lågurtskog dominerer skogbildet med blant annet trollurt – *Actaea spicata*, tysbast – *Daphne mezereum*, blåveis – *Hepatica nobilis*, firblad – *Paris quadrifolia*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica* og skogfiol – *Viola riviniana*. I nedre del langs bekken og på et lite flatt strandparti ut mot Gjersjøen finnes svartordominert sumpskog. Her finnes blant annet klourt – *Lycopus europaeus*, kattehale – *Lythrum salicaria* og blåknapp – *Succisa pratensis*. På kantene (mot skrenter/bergvegger) blir skogbildet mer opprevet og bedre sjiktet. Området har også betydning for fuglelivet (Dale et al. 1998).

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er relativt lite preget av nyere påvirkning, men er noe brukt til friluftsliv.

Verdivurdering: Som gammelskog betraktet er området av marginal verdi, men høy bonitet og gunstig topografi gir et godt utviklingspotensial, slik at det vurderes som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

121 Eidsdalen, nedre del

Småbiotoper – Kantsamfunn Verdi: **C** Areal : 1,7 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen, og av Tom H. Hofton i 2006. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nederst i Eidsdalen på vestsiden av Gjersjøen og er omringet av lokalitet nr 120, Eidsdalen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nederst i Eidsdalen finnes et lite engfragment og urterik kant med flere interessante arter, spesielt en forekomst med bakketimian – *Thymus pulegioides*, som er en sjelden art i regionen, og som bare er kjent fra en annen forekomst i Oppegård. I tillegg er lakrismjelt – *Astragalus glycyphyllos*, knegras – *Danthonia decumbens*, hvitmaure – *Galium boreale*, prestekrage – *Leucanthemum vulgare*, gjeldkarve – *Pimpinella saxifraga*, dunkjempe – *Plantago media* og skogkløver – *Trifolium medium* registrert.

Artsmangfold: Bakketimian og lakrismjelt finnes på lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av et engareal med urterik kant med interessante karplantearter.

Skjøtsel og hensyn: Tørrarealene kan utsettes for ekstensiv slått i etterkant av frøsettingen. Resten av engen kan enten slås eller beites forsiktig.

.....

122 Kolbotnvannet sør

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **B** Areal : 28,42 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen.

Lokaliteten er revidert (Bratli 2007) og omfatter nå også en smal stripe med sumpskog langs vannets vestside. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sørenden av Kolbotnvannet og strekker seg fra Storøya på østsiden, nord til Kantoråsen på vestsiden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I sørenden av Kolbotnvannet ligger en svartorsumpskog med storvokst svartor. I tillegg inngår også en del gran, bjørk og ask, og på tørrere mark osp. Ytterst mot vannet går skogen over i gråseljekratt og åpen sumpvegetasjon, som er best utviklet i vestre del. I vest oppover mot Åsen går skogen på tørrere mark og i skrenter over i alm-lindeskog med ask og hassel. I nordre del fortsetter lokaliteten som en smal brem med rikere svartorsump og sumpvegetasjon. Floraen er rik med flere næringskrevende arter, blant annet myrkongle – *Calla palustris*, langstarr – *Carex elongata*, gulstarr – *C. flava*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, trollhegg – *Frangula alnus*, sverdlilje – *Iris pseudacorus*, klourt – *Lycopus europaeus*, firblad – *Paris quadrifolia*, takrør – *Phragmites australis*, grøttesoleie – *Ranunculus flammula*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*, skjoldbærer – *Scutellaria galericulata* og slyngsøtvier – *Solanum dulcamara*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe påvirket av menneskelig aktivitet, spesielt i østre del.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en truet vegetasjonstype og et større område med svartorsumpskog. Noe ung skog og manglete funn av interessante arter trekker verdien noe ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

123 Ekmorud

Store gamle trær – Ask Verdi: **C** Areal : ,83 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på tunet ved Ekmorud.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To store asketrær med noen rikbarksarter står på tunet ved Ekmorud. Lokaliteten bør undersøkes bedre.

Verdivurdering: Lokaliteten er antatt å ha lokal verdi (C-verdi), men slike trær er relativt sjeldne særlig i østre del av kommunen. Trærne bør vurderes på nytt med tanke på størrelse, eventuelle hulheter, død ved, mm.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av og nedfallen død ved bør få bli liggende eller flyttes til en egnet lokalitet. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Eventuelle hulheter må ikke tettes igjen.

124 Ekornrud øst

Rik edellauskog – Verdi: **C** Areal : 8,539999999999991 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Ekornrud.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør et lite område med edelløuskog på gjengroende kulturmark. Ask dominerer, men det er også en god del lind og hassel. En stor, gammel og hul lind står inne i skogen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området har tidligere vært åpent og utgjør sannsynligvis en gjenngroende kulturmark.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet ung skog på gjenngroende kulturmark og manglende funn av arter. En hul lind i skogen trekker verdien noe opp.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør enten overlates til fri utvikling eller åpnes opp og skjøttes som kulturmark.

125 Åsen sør

Dam – Eldre fisketom dam Verdi: **B** Areal : ,52 daa

Innledning: Strand (1994, 1996) og Sandaas (2011) undersøkte dammen med tanke på amfibier og dammen er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for hus på Åsen, i kant mot skog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en skogkantdam med forekomst av småsalamander (NT) og spissnutfrosk (NT). Dammen var intakt ved befaring i 2004, men status for småsalamander er ukjent.

Artsmangfold: Småsalamander - Triturus vulgaris (NT) og spissnutfrosk (NT) er registrert.

Verdivurdering: Dam med to nær truede amfibiearter gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn:

126 Åsen

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : ,74 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på tunet ved Åsen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To store eiketrær står på tunet ved Åsen. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er sannsynlig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen "hul eik". Lokaliteten bør derfor undersøkes bedre.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes å ha lokal verdi (C-verdi), men trærne bør undersøkes bedre med tanke på størrelse, hulheter, død ved og potensial for insekter. Verdiene kan derfor være større enn antatt.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av og nedfallen død ved bør få bli liggende eller flyttes til en egnet lokalitet. Eventuelle hulheter må ikke tettes igjen.

127 Åsen SV

Gammel lauskog – Verdi: **C** Areal : 8,86 daa

Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig registrert av Jon T. Klepppsland i forbindelse med MiS-registreringer og inkludert i Bratli (2005). Senere mer inngående undersøkt av Hofton (2006). Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest for Åsen, på vestsiden av Gjersjøen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av middelaldret løvsuksesjon på tidligere dyrket mark. Et stort felt i midten av avgrenset areal er fremdeles åpent. I tresjiktet inngår bjørk i nord og noe eldre osp i sør. Lokaliteten antas å ha et fremtidig potensial som løvsuksesjon, men har nå kun lav lokal verdi.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger på tidligere dyrket mark. En bred kraftgate krysser lokaliteten over det åpne feltet.

Verdivurdering: Lokaliteten antas å ha et fremtidig potensial som løvsuksesjon, men har nå kun lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

128 Kolbotnveien ved Vassbonn

Artsrik veikant – Verdi: **C** Areal : 1,26 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs nordvestsiden av Kolbotnveien, ved avkjøringen til Ingierkollen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs Kolbotnveien ved avkjøring til Ingierkollen ligger en lokalitet med den regionalt sjeldne arten krusfrø – *Selinum carvifolia* (NT). Arten inngår i ruderatvegetasjon og små rester av tørrbakkepreget vegetasjon på knauser i veikanten. Av andre arter nevnes engknoppurt – *Centaurea jacea*, gulmaure – *Galium verum*, prikkperikum – *Hypericum perforatum*, rødknapp – *Knautia arvensis* og tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*.

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er påvist på lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av artsrik veikant med rik og interessant flora. Gjengroing og invasjon av ruderatarter trekker verdien ned.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holde delvis åpen ved rydding av løvoppslag og ekstensiv slått etter frøsetting. Gjødslig og oppflising av felte trær må ikke forekomme på lokaliteten.

129 Vassbonn vest

Rik edellauvskog – Alm-lindeskog Verdi: C Areal : 7,65 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs bekken nord for skitrekket?

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter en liten inneklemt edelløvskog langs bekken nord for skitrekket, vesentlig alm-lindeskog på tørr mark i skråningene, og gråor-askeskogdominerte typer i bunnen av kløfta langs bekken. Floraen er likevel ganske rik fortsatt, selv om feltsjiktet stedvis er ganske glissent. Av arter nevnes hassel – *Corylus avellana*, kratthumleblom – *Geum urbanum*, leddved – *Lonicera xylosteum*, firblad – *Paris quadrifolia*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica*, krattfiol – *Viola mirabilis* og skogfiol – *V. riviniana*. I bekken mellom Kolbotnvann og Gjersjøen er tidligere den rødlistede mosen striglekrypmose – *Amblystegium fluviatile* funnet. Dette er det eneste intakte stedet hvor arten fortsatt kan vokse, men den ble ikke sett under feltbefaring.

Artsmangfold: Striglekrypmose – *Amblystegium fluviatile* (NT) er tidligere funnet i bekken.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten påvirkes sterkt av fyllinger og ulik aktivitet i forbindelse med skitrekket.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en liten forekomst av rik edelløvskog. En del påvirkning og noe ung skog gjør at verdien ikke settes høyere.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

130 Bukta ved Vassbonn

Rik sumpskog – Viersump i lavlandet Verdi: C Areal : 8,18 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i bukta sør for Vassbotn.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Innerst i bukta sør for Vassbotn er det et lite område med ferskvannssump. Tårn-sivaks- sump er best utviklet i vestre del. Innenfor finnes litt gråseljekratt med gråselje – *Salix cinerea* og istervier – *S. pentandra*. Mot øst er det et bredt belte med velutviklet flytebladvegetasjon dominert av vanlig tjønnaks – *Potamogeton natans* og gul nøkkerose – *Nuphar lutea* utenfor sumpen. Vegetasjonen karakteriseres av næringskrevende arter, men også mer nøysomme arter inngår. Her nevnes vassgro – *Alisma plantago-aquatica*, bekkeblom – *Caltha palustris*, kvass-starr – *Carex acuta*, elvesnelle – *Equisetum fluviatile*, mjørdurt – *Filipendula ulmaria*, mannasøtgras – *Glyceria fluitans*, springfrø – *Impatiens noli-tangere*, hanekam – *Lychnis flos-cuculi*, klourt – *Lycopus europaeus*, fredløs – *Lysimachia vulgaris*, kattehale – *Lythrum salicaria*, mjølkerot – *Peucedanum palustre*, strandrør – *Phalaris arundinacea*, gul frøstjerne – *Thalictrum flavum* og dunkjevle – *Typha latifolia*. Vegetasjonstypen er sjelden i kommunen, men finnes spredt langs bredden av de største vannene.

Bruk, tilstand og påvirkning: I den østre delen er lokaliteten sterkt påvirket av skitrekket og rundt en odde midt i bukta foregår noe bading som medfører moderat slitasje.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av ferskvannssump

Skjøtsel og hensyn: Deler av lokaliteten bør vurderes slått. Sumpskogen må overlates til fri utvikling.

131 Vassbotn

Slåttemark – Tørr, meget baserik eng i lavlandet Verdi: C Areal : 4,79 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i bukta ved Vassbotn.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ved Vassbotn ligger et lite område med tørreng og grunnlendte knauser med rik tørrbakkepreget engvegetasjon, vesentlig tjæreblomeng og dunhavreeng. I øst inngår også et lite parti med åpen alm-lindeskog på berglendt mark. Floraen er artsrik med flere interessante arter. Her nevnes enghavre – *Avenula pratensis*, engknoppurt – *Centaurea jacea*, engnellik – *Dianthus deltoides*, hvitmaure – *Galium boreale*, gulmaure – *G. verum*, prikkperikum – *Hypericum perforatum*, rødknapp – *Knautia arvensis*, gjeldkarve – *Pimpinella saxifraga* og sølvmure – *Potentilla argentea*. På knauser vokser blant annet engtjæreblom – *Lychnis viscaria* og kantkonvall – *Polygonatum odoratum*. Spredt inngår einer og rosebusker. Mot vest grenser lokaliteten til sterkt gjengroende, ruderatpreget næringsrik eng. Enga er i dag ikke i bruk, men gjengroingen går sent på grunn av grunt og tørt jorddekke. Slike rester etter tidligere kulturmark er sjeldne i kommunen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere beite-/slåttemark hvor hevdregimet har opphørt.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eldre slåttemark. Sterk gjengroing er årsaken til den lave verdien, som raskt vil stige ved en gjenopptagelse av slåttepraksisen.

Skjøtsel og hensyn: Engpartiet bør slås etter blomstring og noe løvoppslag bør ryddes bort.

132 Kantorodden øst

Rik edellauvskog – Alm-lindeskog Verdi: **B** Areal : 61,44 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Kantorodden. Avgrensingen av lokaliteten er noe uklar, og elementer av rik edelløvskog, sumpskog og fattigere skogtyper inngår også i de omkringliggende lokalitetene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På østsiden av Kantorodden finnes et stort løvskogsområde dominert av alm-lindeskog. Lind er ganske vanlig i tresjiktet, men også alm, ask, hassel og stor osp og bjørk inngår, foruten gran og på skrinne og tørre koller furu. Skogen er gjennomgående ung, stedvis er det mye askeoppslag. Det er også flere bergskrenter med artsrik mosevegetasjon, også ved basis av edelløvtrær. Arter som glansmose – *Homalia trichomanoides* og gulbånd – *Metzgeria furcata* er registrert, sammen med svartbarkne – *Asplenium trichomanes*. Floraen er artsrik. En stor forekomst av breiflangre – *Epipactis helleborine* finnes, og det er registrert flere andre interessante arter, som trollbær – *Actaea spicata*, åkermåne – *Agrimonia eupatoria*, fagerklokke – *Campanula persicifolia*, kratthumleblom – *Geum urbanum*, blåveis – *Hepatica nobilis*, firblad – *Paris quadrifolia*, nattfiol – *Platanthera* sp., skogsvinerot – *Stachys sylvatica*, treskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*, korsved – *Viburnum opulus*, skogvikke – *Vicia sylvatica* og krattfiol – *Viola mirabilis*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er mye brukt til turgåing og det er mange stier gjennom lokaliteten.

Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden og samlet har området stor naturverdi.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en stor forekomst av rik skog dominert av alm-lindeskog med artsrik flora. Ung skog, lite død ved og mye ferdsel trekker verdien ned. Verdiene er derfor i hovedsak knyttet til den rike bakken.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

133 Kantorodden midtparti

Rik edellauvskog – Or-askekog Verdi: **B** Areal : 18,920000000000002 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en grunn kløft langs bekk på midtre del av Kantorodden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I grunn kløft langs bekk på midtre del av Kantorodden finnes rik svartor-askeskog med en del storvokste trær. Det er også mye ungt askeoppslag og generelt lite død ved. Enkelte moserike bergvegger finnes. Innenfor bukta i sør går skogen over mot svartorstrandskog. Skogen er artsrik med flere kravfulle arter, som sumphaukskjegg – *Crepis paludosa*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, kratthumleblom – *Geum urbanum*, sverdlilje – *Iris pseudacorus*, klourt – *Lycopus europaeus*, fredløs – *Lysimachia vulgaris*, blåkoll – *Prunella vulgaris*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus* og blåknapp – *Succisa pratensis*.

Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden, og samlet har området stor naturverdi. Avgrensing mellom lokalitetene er noe flytende og elementer av rik edelløvskog, sumpskog og fattigere skogtyper inngår i alle lokalitetene.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av rik svartor-askeskog med en del gamle trær og artsrik flora. Lite død ved trekker verdien noe ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

134 Kantorodden vest

Rik edellauvskog – Alm-lindeskog Verdi: **B** Areal : 32,57 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i vestre del av midtpartiet på Kantorodden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vestre del av midtpartiet på Kantorodden inneholder rik alm-lindeskog i veksling med fuktigere edelløvskog og fattigere barskogstyper på små grunnlendte partier. Det er mye lind i tresjiktet. Området er også rikt på steinblokker og moserike bergvegger, særlig i liten vestvendt kløft i vestre del. En del gamle trær og død ved finnes. Av interessante arter nevnes spesielt breiflangre – *Epipactis helleborine* og vårerte knapp – *Lathyrus vernus*. Ellers finnes trollbær – *Actaea spicata*, fagerklokke – *Campanula persicifolia*, leddved – *Lonicera xylosteum*, firblad – *Paris quadrifolia*, skogsvinerot – *Stachys sylvatica* og krattfiol – *Viola mirabilis* for å nevne noen.

Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden, og samlet har området stor naturverdi. Avgrensing mellom lokalitetene er noe flytende og elementer av rik edelløvskog, sumpskog og fattigere skogtyper inngår i alle lokalitetene.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av alm-lindeskog med en del gamle trær og død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

135 Lille Rørvik

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **B** Areal : 19,43 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Lille og Store Rørvik på vestsiden av Kantorodden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mellom Lille og Store Rørvik på vestsiden av Kantorodden ligger et området med rik svartordominert sumpskog og svartorstrandskog. Lokaliteten er artsrik med flere interessante arter som langstarr – *Carex elongata* og klourt – *Lycopus europaeus*. Ellers inngår mjødukt – *Filipendula ulmaria*, sverdlilje – *Iris pseudacorus*, fredløs – *Lysimachia vulgaris*, firblad – *Paris quadrifolia*, blåkoll – *Prunella vulgaris*, krypsleie – *Ranunculus repens*, skjoldbærer – *Scutellaria galericulata*, blåknapp – *Succisa pratensis* og hestehov – *Tussilago farfara*. Utenfor inngår litt sumpvegetasjon og gråseljekratt med kvass-starr – *Carex acuta*, selsnepe – *Cicuta virosa*, elvesnelle – *Equisetum fluviatile*, takrør – *Phragmites australis*, gråselje – *Salix cinerea* og gul frøstjerne – *Thalictrum flavum*. Svartorstrandskog og rik sumpskog er sjeldne vegetasjonstyper som begge regnes som sterkt truet (EN).

Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden, og samlet har området stor naturverdi. Avgrensing mellom lokalitetene er noe flytende og elementer av rik edelløvskog, sumpskog og fattigere skogtyper inngår i alle lokalitetene.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av truede vegetasjonstyper. Manglende artsfunn og gammelskog med mye død ved, gjør at verdien ikke blir enda høyere.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

136 Store Rørvik

Evjer, bukter og vikar – Bukter og vikar Verdi: C Areal : 3,49 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Store Rørvik på vestsiden av Kantorodden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I Store Rørvik på vestsiden av Kantorodden finnes takrørdominert sumpvegetasjon. Foruten takrør – *Phragmites australis* inngår blant annet kvass-starr – *Carex acuta*, sennegrass – *C. vesicaria*, elvesnelle – *Equisetum fluviatile* og sverdlilje – *Iris pseudacorus*. Vegetasjonstypen er nokså sjelden i kommunen.

Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med viktige skoglokaliteter på Kantorodden, og samlet har området stor naturverdi.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en lite påvirket sumpvegetasjon. Dominans av takrør trekker verdien noe ned

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling.

137 Store Rørvik øst

Rik edellauskog – Alm-lindeskog Verdi: B Areal : 6,99 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Store Rørvik på Kantorodden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På østsiden av Store Rørvik på Kantorodden finnes en liten alm-lindeskog i sørvestvendt skrent. Alm, hassel og lind inngår sammen med osp og storvokst gran. Noe død ved finnes og det er registrert kravfulle mosearter som flatefellmose – *Neckera complanata* og putevrimose – *Tortella tortuosa* på bergvegger. Floraen er artsrik med flere regionalt sjeldne arter, først og fremst breiflangre – *Epipactis helleborine*, storkonvall – *Polygonatum multiflorum* og våreterknapp – *Lathyrus vernus*. Ellers inngår trollbær – *Actaea spicata*, fagerklokke – *Campanula persicifolia*, blåveis – *Hepatica nobilis* og skogfiol – *Viola riviniana*.

Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden, og samlet har området stor naturverdi.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av eksponert alm-lindeskog med noe død ved.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

138 Storebukta

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: C Areal : 5,74 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og oppdatert og utvidet i 2006. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter Storebukta, helt nord i Kolbotnvannet. Lokaliteten er utvidet mot sørøst i forhold til Bratli (2005) for å inkludere en smal brem med stor svartor og rik strandvegetasjon langs kanten av vannet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Helt nord i Kolbotnvannet ligger en lokalitet med rik svartorsumpskog. Utenfor skogen finnes også gråseljekratt og ferskvannssump. Registrerte arter omfatter blant annet kratthumleblom *Geum urbanum*, sverdlilje *Iris pseudacorus*, klourt *Lycopus europaeus*, slyngsøtvier *Solanum dulcamara*, skogsivaks *Scirpus sylvaticus* og skogsvinerot *Stachys sylvatica*. Vegetasjonen på fastmark besto av mer typisk ruderatpreget veikantvegetasjon, med for eksempel bladfaks *Bromopsis inermis*, bringebær *Rubus idaeus* og brennelse *Urtica dioica*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er preget av friluftaktiviteter og tilgrensende bebyggelse.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik sumpskog og noe gråseljekratt. Sterk påvirkning trekker verdien ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

139 Kolbotn kirke

Småbiotoper – Kantsamfunn Verdi: B Areal : 2,9 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil Kolbotn kirke på sørsiden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en liten lokalitet med middels rik flora utenfor Kolbotn kirke. Lokaliteten inneholder en populasjon med solblom – *Arnica montana* (VU). Vegetasjonen er dominert av lysåpen, lyngrik furuskog og flekker med mer engpreget vegetasjon. Floraen er middels rik, men røsslyng – *Calluna vulgaris* dominerer. Av andre arter nevnes katterfot – *Antennaria dioica*, fagerklokke – *Campanula persicifolia*, liljekonvall – *Convallaria majalis*, markjordbær – *Fragaria vesca*, hvitmaure – *Galium boreale*, knollerteknapp – *Lathyrus linifolius*, tveskjeggveronika – *Veronica chamaedrys*, legeveronika – *V. officinalis* og skogfiol – *Viola riviniana*.

Artsmangfold: Lokaliteten inneholder en populasjon med solblom – *Arnica montana* (VU).

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en sårbar planteart.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten må skjøttes til fordel for solblom, noe som betyr at engarealet må slåes etter blomstingsperioden.

140 Rosenholm

Rik sumpskog – Viersump i lavlandet Verdi: **B** Areal : 33,15 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen.

Dammen er kartlagt for amfibier av Kjell Sandås i 2009. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for kirkegården ved Rosenholm og går nordover til kommunegrensen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nord for kirkegården ved Rosenholm finnes rik sumpvegetasjon (rik takrør-sivaks-sump) og velutviklet gråseljekratt langs bekk. På østsida går lokaliteten over i triviell løvskog med blant annet grår. En lang rekke næringskrevende, til dels uvanlige arter er registrert. Mest spesiell er nok dronningstarr – *Carex pseudocyperus*, som er rødlistet (NT).

Ellers kan nevnes mye myrkongle – *Calla palustris*, mye langstarr – *Carex elongata*, gulstarr – *C. flava*, sennegrass – *C. vesicaria*, mannasøtgras – *Glyceria fluitans*, lyssiv – *Juncus effusus*, springfrø – *Impatiens noli-tangere*, klourt – *Lycopus europaeus*, katterhale – *Lythrum salicaria*, vasshøymol – *Rumex aquaticus*, gråselje – *Salix cinerea*, svartvier – *S. myrsinifolia*, istervier – *S. pentandra*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*, dunkjevle – *Typha latifolia* og stor myrfiol – *Viola epipsila*. På litt tørrere mark inngår trollbær – *Actaea spicata*, enghumleblom – *Geum rivale*, mjødurt – *Filipendula ulmaria* og firblad – *Paris quadrifolia*. Vegetasjonstypene er sjeldne i Oppegård (og regionen for øvrig) og gråseljekratt regnes som noe truet (VU).

Artsmangfold: Dronningstarr – *Carex pseudocyperus* (NT) er funnet på lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten splittes i to av Rosenholmveien og er påvirket av utfylling på alle kanter. Deler av lokaliteten i vest er grøftet og tilplantet med gran.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av truede vegetasjonstyper med flere interessante plantearter. En god del påvirkning trekker verdien noe ned og kan på sikt føre til ytterligere verdifall.

Skjøtsel og hensyn: Grøfter bør vurderes gjennfyllt og foryngelse av gran bør fjernes. Ellers anbefales fri utvikling.

141 Fløysbonnmyra

Intakt lavlandsmyr i innlandet – Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper Verdi: **C** Areal : 27,63 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Fløysbonnmyra ligger øst for Fløysbonn.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Fløysbonnmyra er en for det meste ombrotrof myr øst for Fløysbonn. Den preges av ombrotrof vegetasjon og partier med fattigmyr i kanten. Spredt finnes lavvokst furu og bjørk. Registrerte arter inkluderer hvitlyng – *Andromeda polifolia*, rund soldogg – *Drosera rotundifolia*, torvull – *Eriophorum vaginatum*, molte – *Rubus chamaemorus* og stortranebær – *Vaccinium oxycoccus* ssp. *oxycoccus*. På tuene inngår røsslyng – *Calluna vulgaris*. I kanten vokser gråstarr – *Carex canescens*, sveltstarr – *C. pauciflora*, frynsestarr – *C. paupercula* og flaskestarr – *C. rostrata*. Intakt myrvegetasjon er svært sjelden i kommunen, og dette er den eneste lokaliteten som er avgrenset. Noe myrlendt furuskog rundt selve myra er også tatt med.

Bruk, tilstand og påvirkning: Noen eldre grøfter finnes i kanten og i sentrale deler, ellers er myra lite påvirket.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av forekomst av en forholdsvis intakt lavlandsmyr. Eldre grøfter trekker verdien ned.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Gjennfylling av gamle grøfter bør vurderes som tiltak mot gjenngrøing.

142 Snipetjern sør

Rik sumpskog – Varmekjær kildelauvskog Verdi: **A** Areal : 13,24 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten går langs utløpsbekken fra Snipetjern ned til Fløysbonnveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs utløpsbekken fra Snipetjern ned til en grusvei ligger en liten lokalitet med rik sumpskog. Både grår og til dels gammel svartor inngår i tresjiktet. Nærmest bekken dominerer gråseljekratt med ulike vierarter i tillegg. Deler av skogen er grøfta og tilplanta med gran. I lokaliteten finnes flere svært sjeldne arter. De rødlistede artene *Carex acutiformis* – stautstarr og vassstelg – *Dryopteris cristata* er registrert, begge regnes som sterkt truede (EN). I tillegg er flere regionalt sjeldne arter og arter typiske for rik sumpskog registrert. Her nevnes myrkongle – *Calla palustris*, bekkeblom – *Caltha palustris*, engkarse – *Cardamine pratensis*, langstarr – *Carex elongata*, sennegrass – *C. vesicaria*, mjødurt – *Filipendula ulmaria*, mannasøtgras – *Glyceria fluitans*, grøftesoleie – *Ranunculus flammula*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus*, slyngsøtvier – *Solanum dulcamara*, kjempepigknopp – *Sparganium erectum*,

rustjerneblom – *Stellaria longifolia*, ballblom – *Trollius europaeus* og stor myrflor – *Viola epipsila*. Vegetasjonstypen minner mest om varmekjær kildeløvsog, som regnes som akutt truet (CR). I bunnsjiktet inngår også kravfulle moser.

Artsmangfold: De rødlistede artene *Carex acutiformis* – stautstarr og vassstelt – *Dryopteris cristata* er registrert, begge regnes som sterkt truede (EN).

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er liten og påvirket av grøfting og tilplanting med gran.

Verdivurdering: Grøfting og granplanting trekker verdien noe ned, men lokaliteten vurderes likevel som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av to sterkt truede karplanter og en truet vegetasjonstype.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Uttak av innplantet gran kan være nødvendig, og det er viktig at ikke grøfting og annen aktivitet i forbindelse med veibygging endrer hydrologien i området.

143 Snipetjern

Intakt lavlandsmyr i innlandet – Verdi: **B** Areal : 14,75 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter vestre del av Snipetjern, inkludert kantsoner.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rundt hele Snipetjern finnes en brem med fattig til intermediær myrvegetasjon delvis også som flytematter ute i tjernet. Ombrotrofe partier inngår og til dels rik sumpvegetasjon og gråseljekratt finnes langs kanten av tjernet. Særlig mot sørenden er myrvegetasjonen godt utviklet og her finnes flere interessante arter. Spesielt nevnes kjevlestarr - *Carex diandra*. I vannkanten inngår arter som myrkongle – *Calla palustris*, selsnepe - *Cicuta virosa*, elvesnelle – *Equisetum fluviatile*, kattehale – *Lythrum salicaria* og takrør – *Phragmites australis*. På myrmattene finnes blant annet dystarr – *Carex limosa*, bukkeblad – *Menyanthes trifoliata*, myrhatt – *Potentilla palustris*, molte – *Rubus chamaemorus* og stortranebær – *Vaccinium oxycoccus* spp. *oxycoccus*. De to sterkt truede karplantene myggblom og myrtelg er funnet ved tjernet, men i Ski kommune.

Artsmangfold: Selve tjernet er ikke undersøkt hverken for vannplanter eller vannfauna, men det har et rikt fugleliv (Dale et al 1998). Det er et potensial for interessante arter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke undersøkt

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av forekomst av intermediær rikmyr og et stort potensial for forekomst av interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling og bevaring av kantsonene rundt tjernet.

144 Snipetjern N

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **C** Areal : 7,95 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nordenden av Snipetjern.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I nordenden av Snipetjern ligger en rik svartordominert sumpskog. Nærmere tjernet er vannstanden høy og her inngår også en del sumpvegetasjon og kratt. Floraen er middels artsrik med flere interessante arter. Her nevnes myrkongle – *Calla palustris*, bekkblom – *Caltha palustris*, bekkkarse – *Cardamine amara*, selsnepe - *Cicuta virosa*, trollurt – *Circaea alpina*, mjørdurt – *Filipendula ulmaria*, mannosøtgras – *Glyceria fluitans*, firblad – *Paris quadrifolia*, grøftesoleie – *Ranunculus flammula*, skogsivaks – *Scirpus sylvaticus* og kjempepiggeknope – *Sparganium erectum*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er grøftet og det inngår en del storvokst gran langs bekken nordover fra tjernet. Vegetasjonen er mest intakt nær utløpet i tjernet og blir gradvis mer og mer påvirket av grøfting og tilplanting nordover langs bekken.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst rik sumpskog og sumpvegetasjon. Mye hogstpåvirkning og manglende funn gjør at verdien ikke blir høyere.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

145 Tårnåsen

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: **C** Areal : 24,02 daa

Innledning: Området ble registrert av Jon T. Kleppslund i forbindelse med MiS-registreringer. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en høyde øst for Tårnåsen skole og vest for E6, i nordøstre hjørne av kommunen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en østvendt skråning med litt lind i bratt parti. Boreale løvtrær finnes nedenfor brattkanten og storvokst jevnaldret gran på flat mark. Helt øst er det et forsumpet parti med litt svartor for uten gran. Granskogen er i sen optimalfase med konsentrasjoner av fersk død ved samt en del selvtynningsstokker. Lokaliteten har gunstig beliggenhet med hensyn til lokalklima. Bakkevegetasjonen er rik og det er en variert treslagsblanding.

Verdivurdering: Området vurderes å ha en lokal verdi (C-verdi) på grunn av forekomsten av eldre grandominert blandingsskog.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

146 Vestenga N

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: **C** Areal : 12,17 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs bekken nord for Vestenga.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en liten lokalitet med svartordominert sumpskog langs bekken nord for Vestenga og ned mot en gjengroende eng. Langs bekken finnes storvokst svartor i nedre del, mens skogen i sørenden er hogd. Her står kun mindre løvtrær igjen. Langs kantene er det storvokst gran. Bekken går i små stryk og fossefall, og det er mosedekte berg langs bekken gjennom kløfta. Lokaliteten er en naturlig forlengelse av lokalitet 13 – Bekkenstenfeltet, og hasselkratt inngår der hvor disse lokalitetene møtes.

Vegetasjonen er generelt rik, blant annet med blåveis - *Hepatica nobilis*.

Verdivurdering: Grunnet hogstpåvirkning og manglende funn av viktige elementer og spesielle arter, gis lokaliteten lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

147 Linnekastveien øst

Rik edellauskog – Or-askekog Verdi: B Areal : 23,38 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er endret av BioFokus ved Anders Thy1én etter feltbesøk sammen med Terje Blindheim høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog i Oppegård kommune, i en vestvendt skråning øst for Linnekastveien og sørøst for Svartskog brygge. Helt øverst grenser lokaliteten mot hogd skog inntil privat tomt. Lokaliteten ligger i en forsenkning langs en bekk, og grenser mot fattigere skog på sidene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av rik sumpskog (til dels av snelle-askutforming), samt alm-lindeskog i den vestvendte skrenten sørøst for Svartskog brygge. I øvre del er skogen relativt tørr, og her er det vesentlig alm-lindeskog. Rik sumpskog vurderes som en truet vegetasjonstype. Det er også foretatt en del tynning av bjørk og gran i lokaliteten. Til dels storvokst svartor finnes jevnt over hele området. Ellers er det en del ask, eik, lind, spisslønn, hassel og selje. Stor gran inngår også, særlig på kantene, og mer spredt litt stor furu. En del død løvved finnes, samt noe gran. En bekk renner gjennom lokaliteten som ligger i grunn kløft. Sige vann sprer seg diffust utover og gir gunstige vilkår for sumpskogen. På kantene inngår bergvegger og skrenter hvor alm-lindeskog dominerer. I nedre del smalner skogen av i liten kløft langs bekken. Skogen her er nesten helt dominert av lavvokst lind.

Artsmangfold: Grønnsko er funnet på død løvvedstamme. På berg, ved basis av løvtrær og på bakken i sumpskogen er det for øvrig rik moseflora. Det er også en relativt rik soppflora, med bl.a. blåkantslørsopp og ulike kantarellarter. Karplantefloraen er relativt rik med arter som storkonvall, bekkekarsee, korsved, trollbær og kantkonvall.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke veldig gammel, men her finnes storvokst svartor og lind. Skogen har begynt å utvikle gammelskogsstrukturer med bl.a. død ved.

Fremmede arter: Platanlønn vokser enkelte steder i området. Edelgran og høstberberis skal ifølge Artsobservasjoner også være registrert i området.

Verdivurdering: Relativt godt utviklet rik sumpskog og rik edelløvsskog tilsvarer verdi som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: I hovedsak fri utvikling. Platanlønn og evt edelgran bør fjernes fra området.

148 Linnekastet, kantkratt

Kantkratt – Verdi: A Areal : 10,039999999999999 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for bebyggelsen ved Linnekastet langs Bunnefjorden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rett sør for husene ved Linnekastet ligger et området med svært artsrike tørrenger, tørrberg, urterik kant og kantkratt. De grunne bergene overrises av kalkrikt sige vann, som gir grunnlag for den rike floraen. Her finnes en pen populasjon av den rødlistede arten hartmansstarr - *Carex hartmanii* (EN). Av andre uvanlige arter kan nevnes rødflangre - *Epipactis atrorubens*, krattalant - *Inula salicina*, knollmjørdurt - *Filipendula vulgaris*, oslosildre - *Saxifraga osloensis*, bakkefiol - *Viola collina* og loppestarr - *Carex pulicaris*. Sistnevnte er svært sjelden i Oslofjordområdet. En lang rekke andre interessante arter er også registrert. Her nevnes bakkemynte - *Acinos arvensis*, strandløk - *Allium vineale*, markmalurt - *Artemisia campestris*, lakrismjelt - *Astragalus glycyphyllos*, berberis - *Berberis vulgaris*, mye hjertegras - *Briza media*, blodstorkenebb - *Geranium sanguineum*, flekkgrisør - *Hypochoeris maculata*, bergmynte - *Origanum vulgare*, kantkonvall - *Polygonatum odoratum*, knopparve - *Sagina nodosa*, hvitbergknapp - *Sedum album* og fjellodnebregne - *Woodsia alpina*. På bergene inngår også kravfulle moser som putevrimose - *Tortella tortuosa*. Litt einer, rosekratt og furu inngår. Flere av artene er kalkkrevende, og opptrer svært sjelden på grunnfjellet på østsiden av Oslofjorden.

Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999).

Artsmangfold: Hartmansstarr - *Carex hartmanii* (EN), knollmjørdurt - *Filipendula vulgaris* (NT) og oslosildre - *Saxifraga osloensis* (NT) er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomster av andre rødlistearter er høyt, spesielt for insekter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som samlet har store naturverdier.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av forekomst av svært artsrike tørrenger, tørrberg og kantkratt som huser flere rødlistede plantearter. Potensialet for forekomster av rødlistede insekter er stort.

Skjøtsel og hensyn: Deler av lokaliteten kan med fordel utsettes for ekstensiv slått og noe rydding av løvoppslag.

149 Linnekastet, strand

Strandeng og strandsump – Verdi: C Areal : 5,95 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Linnekastet langs Bunnefjorden.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs Bunnefjorden sør for Linnekastet ligger en liten lokalitet med grusstrand og svaberg hvor fragmenter av strandengvegetasjon inngår. Her er det registrert enkelte interessante arter, som saltstarr - *Carex vacillans*, som er sjelden i Indre Oslofjord, strandsteinkløver – *Melilotus altissimus*, sverdlilje – *Iris pseudacorus* og bukkebeinurt - *Ononis arvensis* (NT). Ut over dette inngår vanlige strandplanter, men strandenger er en sjelden type i kommunen, og derfor viktig i lokal sammenheng.

Lokaliteten grenser til svært artsrike tørrenger, berg og urterik kant i lokalitet 148 og rike skogtyper i lokalitet 150. Den er også vurdert som viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999).

Artsmangfold: Bukkebeinurt (*Ononis arvensis*) (NT) er påvist på lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som samlet har store naturverdier.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av strandengvegetasjon med forekomst av en rødlisteart.

Skjøtsel og hensyn: Deler av lokaliteten kan med fordel utsettes for ekstensiv slått og noe rydding av løvoppslag.

150 Linnekastet, kalkskog

Kalkskog – Lågurtkalkskog i kyststrøk Verdi: B Areal : 16,91 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er endret av BioFokus ved Anders Thy1én etter feltbesøk sammen med Terje Blindheim høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, i en vestvendt skråning øst for Linnekastveien og sør for Svartskog brygge. I sør og vest grenser lokaliteten mot andre naturtypelokaliteter, mens den i nord og vest grenser mot fattigere skog, i nordvest også mot vei og bebyggelse. Den sørlige delen av lokaliteten inngår i landskapsvernområdet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Furuskogen rundt de artsrike tørrbergene og krattene i lokalitet 148 karakteriseres også av flere kalkkrevende arter, og skogen kan karakteriseres som kalkfuruskog, en noe truet (VU) vegetasjonstype som opptrer svært sjelden på grunnfjell. Den rike floraen er betinget av kalkrikt sigevann og de rike forekomstene følger derfor først og fremst små kløfter og grunne forsenkninger, stedvis også der sigevannet opptrer mer diffust utflytende over grunnfjellet. Skogen er åpen og furudominert. En del einer inngår og litt hassel og eik.

Artsmangfold: Blodflekkorallsopp (rødlistet som NT i Norsk rødliste 2010) vokser i området. Forøvrig er loppestarr, som er sjelden i Oslofjordområdet, registrert sammen med blant annet kornstarr, blodstorkenebb, blåveis, flekkgrisøre, krattalant og blåknapp. På bergene inngår også kravfulle moser som putevrimose.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er foreløpig ikke veldig gammel, men en del gamle trær og noe død ved finnes.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999). Den inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som samlet har store naturverdier.

Verdivurdering: Skogen er generelt middels rik, men flekkvis er det godt utviklet kalklågurtskog, noe som er sjeldent på østsiden av Oslofjorden. Vurderes som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

151 Linnekastet, barskog

Rik blandingskog i lavlandet – Boreonemoral blandingskog Verdi: A Areal : 93,21 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for lokalitet 150, ved Linnekastet. Lokaliteten er noe omtrentlig avgrenset og går gradvis over i artsrik kalkfuruskog, delvis også alm-lindeskog og fattigere furuskogstyper.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sør for kalkfuruskogen i lokalitet 150 er det et større område med blandingskog der gran inngår i veksling med ulike løvtrær, samt furu på mer tørrlendte knauser og rygger. Skogen er variert, men ikke spesielt gammel, selv om en del storvokst gran inngår. Det er generelt høyt løvtreinnslag. Stor osp finnes spredt og det er mye hassel, foruten bjørk, lind og ask. Lite død ved ble observert, men noen konsentrasjoner finnes, vesentlig av små dimensjoner og i tidlige nedbrytningsstadier. Spor etter hogst finnes over hele lokaliteten. En del berg og framspring gir grunnlag for moserike bergskrenter og øker variasjonen i lokaliteten. Lågurtskog dominerer, men også sumpskogsfragmenter finnes. En bekk skjærer seg ned i løsmassene på vei ned dalsiden og danner en grunn ravine. Flere småraviner parallelt med denne danner et karakteristisk system av gamle bekkeløp og småravin i løsmassene som her er ganske dype. Området er også vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999).

Artsmangfold: Blåveis – *Hepatica nobilis* er nokså vanlig, men den mest spesielle artsforekomsten er en liten populasjon med den sterkt truede bittergrønn – *Chimaphila umbellata* (EN).

Bruk, tilstand og påvirkning: Vei krysser lokaliteten i vest (nedre del) og i dette området er lokaliteten noe påvirket av friluftsliv.

Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som samlet har store naturverdier.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av et større område med, rik, eksponert blandingskog med forekomst av spesielle arter og elementer som tilsier at det er sannsynlig med ytterligere forekomster av truede arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Spesielle hensyn bør vurderes i de mest påvirkede områdene i nedre del av lokaliteten.

152 Trollaldalen nord 1

Rik edellauvskog – Verdi: B Areal : 17,05 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øverst i lia nord for Trollaldalen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et lite område med løvtrøsket dominert rik skog øverst i lia nord for Trollaldalen. Storvokst osp vokser her sammen med blant annet ask, hassel, eik og en del gran og noe furu. Blåveis – *Hepatica nobilis* er vanlig i feltsjiktet. Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999).

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som samlet har store naturverdier.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en eksponert og rik løvskog med et godt potensial for forekomst av mange interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

153 Trollaldalen nord 2

Rik edellauskog – Alm-lindeskog Verdi: C Areal : 8,11 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt øverst i lia nord for Trollaldalen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av alm-lindeskog i skrenter helt øverst i lia nord for Trollaldalen. Lind dominerer, men også hassel er ganske vanlig. Blåveis – *Hepatica nobilis* inngår i feltsjiktet. Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999).

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som samlet har store naturverdier.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en liten men eksponert alm-lindeskog. Bedre undersøkelser av spesielt insekter og sopp kan føre til en høyere verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

154 Trollaldalen

Gammel barskog – Gammel granskog Verdi: B Areal : 32,40999999999997 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Trollaldalen utgjør en markert kløft langs en bekk fra Svartskogsplatået og ned mot Bunnefjorden sør for Linnekastet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen domineres av storvokst gran. En del død ved finnes og skogen har gammelskogspreg. Vegetasjonen er lågurtpreget over store deler, men små partier med rik sumpskog finnes langs bekken, hvor stor svartor er vanlig. I skrentene inngår alm-lindeskog dominert av lind. Stor osp finnes, foruten hassel, spisslønn og ask. Bekken skjærer gjennom leirrike løsmasser og i nedre del finnes markerte raviner. Lenger opp går bekken gjennom en smal kløft med moserike bergvegger på sidene. Kravfulle arter som flatfjellmose – *Neckera complanata* og putevrimose – *Tortella tortuosa* er registrert. Blåveis – *Hepatica nobilis* er ganske vanlig. Ellers er skjellrot – *Lathraea squamaria* registrert på sitt eneste kjente voksested i kommunen i nedre del av lokaliteten. Skogkarse – *Cardamine flexuosa*, maigull – *Chrysosplenium alternifolium*, firblad – *Paris quadrifolia* og storrap – *Poa remota* er også funnet. Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999). Hanssen & Hansen (1998) gir området middels verneverdi med hensyn til entomologi, og nevner funn av trebukken *Exocentrus lusitanus* og kortvingen *Anotylus clavatus* - to uvanlige arter, men ikke rødlistet.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som samlet har store naturverdier.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av rik, frodig og gammel lågurtskog, samt noe svartorsumpskog. Potensialet for interessante arter er stort.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

155 Trollaldalen øst

Rik sumpskog – Rik sumpskog Verdi: C Areal : 15,74 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øverst i Trollaldalen, vest for Svartskogsplatået.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Øverst i Trollaldalen ligger et område med svartordominert sumpskog. Skogen er temmelig hogstpåvirket, men er tatt med da den kan utvikle seg til en fin svartorsumpskog på sikt og da vil utgjøre en verdifull del av de rike skoglokalitetene i lia vest for Svartskogsplatået, som samlet har store naturverdier. Hele området er vurdert som viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999).

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde.

Verdivurdering: Grunnet stor hogstpåvirkning, manglende funn av viktige elementer og spesielle arter, gis lokaliteten lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

156 Åsen V

Rik edellauvskog – Verdi: B Areal : 12,98 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Tom H. Hofton i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i bratt sørvestvendt skråning ned mot Gjersjøen vest for Åsen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik edelløvskog inngår i veksling med lågurtgranskog og fattigere furuskog på skrinne partier. Lokaliteten har et naturskogspreget med gammel skog og en del død ved, både av gran, furu og løvtrær. Hassel forekommer sammen med litt eik, lind, lønn og bjørk. Skogen er åpen, dels i rasmarg under bratt skrent og hele lokaliteten ligger gunstig til i den sørvestvendte lia med varmt lokalklima. Rik flora med flere interessante arter ble registrert. Her nevnes blåveis *Hepatica nobilis*, trollhegg *Frangula alnus*, våretekknapp *Lathyrus vernus*, rognasal *Sorbus hybrida*, tveskjeggveronika *Veronica chamaedrys*, korsved *Viburnum opulus* og skogvikke *Vicia sylvatica*. På berg vokser svartburkne *Asplenium trichomanes* og mosen krypsilkemose *Homalothecium sericeum*. I øvre del flater terrenget ut. Her inngår lågurtskog, trolig tidligere kulturpåvirket.

Artsmangfold: Antagelig er det potensial for interessante markboende sopp i området.

Verdivurdering: Samlet gir forekomster med rike skogtyper og artsrik flora med flere interessante arter en viktig lokalitet (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

157 Åsen S

Rik sumpskog – Verdi: C Areal : 10,039999999999999 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Tom H. Hofton i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for Åsen i et flattere parti i øvre del av den bratte lia ned til Gjersjøen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes rikere svartordominert sumpskog i kløft som vider seg ut i et flattere parti i øvre del av den bratte lia ned til Gjersjøen. I kløfta finnes en del store steinblokker og høye bergvegger. Skogen er grøfta og under en kraftlinje er det foretatt hogst av skog og kratt. Her ligger det mye hogstavfall. En del stor gran og bjørk inngår også i skogen. Området virker generelt hogstpåvirket og forholdsvis fattig flora ble registrert. Det mest interessante funnet var trollurt *Circaea alpina*. Ellers ble blant annet enghumleblom *Geum rivale*, markjordbær *Fragaria vesca*, mjødurt *Filipendula ulmaria*, skogsvinerot *Stachys sylvatica* og skogfiol *Viola riviniana* registrert. Ut mot kanten av skråningen ned mot Gjersjøen kommer det inn hassel.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er grøftet og under en kraftlinje er det foretatt hogst av skog og kratt.

Verdivurdering: Området vurderes å ha en lokalt viktig verdi (C-verdi) grunnet påvirkningene, ung skog og manglende arter og elementer, men bidrar til variasjon i de rike skogtypene som finnes i Gjersjølia som helhet.

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

158 Fiskern

Rik sumpskog – Verdi: C Areal : 12,66 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2006 i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på NV-siden av Kolbotnvann.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en rikere svartordominert sumpskog i bukt på NV-siden av Kolbotnvann. Noe stor gran inngår i tresjiktet i indre del av området og stor svartor i ytre del. I ytre del ut mot vannet inngår takrørdominert sump. Enkelte kravfulle sumparter ble registrert, blant annet myrkongle *Calla palustris*, mjødurt *Filipendula ulmaria*, sverdlilje *Iris pseudacorus*, klourt *Lycopus europaeus*, fredløs *Lysimachia vulgaris*, firblad *Paris quadrifolia*, skogsivaks *Scirpus sylvaticus* og slyngsøtvier *Solanum dulcamara*. Ute i vannet vokser blant annet sjøsivaks *Scoenoplectus lacustris*.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området ligger nær bebyggelse og preges en del av slitasje fra turgåing, hundelufting og lignende.

Verdivurdering: Området ligger nær bebyggelse og preges en del av slitasje fra turgåing, hundelufting og lignende. På grunn av dette vurderes området som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

159 Tverrveien S

Dam – Verdi: A Areal : 9,86 daa

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Tverrveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av en liten, åpen vanndam og sumpvegetasjon omkring denne og videre sørover langs en liten bekk. Trolig har det vært sammenhengende rik sumpvegetasjon fra Kolbotntjern (se lokalitet 116 og 117 i Bratli 2005) før Tverrveien ble bygd. Her går åpen sumpvegetasjon etter hvert over i rikere sumpskog. Nå består området av en inneklemte og sterkt påvirket sump med frodig vann- og sumpvegetasjon og forekomst av noen kravfulle arter.

Artsmangfold: Blant annet er det flere tuer med den rødlistede arten dronningstarr (*Carex pseudocyperus*) (NT) rundt dammen og spredt nedover langs bekken. Andre arter omfatter blant annet vassgro (*Alisma plantago-aquatica*), myrkongle (*Calla palustris*), mannasøtgras (*Glyceria fluitans*), skogsivaks (*Scirpus sylvaticus*), kjempepigknopp (*Sparganium erectum*) og dunkjevle (*Typha latifolia*). Larver av

både storsalamander (*Triturus cristatus*, VU) og småsalamander (*T. vulgaris*, NT), samt spissnutfrosk (*Rana arvalis*) (NT) er registrert i dammen (Sandaas 2006), i tillegg til en rik vannfauna for øvrig.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området ligger inneklemt og er sterkt negativt påvirket av massefylling på sørsiden av Tverrveien.

Verdivurdering: Samlet gir rik sumpvegetasjon med blant annet dronningstarr og rødlistede amfibier lokaliteten en svært viktig verdi (A-verdi), selv om lokaliteten er sterkt påvirket.

Skjøtsel og hensyn: Ytterligere inngrep og påvirkninger må unngås.

160 Sjødal

Store gamle trær – Ask Verdi: **C** Areal : ,07000000000000007 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag fra DN.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kulturlandskapet rundt Sjødal sør i Oppegård kommune, ved en grøft og inntil et jorde på sørsiden av gården.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en stor ask (samt en litt mindre) som står i kanten langs en grøft/bekk.

Asken er delt i to et par meter over bakken. Den er hul i splitten der hvor stammen deler seg. Treet har en brysthøydiameter på ca 85 cm, og det finnes en del døde greiner. Mose dekker ca 30 % av stammen. Den andre asken er like høyvokst, men ikke så grov.

Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter, men det er potensial for arter knyttet til gammel og hul ask.

Bruk, tilstand og påvirkning: En del yngre løvkratt holder på å vokse opp inntil de store trærne.

Del av helhetlig landskap: Det finnes flere gamle edelløvtrær i kulturlandskapet rundt gården.

Verdivurdering: Relativt grov ask, men ikke veldig gammel. Treet har noe hulrom, men kun som en sprekk fra hvor den er delt. Det er ikke funnet spesielle arter på treet. Vurderes samlet sett som lokalt viktig.

Skjøtsel og hensyn: Løvkratt som kommer opp under trærne samt noen litt mindre trær bør ryddes vekk.

161 Rødkjelda I

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : ,13 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag fra DN.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kulturlandskapet rundt Sjødal sør i Oppegård kommune, ved Rødkjelda øst for Sjødal gård. Treet står i et lite treholt i en hagemark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en stor gammel eik. Eiken er storvokst, med en brysthøydiameter på 90-100 cm, og relativt bred krone. Treet har relativt grov sprekkebar, og en del døde greiner. Treet har en mosedekning på 25-30 %.

Artsmangfold: Soppen *Proliferodiscos tricolor* (sårbar iht. Norsk rødliste 2010) vokser på stammen. Det er potensial for flere arter, bl.a. insekter, knyttet til gammel eik.

Bruk, tilstand og påvirkning: Det står en del andre trær relativt tett innpå eiken.

Del av helhetlig landskap: Det finnes flere gamle edelløvtrær i kulturlandskapet rundt Sjødal.

Verdivurdering: Grov eik med forekomst av en sårbar art gjør at verdien settes til viktig (B).

Skjøtsel og hensyn: Noen småtrær, samt evt en litt større bjørk og en gran, som konkurrerer med konen til eika, bør fjernes.

162 Rødkjelda II

Store gamle trær – Ask Verdi: **C** Areal : ,17 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag fra DN.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kulturlandskapet rundt Sjødal sør i Oppegård kommune, ved Rødkjelda øst for Sjødal gård. Treet står i en vegkant inntil en liten hagemark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en stor bredkronet ask, som har en brysthøydiameter på ca 70 cm. Nedre del av stammen er til stor del dekket av mose. Inntil asken står et piletre (trolig skjørpil) med grov stamme (80 cm) og grov bark. Inntil trærne står noe rosekratt.

Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter, men det er potensial for arter knyttet til gammel ask (og evt pil).

Fremmede arter: Piletreet er fremmed og plantet, men medfører ingen økologisk risiko i området. Det bør få stå.

Del av helhetlig landskap: Det finnes flere gamle edelløvtrær i kulturlandskapet rundt Sjødal.

Verdivurdering: Ask som ikke er spesielt gammel, men er litt grov og som vil utvikle verdier på sikt.

Skjøtsel og hensyn: Eventuell oppskudd av løvkratt under og inntil trærne bør fjernes.

163 Rødkjelda III

Hagemark – Eikehage Verdi: **C** Areal : 2,37 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag fra DN.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kulturlandskapet rundt Sjødal sør i Oppegård kommune, nordvest for Rødkjelda. Ligger i kanten mellom skog og åpent beite.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er karakterisert som hagtemark og består av en skogkant med en del eldre eik og furu. Lokaliteten ligger innenfor et aktivt beite. Tre av eikene er rundt 60 cm i brysthøydiameter. Flere av furutrærne er også grove, noen over 60 cm, og her finnes også relativt grov stående død furu. Et par læger finnes også. Vegetasjonen er relativt åpen, men det er til dels gjengrodd rundt et par av ekene i kanten mot den store beitemarken i sør. Her står også et par halvstore graner. En del eiker og løvkratt finnes i busksjiktet. Feltsjiktet er gressdominert, men til dels dårlig utviklet under mye løv og strø og hvor det er skyggefullt.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Gjengroing er et problem rundt eikene.

Del av helhetlig landskap: Det finnes flere gamle edelløvtrær i kulturlandskapet rundt Sjødal.

Verdivurdering: Del av hagemark hvor litt grove eiker og furu utgjør hovedverdien. Eikene er foreløpig ikke veldig grove, og verdien settes til lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Det bør åpnes opp noe rundt eikene mot kanten i sør. Gran, en del halvstore løvtrær og løvkratt bør fjernes. Grov furu og eik spares.

.....

164 Gjersjøen golfbane 1

Dam – Gårdsdam Verdi: **B** Areal : ,86 daa

Innledning: Dammen ble registrert av Sandaas (2011) og er beskrevet og registrert av BioFokus i 2012 på bakgrunn av ortofoto og beskrivelsen i Sandaas i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger ved Kurud på plenareal på Gjersjøen golfbane, nordøst for klubbhuset.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen er ikke naturtypeundersøkt, og flora og fauna er ikke kartlagt. Funn av frosk og storsalamander er muntlige opplysninger og det trengs bekreftelse på at artene bruker lokaliteten.

Artsmangfold: Storsalamander (VU) skal være sett i dammen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten påvirkes av menneskelig aktivitet via beliggenheten på golfbane og ved at plenarealet går nesten helt ned til vannkanten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en sannsynlig forekomst av en truet art. Lokaliteten bør undersøkes bedre for en sikrere verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig at det lages en buffersone langs kanten av dammen, slik at plenarealet ikke går helt ned mot dammen.

.....

165 Gjersjøen golfbane 2

Dam – Gårdsdam Verdi: **B** Areal : ,66 daa

Innledning: Dammen ble registrert av Sandaas (2011) og er beskrevet og registrert av BioFokus i 2012 på bakgrunn av ortofoto og beskrivelsen i Sandaas i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger ved Kurud på plenareal på Gjersjøen golfbane, nord for klubbhuset.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen er ikke naturtypeundersøkt, og flora og fauna er ikke kartlagt. Funn av frosk og storsalamander er muntlige opplysninger og det trengs bekreftelse på at artene bruker lokaliteten.

Artsmangfold: Storsalamander (VU) skal være sett i dammen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten påvirkes av menneskelig aktivitet via beliggenheten på golfbane og ved at plenarealet går nesten helt ned til vannkanten.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en sannsynlig forekomst av en truet art. Lokaliteten bør undersøkes bedre for en sikrere verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig at det lages en buffersone langs kanten av dammen, slik at plenarealet ikke går helt ned mot dammen.

.....

166 Kolbotn trelast

Dam – Eldre fisketom dam Verdi: **B** Areal : daa

Innledning: Dammen ble kartlagt for amfibier av Sandaas (2011). På bakgrunn av ortofoto og beskrivelsen i Sandaas er lokaliteten beskrevet og registrert av BioFokus i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger øst for parkeringsplassen ved Kolbotn trelasthandel ved Myrvoll.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen ligger inn mot utfylling langs parkeringsplass. Vegetasjon og fauna utenom amfibier er ikke kartlagt.

Artsmangfold: Sandaas angir forekomst av storsalamander *Triturus cristatus* (VU) i dammen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokalitetens nærhet til industri og parkeringsplass gjør at lokaliteten og bestanden av storsalamander bør holdes øye med.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en truet art. Lokaliteten bør undersøkes bedre for en sikrere verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Ytterligere gjenfylling av damområdet må ikke forekomme.

.....

167 Greverud golfbane

Dam – Gårdsdam Verdi: **C** Areal : ,33 daa

Innledning: Dammen ble kartlagt for amfibier av Sandaas (2011) og er beskrevet og registrert av BioFokus i 2012 på bakgrunn av ortofoto og beskrivelsen i Sandaas i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger nordøst for klubbhuset på Greverud golfbane.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en liten dam i kant mellom skogholt, gressplen og turvei beliggende ved golfanlegg. Floraen og faunaen utenom amfibier er ikke undersøkt nærmere.

Artsmangfold: Mye larver av småsalamander *Triturus vulgaris* (NT) fantes i dammen ved befaringen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er en del påvirket på grunn av tilgrensende plenareal.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en nær truet art. Lokaliteten bør undersøkes bedre for en sikrere verdivurdering.

Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig at det lages en buffersone langs kanten av dammen, slik at plenarealet ikke går helt ned mot dammen.

.....

168 Kolbotnvannet, bukt i S

Evjer, bukter og vikar – Bukter og vikar Verdi: **B** Areal : 1,63 daa

Innledning: Bukta i sørenden av Kolbotnvann ble overfladisk undersøkt av Olsen & Reiso (2005). Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i bukta i sørenden av Kolbotnvann ved Sofiemyr.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen er ikke spesielt undersøkt, men består av næringskrevende arter.

Artsmangfold: Ederkoppen *Tetragnatha striata* (VU) er påvist. Den er sterkt knyttet til siv og tårer ved innsjøer og dammer. Arten har noen få eldre funn fra Oslo-området og Lier (sist sett i 1898), i tillegg til dette funnet fra Kolbotnvannet.

Verdivurdering: På grunnlag av ederkoppfunnet avgrenses lokaliteten under tittel som en viktig naturtype (B-verdi). Lokaliteten bør undersøkes bedre.

Skjøtsel og hensyn:

.....

300 Roald Amundsens vei 154

Store gamle trær – Stor eik Verdi: **B** Areal : ,17 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i villabebyggelse på Svartskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Enkelstående eik som måler 90 cm i diameter, har 3-4 cm dyp sprekkebark og har høy dekning av ordinære lavarter og forholdsvis høy mosedekning på treet nordside. Det er lite død ved i treet krone.

Artsmangfold: Gamle og særlig hule eiketrær er viktige for en lang rekke sjeldne og trua arter av sopp, moser, lav og insekter. Det er ikke kartlagt noen spesielle arter i 2011, men treet vil på sikt kunne huse slike.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er parkmessig skjøttet.

Del av helhetlig landskap: Treet står i et av de mest eikerike områdene på østsiden av Oslofjorden. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.

Verdivurdering: Treet størrelse er en del over minimumstørrelsen for å være utvalgt i henhold til Naturmangfoldloven. Treet har forholdsvis grov sprekkebark og trolig ganske gammelt. Lokaliteten vurderes derfor som viktig (B-verdi) per 2011.

Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som i dag. Døde og døende greiner bør ikke fjernes. Dette er viktig da mange arter lever i døde og døende greinverk.

.....

301 Roald Amundsens vei 156

Store gamle trær – Stor eik Verdi: **C** Areal : ,14000000000000001 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i villabebyggelse på Svartskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Enkelstående eik som måler 70 cm i diameter, har 1-2 cm dyp sprekkebark og har lav til middels dekning av lav og lite epifytter av moser. Det er lite død ved i treet krone.

Artsmangfold: Gamle og særlig hule eiketrær er viktige for en lang rekke sjeldne og trua arter av sopp, moser, lav og insekter. Det er ikke kartlagt noen spesielle arter i 2011 på dette treet, men vil på sikt kunne huse slike.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er parkmessig skjøttet.

Del av helhetlig landskap: Treet står i et av de mest eikerike områdene på østsiden av Oslofjorden. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for overlevelse av eiketilknyttede arter på sikt.

Verdivurdering: Treet størrelse er akkurat over minimumstørrelsen for å være utvalgt i henhold til Naturmangfoldloven, men har ellers få kvaliteter i dag. Lokaliteten vurderes derfor kun som lokalt viktig (C-verdi) i dag.

Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som i dag. Døde og døende greiner bør ikke fjernes. Dette er viktig da mange arter lever på/i døde og døende greiner.

.....

302 Roald Amundsens vei 159

Store gamle trær – Furu Verdi: **C** Areal : ,61 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i villabebyggelse på Svartskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av to høyreiste frittstående furutrær som måler ca. 70 cm i diameter. Rundt trærne er det lågurtpreget vegetasjon.

Artsmangfold: Gamle soleksponerte furutrær kan huse flere sjeldne arter av insekter. Ingen arter er påvist per 2011

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er i godt hold og er ikke skjøttet på noen spesiell måte.

Del av helhetlig landskap: Treet står i et av de mest eikerike områdene på østsiden av Oslofjorden. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.

Verdivurdering: Trærne er av moderat størrelse og det er ikke påvist noen spesielle arter knyttet til dem. Lokaliteten gis derfor lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Trærne trenger ingen spesiell skjøtsel, men enda i tilknytning til dem kan med fordel slås/ryddes for beholde den urterike vegetasjonen.

.....

303 Roald Amundsens vei 145

Store gamle trær – Stor eik Verdi: **B** Areal : ,27 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim og Anders Thylen på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, på et gårdstun i Roald Amundsens vei 145.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et stort gammelt tre med utformingen stor eik. Eiken står fritt og er bredkronet. Den kan muligens ha vært styvet langt tilbake i tid. Brysthøydiameter er ca 110 cm. Treet er vitalt, men begynner å få noen døde greiner i kronen, og er ikke hult. Litt grov sprekkebark (ca 3 cm) forekommer. Mosedekke er på ca 10% av stammen, men treet er til stor del dekket med vanlige lavarter så som bristlav.

Artsmangfold: I tillegg til vanlige lavarter vokser relativt mye av soppen eikehårskål (*Proliferodiscus tricolor*) (VU i Norsk rødliste 2010) på stammen. Det er potensial for bl.a. insekter knyttet til gammel eik.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i en plen, og det er ikke konkurrerende trær eller busker i nærheten. En eller evt et par greiner er i ferd med å vokse inn mot et låvetak.

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.

Verdivurdering: Eika er relativt grov, begynner å få grov sprekkebark samt har forekomst av en rødlistet art (VU). Vurderes derfor som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som idag. Døde greiner, også nedfalne, bør spares.

.....

304 Framveien 64

Store gamle trær – Stor eik Verdi: **B** Areal : ,16 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, innerst i Framveien og står på et større tun.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en frittstående bredkronet eik på tun. Treet måler 70 cm i diamter har 2-4 cm dyp sprekkebark, men har ingen hulheter. Over 50 % dekning av lav på stammen, en del mindre dekning av moser. Det er lite dødt greinverk i trets krone.

Artsmangfold: Foruten en del vanlige lav og mosearter finnes flere hundre fruktlegemer av eikehårskål på de nedre deler av stammen.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står åpent og er ikke påvirket negativt.

Del av helhetlig landskap: Treet står i et av de mest eikerike områdene på østsiden av Oslofjorden. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.

Verdivurdering: Forekomsten av en del lav og moser, samt forekomst av den sårbare arten eikehårskål gir verdi som viktig (B-verdi) selv om treet enda ikke er veldig grovt.

Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som i dag. Døde og døende greiener bør ikke fjernes før nødvendig. Dette er viktig da mange arter lever i døde og døende greinverk.

.....

306 Framveien 18

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : ,39 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, straks vest for Bålerud gård, på privat tomt i Framveien 18. Treet står i en plen tett inntil en gruset innkjørsvei.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et stort gammelt tre med utformingen stor eik. Eika er høystammet med mellombred krone. Brysthøydiameter er ca 65 cm. Treet er vitalt, uten døde partier eller hulheter, og det har ikke grov sprekkebark. Det er foreløpig lite mose på treet, men det er til dels dekket med vanlige lavarter som bristlav. Det står et par andre litt mindre eiker i nærområdet.

Artsmangfold: Ikke registrert. På sikt vil treet kunne huse sjeldne arter av bl.a insekter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet rundt og under treet skjøttes som plen. Et par smågraner i veikanten (kanskje tenkt som hekk) er på vei å vokse opp i kronen. Forøvrig er det liten fare for gjengroing.

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.

Verdivurdering: Eik som ennå ikke er spesielt gammel eller grov, men som er stor nok til å ha en viss verdi. Treet mangler ennå spesielle elementer som grov sprekkebark, hulheter etc. og har heller ikke dokumentert arts mangfold, men dette vil kunne utvikles på sikt. Treet vurderes som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Smågraner bør fjernes eller kuttes lavt, slik at de ikke vokser opp i eikekronen.

.....

307 Framveien 49

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : ,38 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, straks vest for Bålerud gård, på privat tomt i Framveien 49. Treene står i en hage tett inntil en gruset innkjørsvei.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen består av to store eiker (naturtype store gamle trær med utformingen stor eik). Eikene er begge relativt bredkronet, og har en brysthøydiameter på ca 80 respektive 75 cm. Trærne er vitale, uten døde partier eller hulheter. Spesielt det største treet har noe grov sprekkebark (ca 3 cm). Det største treet har ca 25 % mosedekke, det andre noe mindre, men det er mye lavpåvekst med vanlige lavarter som bristlav, papirlav og ragglav.

Artsmangfold: Soppen *Proliferodiscus tricolor* (rødlistet som VU iht. Norsk rødliste 2010) vokser på stammen av det største treet. Det er potensial for andre sjeldne arter av sopp, lav, moser og insekter knyttet til gammel eik

Bruk, tilstand og påvirkning: Det står en del hagebusker inntil og til dels under trærne. Per i dag er buskene relativt lave og skygger ikke altfor mye av trestammene. Om buskene, spesielt syrin, vokser seg høyere vil det kunne være uheldig for eikene og arts mangfoldet knyttet til dem.

Fremmede arter: Syrin, Rhododendron m.fl vokser inntil og til dels under trærne.

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.

Verdivurdering: To relativt store eiker (men uten død ved eller hulrom) med en dokumentert rødlisteart (VU) tilsier verdi som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Unngå beskæringer og fjerning av død ved.

308 Linnekastveien vest

Strandeng og strandsump – Verdi: **C** Areal : ,25 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, ved stranden av Bunnefjorden sør for Svartskog brygge. Lokaliteten er avgrenset mot fattigere berg og furuskog mot øst, mot mer brukt og påvirket strand mot sør, samt mot fattigere strandberg mot nord.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en mosaikk av strandeng og rikt strandberg. Den lavereliggende delen av biotopen består av flate strandberg helt ned mot vannet. Her finnes flere mindre strandenger med saltsiv-vegetasjon. Sør i biotopen finnes også en strandeng på mer grovkomet underlag og med mindre sammenhengende vegetasjonsdekke. Her finnes en liten, bratt bergvegg med relativt rik vegetasjon i bakkant av strandengen.

Arts mangfold: De nordlige strandengpartiene har en flora av saltsiv, krypkvein, rødsvingel, strandkjemper, strandaster, tiriltunge, følblom og strandkryp. I noen litt beskyttede partier vokser gul frøstjerne og strandvortemelk. På strandengen i sør tilkommer bl.a. fjæresalauk, flere melde-arter, gulstarr og vill-lin. På det bratte strandberget i sør er det relativt rik flora med god forekomst av blodstorkenebb, smørbukk, svartburkne og dvergmispele.

Bruk, tilstand og påvirkning: Et par små strandhytter/naust og en brygge deler opp biotopen.

Fremmede arter: Gravbergknapp finnes på strandberget, foreløpig i en relativt liten bestand.

Del av helhetlig landskap: Langs vestsiden av Svartskog-platået finnes et par lokaliteter med kantkratt og rikt strandberg.

Verdivurdering: Liten biotop uten større sjeldenheter, men relativt artsrik flora som skiller seg ut fra omgivelsene og fra den forøvrig mer fattige strandlinjen. Vurderes å ha lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Foreløpig lite behov, men om gravbergknapp begynner å bre seg, kan det være behov for fjerning. En bør også unngå nedbygging eller at privat virksomhet brer seg.

309 Svartskogveien 20

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 3,79 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, ved stranden av Bunnefjorden nord for Svartskog brygge, inne på privat tomt ved Svartskogveien 20.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et stort gammelt tre med utformingen stor eik. Eiken står fritt og er bredkronet. Brysthøydiameter er ca 85 cm. Treet er vitalt, uten døde partier eller hulheter, og det har litt grov sprekkebark (3 cm). mosedekke er på ca 10% av stammen, men treet er også dekket med vanlige lavarter som bristlav.

Arts mangfold: Det er ikke registrert rødlistearter eller sjeldne arter på treet. Skjellgrye og grønnsotnål vokser på stammen. Det er potensial for insekter, lav, moser og sopp knyttet til gammel eik.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i en plen, og det er ikke konkurrerende trær eller busker i nærheten.

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.

Verdivurdering: Eika er relativt grov og en god del over minstestørrelsen for utvelgelse i forskriften. Treet begynner å få grov sprekkebark, men har ellers lite spesielle elementer. Som del av eikelandskapet på Svartskog vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov.

310 Bålerudbrygga sør

Rikt strandberg – Sørlig Verdi: **B** Areal : 14,14 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, ved stranden av Bunnefjorden sør for Bålerudbrygga. Lokaliteten er avgrenset mot fattigere strandberg i sør, mot furuskog i øst og mot fattigere og mer påvirket berg i nord. Her er mye nakent berg og grunnlendt mark som skråner ned mot fjorden i vest. Berggrunnen består av glimmergneis evt med innslag av rikere berg. Grunnen er stort sett tørr, men det er en del fuktige sig.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er rikt strandberg av sørlig utforming. Vegetasjonen består av relativt rike utforminger av strandberg (X1b), bergflate (F3a/b), og urterik kant (F4a/b). Vegetasjonen er halvåpen, med et glissent tre- og busksjikt av småfuru, einer og løvtrær. Urter og røsslyng dominerer feltsjiktet, som ikke er sammenhengende.

Arts mangfold: Rikt mangfold av varmekjære karplanter. Blodstorkenebb og markmalurt er til dels dominerende. I bergsprekker vokser olavsskjegg og lodnebegne og på bart fjell smørbukk, kantkonvall og hvitbergknapp. Andre rikelig forekommende arter er bergmynte, prikkperikum, knegras, flekkgriese, bakkemynte og entjæreblom. En busk av rognasal ble funnet.

Bruk, tilstand og påvirkning: To strandhytter med tilhørende brygge er utelatt fra biotopen i sør. I nordre del er det mye aktivitet sommerstid, med bading, grilling etc. Det er noe slitasje på vegetasjonen, og noe søppel. Tendenser til gjengroing, spesielt i kanten mot skog.

Fremmede arter: Noen mindre busker av rynkerose finnes i nordre del. Blankmispel, berberis og engrødtopp forekommer også.

Del av helhetlig landskap: Langs vestsiden av Svartskog-platået finnes et par lokaliteter med kantkratt og rikt strandberg.

Verdivurdering: Rikt, velutviklet og relativt stort areal med strandberg og kantkratt for å være på østsiden av fjorden. Selv med noe slitasje i deler av området vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Rynkerose bør fjernes fra området. Fremmede mispel-arter samt berberis bør holdes under oppsikt og evt fjernes hvis de brer seg mer. Det kan på sikt være behov for en forsiktig krattrydding, spesielt mot skogkanten.

311 Svartskogbrygga nord

Kalkskog – Lågurtkalkskog i kyststrøk Verdi: C Areal : 4,9000000000000000 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, i en vestvendt skråning mot Bunnefjorden, sør for Bålerudbrygga.

Lokaliteten er avgrenset mot tomt i sør, og mot fattigere furuskog i øst og nord. Berggrunnen består av glimmergneis.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er hovedsakelig en rik lågurtfuruskog (kalkskog), men med innslag av sørvendt berg og rikt strandberg. Furuskogen er ikke gammel, men er variert med innslag av gran, hassel og andre løvtrær. I feltsjiktet er det en blanding av blåbær- og lågurtvegetasjon med bl.a. blåveis, knollerte knapp, teiebær og lokalt noe blodstorkenebb. I sør, til dels på privat tomt hvor det er noen rester av hageanlegg, er det en vestvendt bratt skrent med rik tørrbakke- og sigevannspåvirket vegetasjon. Ask og askekratt forekommer i kantene, og området bærer noe preg av gjengroing. Et litt rikere strandberg finnes nord i lokaliteten. I nordøst kommer det ned et sig fra lia, med gran og en del rikmarks- og fuktkrrevende arter som krossved og hvitbladistel.

Artsmangfold: I bergskrenten i sør vokser varmekjære karplanter som geitved, blodstorkenebb, nyresildre, bergmynte og lodnebegne. Lågurtarter som blåveis finnes i furuskogen. På strandberg mot nord finnes dessuten flekkgriseøre og kattefot. I litt rik fuktig skog vokser børstebrunpigg (VU iht Norsk rødliste 2010) og gul trompetsopp.

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke veldig gammel, og påvirket av tidligere hogstaktivitet. Øvre deler av skrenten i sør er tidligere parkmessig skjøttet, men er nå i gjengroing.

Fremmede arter: Berberis og fremmede mispler forekommer spredt i åpnere partier.

Del av helhetlig landskap: Litt rikere skogpartier og strandberg forekommer spredt på Svartskog-platået.

Verdivurdering: Mosaikk av skog og åpnere mark. Relativt rik bakkevegetasjon, men ikke gammel skog eller elementer knyttet til gammel skog. Vurderes som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes noe kratt ved tørrbergene i sør. Ellers anbefales fri utvikling.

312 Bekkenstenbekken

Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: B Areal : ,070000000000000007 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Jon T. Kleppslund i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging og av Terje Blindheim høsten 2011 på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en liten bekkedal i møte mellom Bekkenstenveien og Ingierstrandveien på Svartskog. Forholdsvis rik vegetasjon med mye løsmasser i nedre deler mot bekken. Kløfteformen skaper en del topografisk variasjon selv i dette lille området.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en liten bekkedal/kløft, men kvalitetene kan best beskrives som en rik blandingsskog da treslagsvariasjonen er stor og kløftepreget er forholdsvis marginalt i det meste av området. I de sørvendte bakkene ned mot bekken er det en del lind og hassel, og det finnes noen større furutrær, bjørk, gran, svartor og litt rogn og selje. Det finnes spredt med bergvegger som er noe mosede og intermediært rike. Død ved av både gran og løv forekommer spredt, men dødved-kontinuiteten er svak. Skogen er høyreist og godt sjiktet og fuktighetsforholdene i denne lille lokaliteten er trolig forholdsvis stabilt høye.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er kartlagt, men det kan være et visst potensial for markboende sopp, vedboende sopp på noe sikt, samt insekter knyttet til fuktige miljøer.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er lite påvirket i senere år, men i møte med Ingierstrandveien går elva i rør og her er det en stor og høy fylling tvers over bekkedalen. I sørvest grenser lokaliteten til en gammel steinfylling.

Verdivurdering: Lokaliteten er liten, men inneholder en del kvaliteter som er potensielt viktige for mange arter som ikke overlever i intensivt drevne skoger. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B-verdi), men ligger helt på grensen til å ha lokal verdi.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling.

313 Ingierstrandveien Ø I

Store gamle trær – Furu Verdi: C Areal : ,06 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bekkensten på Svartskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av et enkelt furutre med en diameter på ca. 50 cm. Treet står eksponert til, noe som er viktig for insektarter knyttet til denne typen element.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert, men treet har et potensial på sikt dersom det får utvikle seg til å bli gammelt.

Verdivurdering: Treet vurderes per i dag som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke er spesielt grovt eller noen spesielle arter er påvist.

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle hensyn nødvendig.

314 Ingierstrandveien Ø II

Store gamle trær – Furu Verdi: C Areal : ,59 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bekkensten på Svartskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av et enkelt furutre med en diameter på ca. 50 cm. Treet står eksponert til, noe som er viktig for insektarter knyttet til denne typen element.

Artsmangfold: Gnag av bille er påvist, men det er usikkert hvilken art. Det kan være snakk om reliktbukt som er en sjelden billeart.

Verdivurdering: Treet vurderes per i dag som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke er spesielt grovt eller noen spesielle arter er påvist.

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle hensyn nødvendig.

.....

315 Ingierstrandveien 130

Rikt strandberg – Sørlig Verdi: **C** Areal : ,4 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i overgangen mellom strandberg og etablert skog/hage i et hytteområde på Svartskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen består av rikt strandberg, med en noe tørkeutsatt rik engvegetasjon.

Blodstorkenebb-eng er vanligste utforming av vegetasjonen. Her finnes arter som nikkesmelle, gullkløver, harekløver og dunhavre.

Artsmangfold: Rik engvegetasjon med bl.a. nikkesmelle (rødlistet som NT iht. Norsk rødliste 2010). Urterike enger i kystnære områder har ofte et rikt mangfold av insektarter knyttet til seg. Et slik mangfold er imidlertid hverken undersøkt eller dokumentert for denne lille lokaliteten.

Fremmede arter: Området er noe preget av gjengroing med syrin og andre buskarter. Det vokser også en del gravbergknapp innenfor den avgrensede lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten er forholdsvis artsrik, men er liten, ganske isolert og det er ikke påvist sjeldne og trua arter. Den er påvirket av fremmede arter, tråkk og slitasje. Samlet vurderes området å ha lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Området bør holdes så åpent som mulig. Dvs. at busker av særlig syrin bør tynnes en del, og videre spredning bør forhindres. Gravbergknapp er en aggressiv art som danner tette tepper på skrinne mark. Arten utkonkurrerer andre arter og ødelegger på sikt den naturlige vegetasjonen. Dersom det gjøres forsøk på å luke vekk arten bør planterestene brennes eller komposteres. De frodigste delene av engene kan med fordel slås år om annet.

.....

316 Bekkenstenveien 70

Slåttemark – Frisk/tørr, middels baserik eng Verdi: **C** Areal : ,36 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud. Lokaliteten er ikke godt registrert og bør vurderes nøyere på sommerstid. Dette gjelder både avgrensning, beskrivelse og verdivurdering.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østre siden av Bekkenstenveien på Svartskog, mellom skog, vei og boligtomt.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjør et lite restfragment av det som mest trolig er gammel slåttemark.

Området har lågurtvegetasjon og må betegnes som forholdsvis tørr baserik eng.

Artsmangfold: Potensial for spesielle insekter knyttet til rik engvegetasjon. Bør undersøkes nøyere.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er ikke i nevneverdig grad hevdet senere år.

Verdivurdering: Da lokaliteten er liten, under gjengroing og ingen spesielle arter er påvist, vurderes lokaliteten å være av lokal verdi (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Enga bør slås år om annet og kratt og trær bør fjernes. De høyreiste furuene inn mot skogen bør ikke røres.

.....

317 Vest for Bålerud II

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 4,88 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim og Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud. Fra tidligere registreringer inngikk den i lokalitet BN00027885 men er nå blitt skilt ut som egen biotop.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, straks vest for Bålerud gård, inntil Roald Amundsens vei.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en stor gammel eik. Eika er relativt bredkronet og har en brysthøydiameter på ca 90 cm. Treet har ca 40% mosedekning etter å ha stått skyggefullt over tid. Det er en god del døde greiner på treet, men grov sprekkebark mangler foreløpig.

Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet, men det kan være potensial for eiketilknyttede arter av insekter, moser og sopp.

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er relativt tett og ung skog i området rundt treet. Nylig er det imidlertid blitt ryddet noe rundt treet, men det er fortsatt både gran og løvtrær som står tett innpå.

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.

Verdivurdering: Eika er grov og begynner å få grov sprekkebark. Treet har en del døde greiner, men er ikke hult. Som del av eikelandskapet på Svartskog vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør fristilles.

.....

318 Linnekastveien 13 N

Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: **C** Areal : 4,9 daa

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2009. Beskrivelse er innlagt av BioFokus høsten 2011.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, i en vestvendt skråning på østsiden av Linnekastveien og sør for Svartskog brygge. Lokaliteten utgjøres av en skogteig omgitt av vei i vest, nord og øst samt tomt / bebyggelse i sør.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik blandingsskog i lavlandet, med et tresjikt av gran, edelløvtrær og boreale løvtrær. En mer inngående beskrivelse vil komme.

Artsmangfold: Ikke registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Storvokste trær finnes, men skogen er ikke spesielt gammel, og mangler foreløpig naturskogskarakterer som død ved etc.

Verdivurdering: Skogen har relativt rik vegetasjon, men er ikke gammel og mangler naturskogskarakterer. Verdien settes til lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte.

.....

1001 Bekkenstenveien 7, 50 m NV for mobilmast

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", rett øst for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 232 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2008.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1002 Bekkenstenveien 13, 60 m NV for mobilmast, ved grind

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", rett øst for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 237 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2008.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1003 Bekkenstenveien 7, 20 m NV for mobilmast

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", rett øst for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 343 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2008.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1004 Bekkenstenveien 7, 50 m NØ for mobilmast, inntil vei

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett øst for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 241 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt ca. 2004.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1005 Bekkenstenveien 7, 20 m S for mobilmast

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 290 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1006 Bekkenstenveien 7, 50 m S for mobilmast

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 230 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og mye mose.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1007 Oppegård kirke, 70 m V for kirkegård, sammen med nr. 8

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim og nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 220 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1008 Oppegård kirke, 70 m V for kirkegård, ved nr. 7

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", sørøst for Solheim og nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 232 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og mye mose.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1009 Oppegård kirke, 60 m V for kirkegård, 10 m Ø for 7 og 8

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", sørøst for Solheim og nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 247 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1010 Solheim, 20 m V for steingjerde

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", sørøst for Solheim og nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 218 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1011 Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 1 m S for høyspent

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 268 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1012 Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 5 m S for nr. 11
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 260 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1013 Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 3 m V for nr. 12
Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 322 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1014 Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 15 m S for nr. 13
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 287 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1015 Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 10 m S for nr. 14
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 217 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1016 Oppegård kirke, 30 m V for nr 15, i åkerkant

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nord for Oppegård kirke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Treet måler 264 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1017 Oppegård kirke, 50 m V for parkering, veikant

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård kirke”.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Treet måler 330 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1018 Oppegård kirke, 50 m V for parkering, 10 m S for nr 17

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård kirke”.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Treet måler 207 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1019 Oppegård kirke, 60 m N for kirke, ved vei

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård kirke”.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Treet måler 330 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1020 Oppegård kirke, ved inngang

Store gamle trær – Eik Verdi: A Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård kirke".

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 455 cm i omkrets. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen er vid og lav. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er bardunert. Fristilling gjøres 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av treets størrelse og at det er hult. Treet bør undersøkes nærmere med tanke på trelevende insekter og sopp.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1021 Solheim, 10 m Ø for parkering. Ved oldtidsvei-skilt

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", rett øst for Solheim, på nordsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 230 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2008.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1022 Solheim, 3 m N for parkering, ved skiløype

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", rett øst for Solheim, på nordsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 217 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1023 Solheim, mellom vei og danseplattung

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", nordøst for Solheim, på nordsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 200 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2008.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1024 Bekkenstenvn. 5 m N for vei. 15 m N for barnepark
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", rett nord for Solheim, på nordsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 247 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1025 Solheim. I barnepark
Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", nordvest for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 320 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Fristilling gjøres 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og at det er hult.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1026 Solheim. I hagen inntil huset
Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", ved Solheim.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 323 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1027 Solheim. 3 m Ø for høyspent
Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", vest for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 285 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning ved bakkenivå. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og at det er hult.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1028 Solheim, 10 m V for høyspent

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, vest for Solheim, på sørsiden av Bekkenstenveien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 325 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og forekomst av mye død ved.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1029 Solheim, 20 m V for brønnhus

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett sør for Solheim.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 234 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2009.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1030 Solheim, 30 m V for brønnhus

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett sør for Solheim.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 345 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2009.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og at det er hult.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1031 Vestre Oppegård, eikehage, 30 m Ø for oldtidsvei

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skogområde mellom Vestre Oppegård og Solheim.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 236 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1032 Vestre Oppegård, eikehage, 70 m N for ID31

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skogområde mellom Vestre Oppegård og Solheim.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 316 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og begynnende sprekkebark.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1033 Vestre Oppegård, eikehage, 10 m Ø for oldtidsvei

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark mellom Vestre Oppegård og Solheim.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 269 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret og bardunert. Gradvis fristilling påbegynt 2007.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og begynnende sprekkebark.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1034 Vestre Oppegård. På åkerholme 130 m SV for hus

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Sør for Oppegård Vestre”, på åkerholme sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 314 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er vid og lav. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har lav vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1035 Vestre Oppgård. Eikelunden VI

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 206 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1036 Vestre Oppegård. Eikelunden V

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 254 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med mye mose.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1037 Vestre Oppegård. Eikelunden IV

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 208 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedecking.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1038 Vestre Oppegård. Eikelunden III

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 204 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedecking.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1039 Vestre Oppegård. Nord i eikelunden

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 254 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1040 Vestre Oppegård. Eikelunden II

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 135 cm i omkrets. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen er høy. Barken har grove sprekker (< 30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets hulhet.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1041 Vestre Oppegård. Eikelunden I

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i skog sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 291 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1042 Bekkenstenveien ved høyspent

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", langs Bekkenstenveien sørvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 245 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1043 Vestre Oppegård, nord i eikerekke

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 328 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1044 Vestre Oppegård, i eikerekke IV

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 343 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1045 Vestre Oppegård, i eikerekke III

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 349 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er vid og lav. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1046 Vestre Oppegård, i eikerekke II

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 268 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1047 Vestre Oppegård, i eikerekke I

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Ved Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sør for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 350 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1048 Vestre Oppegård, 60 m S for eikerekke

Store gamle trær – Eik Verdi: **A** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sør for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 663 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1049 Vestre Oppegård, 15 m S for ID48

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sør for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 341 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1050 Vestre Oppegård, 30 m S for ID49

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eik i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 155 cm i omkrets og er dødt. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Tre kronen er høy. Stammen har lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets hulhet.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1051 Østredammen, 50 m SV for dammen

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 266 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og mye mose.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1052 Østredammen, 5 m V for steingjerde, 50 m V for dam

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 211 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedecking.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1053 Østredammen, 5 m V for steingjerde, 1 m N for ID52

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 212 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedecking.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1054 Østredammen, 2 m V for steingjerde, 50 m NV for dam

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 206 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedecking.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1055 Østredammen, 60 m NV for dam

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 280 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1056 Østredammen, 20 m N for ID55

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 200 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1057 Solheim, 90 m N for parkering, 5 m Ø for skiløype

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i skogområde mellom Vestre Oppegård og Solheim.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 276 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1058 Vestre Oppegård, nordvestre hjørne av åker, 5 m V for sti/åker

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i nordkanten av dyrket mark vest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 226 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1059 Vestre Oppegård, nordvestre hjørne av åker, 2 m Ø for ID58
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i nordkanten av dyrket mark vest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 228 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1060 Vestre Oppegård, sti mot hundesletta, 30 m V for utedo
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i skog nord for dyrket mark, nordvest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 234 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1061 Vestre Oppegård, 40 m Ø for sti, 50 m NØ for ID59
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i nordkanten av dyrket mark vest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 235 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1062 Vestre Oppegård, 50 m Ø for ID58, 30 m Ø for åkerhjørne
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i nordkanten av dyrket mark vest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 214 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1064 Vestre Oppegård, 40 m NV for ID63
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i nordkanten av dyrket mark vest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 204 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og mye mose.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1065 Vestre Oppegård, 150 m V for hus, 55 m S for ID64
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i nordkanten av dyrket mark vest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 231 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er vid og lav. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1066 Vestre Oppegård, 130 m V for hus, 50 m Ø for ID65
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i nordkanten av dyrket mark vest for Vestre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 218 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1068 Østre Oppegård, 150 m N for hus, langs åkerkant
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark, rett nord for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 238 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1069 Østre Oppegård, 115 m N for ID72. I NØ-hjørne av åker, 100 m V for E18

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 2", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 235 cm i omkrets. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1070 Østre Oppegård, 50 m N for ID72. ved åkerkant

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 2", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 253 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1071 Østre Oppegård, 25 m N for ID72, ved åkerkant

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 2", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 233 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1072 Østre Oppegård, 200 m Ø for åkerholme

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 2", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 460 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1073 Østre Oppegård, 40 m S for 72, i dump ved traktorvei

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 2", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 240 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1074 Østre Oppegård, 180 m S for ID72. I SØ-hjørne av åker

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor søndre del av lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 2", sørøst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 237 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1075 Østre Oppegård, 180 m Ø for låve, 80 m V for ID72

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 1", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 242 cm i omkrets. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av trets hulhet og begynnende sprekkebark.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1076 Østre Oppegård 180 m Ø for låve, 5 m N for ID75

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 1", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 254 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1077 Østre Oppegård, 180 m Ø for låve, 20 m N for ID76

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 1", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 236 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1078 Østre Oppegård, 80 m Ø for vognskjul, 40 m V for ID75

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Østre 1", øst for Østre Oppegård, mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 264 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1079 Østre Oppegård, ved vognskjul bak låve

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Sør for Oppegård Østre", rett sør for Østre Oppegård på en liten åkerholme.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 280 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1080 Østre Oppegård, på åkerholme

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark, rett sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 385 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1081 Østre Oppegård, 60 m S for åkerholme II

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skogkant mot dyrket mark, rett sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 206 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1082 Østre Oppegård, 60 m S for åkerholme I

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog ikke langt fra dyrket mark, rett sør for Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 234 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1083 Østre Oppegård, 80 m S for åkerholme

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 1”, på åpen mark på Østre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 236 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1084 Grønmo, nordre åkerkant ved skiløype, 80 m Ø for Roald Amundsensvei
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark nordøst for Måkeskjær.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 253 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1085 Grønmo, nordre åkerkant ved skiløype, 70 m Ø for Roald Amundsensvei
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark nordøst for Måkeskjær.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 227 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1086 Grønmo, 70 m NØ for vognskjul, 10 m N for høyspentlinje
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark nordøst for Grønmo.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 216 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og mye mose.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1087 Grønmo, Ø for vognskjul ved gjerde til barnehage
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark øst for Grønmo.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 227 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1088 Grønmo, 80 m Ø for barnehage, 5 m S for høgspeint
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark øst for Grønmo.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 217 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1089 Grønmo, 70 m SØ for barnehage ved åkerkant
Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Solheim - Oppegård Vestre", i kant av dyrket mark sørøst for Grønmo.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 380 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1090 Grønmo, 60 m SØ for ID89, ved hjørne på strømgjerde
Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 1", i kant av dyrket mark sørøst for Grønmo.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 307 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

1091 Søndre Oppegård, 390 m Ø for tømmerlåve, 50 m Ø for høyspent, ved smal, lang åker
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 7", i kant av dyrket mark øst for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 282 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Fristilt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1092 Søndre Oppegård, 390 m Ø for tømmerlåve, 50 m Ø for høyspent, ved smal, lang åker. 20 m NØ for ID91

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 7", i kant av dyrket mark øst for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 251 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Fristilt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1093 Søndre Oppegård, 240 m SV for vognskjul

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 6", i kant av dyrket mark sørvest for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 260 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1094 Søndre Oppegård, åkerholme 150 m V for Sjødalveien

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 3", på liten åkerholme helt sør på åkrene sør for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 224 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Tre kronen er vid og lav. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1095 Søndre Oppegård, sør på Rudøya, 180 m V for ID94, ved traktorvei

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 5", i kant av åker i et skogsparti omgitt av dyrket mark i sørvestre del av åkrene sør for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 268 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen er høy. Barken er relativt glatt og jevn og med mye mose.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1096 Søndre Oppegård, Vest på Rudøya

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 5", i kant av åker i et skogsparti omgitt av dyrket mark i sørvestre del av åkrene sør for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 300 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1097 Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 6", i kant av åker og skogsparti i sørvestre del av åkrene til Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 322 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1098 Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 5 m V for ID97

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 6", i kant av åker og skogsparti i sørvestre del av åkrene til Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 229 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av trets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om trets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1099 Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 15 m V for ID98

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 6", i kant av åker og skogsparti i sørvestre del av åkrene til Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 264 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1100 Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 5 m V for ID99

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 6", i kant av åker og skogsparti i sørvestre del av åkrene til Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 150 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning ved bakkenivå. Trekronen er høy. Barken har grove sprekker (< 30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har lav vitalitet og er bardunert. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets hulhet.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1101 Søndre Oppgegård, 70 m NV for Rudøya. 40 m V for ID100

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 6", i kant av åker og skogsparti i sørvestre del av åkrene til Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet ble ikke målt og hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av mangelfulle data.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1102 Søndre Oppgegård, 70 m NV for Rudøya, 45 m V for ID100

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre 6", i kant av åker og skogsparti i sørvestre del av åkrene til Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 246 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling så vidt begynt mot åkerkant.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1103 Søndre Oppegård, 110 m NV for Rudøya, 60 m V for ID103
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av åker og skogsparti i sørvestre del av åkrene til Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 237 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1105 Søndre Oppegård, ved hønsehus
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 253 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1106 Søndre Oppegård, ved hønsehus. 5 m V for 105
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 208 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. Treet er friskt og er bardunert.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er bardunert.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1107 Søndre Oppegård, ved hønsehus. 10 m V for 105
Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 249 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1108 Søndre Oppegård, ved stabbur

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik stående i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Treet måler 245 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hullheter. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet ble kraftig beskåret i 2010, noe som antagelig drepte treet.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1109 Søndre Oppegård, mellom ID108 og stabbur

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Treet måler 260 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hullheter. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har lav vitalitet og kraftig beskjæring for sikkerhet ble gjort i 2010.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1110 Søndre Oppegård, allé mellom hus III

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Treet måler 223 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hullheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet må begrenses og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1111 Søndre Oppegård, allé mellom hus I

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde.

Treet måler 227 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hullheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet må begrenses og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1112 Søndre Oppegård, allé mellom hus II

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 248 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1113 Søndre Oppegård, 10 m V for hovedbygning

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 260 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning ved bakkenivå. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1114 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning XII

Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 318 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1116 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning XI

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 248 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1117 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning X

Store gamle trær – Eik Verdi: C Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 250 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1118 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning IX

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 237 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1119 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VIII

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 263 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1120 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VII

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisetningen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 332 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy.

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1121 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VI

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 284 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1122 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning V

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 225 cm i omkrets og er dødt. Treet er hult med en større åpning ved bakkenivå. Tre kronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treet's hulhet og mye død ved.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1123 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning IV

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 276 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1124 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning III

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 215 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1125 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning II

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 293 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1126 Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning I

Store gamle trær – Eik Verdi: **C** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Oppegård Søndre", i kulturmark ved Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 218 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1127 Søndre Oppegård i eplehage I

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre I", i kulturmark nordøst for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 326 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

1128 Søndre Oppegård i eplehage II

Store gamle trær – Eik Verdi: **B** Areal : 0,1 daa

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten "Øst for Oppegård Søndre I", i kulturmark nordøst for Søndre Oppegård.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 427 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Tre kronen er vid og lav. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert.

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret.

Del av helhetlig landskap: Eika er en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg.


Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treet's størrelse.

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treet's voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke forekomme.

.....

4 Referanser

- Bratli, H. 2008. Biologisk mangfold i Oppegård kommune - Supplerende kartlegging 2007. Notat 2008.
- Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13. 2. reviderte utgave. 254 s.
- Hofton, T. H. 2006. Biologiske verdier i Gjersjølia, Oppegård kommune. Siste Sjanse notat 2006/12.
- Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Norge.
- Thylén, A. og Blindheim, T. 2011. Naturverdier ved Bålerud, Oppegård kommune. BioFokus-rapport 2011-36. 15 s.
- Sandås, K. 2011. Amfibier i Oppegård kommune 2011. Utbredelse og bestandsstatus. Faglige prioriteringer. Forslag til tiltak. 15 s.



BioFokus er en ideell stiftelse som skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. BioFokus ønsker å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

En kunnskapsbasert forvaltning forutsetter god dokumentasjon av de arealene som skal forvaltes. BioFokus legger derfor stor vekt på feltarbeid for å sikre oppdaterte og relevante data om botanikk, zoologi, økologi, samt avgrensning og verdisetting av områder.

Høy kompetanse er en forutsetning for å kunne registrere og presentere biologisk mangfold-data på en god måte. BioFokus sine medarbeidere er derfor godt skolert innenfor en rekke artsgrupper og har en bred økologisk forståelse for de ulike naturtypene som de arbeider med, det være seg skog, kulturlandskap eller ferskvann. Digitale verktøy som databaser, GIS og bilde-behandling er viktige redskaper i vårt arbeid for å anskueliggjøre naturverdier på en best mulig måte.

Stiftelsen utgir to digitale rapportserier som heter BioFokus-rapport og BioFokus notat,
<http://www.biofokus.no/Publikasjoner/publikasjoner.htm>



Gaustadalléen 21
0349 OSLO
Org.nr: 982 132 924
post@biofokus.no
www.biofokus.no

ISSN 1504-6370
ISBN 978-82-8209-201-2

BioFokus-rapport 2012-16