

Bekkekløfter i Buskerud – oversikt over potensielt biologisk interessante lokaliteter

Tom HELLIK Hofton



Ekstrakt

På oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud har BioFokus laget en kort oversikt over bekkekløfter i Buskerud fylke som antas å kunne ha interessante biologiske kvaliteter.

Formålet er å få en mest mulig komplett oversikt i forkant av systematiske kartlegginger av naturtypen bekkekløfter. Oversikten vil også kunne være nyttig ifbm framtidige kartlegginger av ulike arter.

183 bekkekløfter er plukket ut som potensielt interessante. Disse er kort beskrevet i stikkordsform. Områdene er inntegnet og nummerert på N50-kartkopier (egne pdf-filer).

Oversikten er basert på gjennomgang av flyfoto (tilgjengelig på internett), rapporter, notater, kontakt med kjente folk, og egne erfaringer fra feltarbeid i fylket i ulike sammenhenger.

Nøkkelord

Buskerud
Bekkekløft
Biologisk mangfold

Omslag

FORSIDEBILDER
Nedre: Eidsåi (Nore og Uvdal)
Midtre: Sløgja (Sigdal)
Øvre: Huldestry (Sløgja, Sigdal)
(fotos: Tom H. Hofton)

LAYOUT
Blindheim Grafisk

ISSN: 1504-6370

ISBN: 978-82-8209-026-1

Biofokus rapport 2007-18

Tittel

Bekkekløfter i Buskerud –
oversikt over potensielt biologisk interessante lokaliteter

Forfatter

Tom Hellik Hofton

Dato

10.12.2007.

Antall sider

18 sider + kartvedlegg (2 pdf-filer)

Publiseringstype

Digitalt dokument (Pdf). Som digitalt dokument inneholder denne rapporten "levende" linker.

Oppdragsgiver

Fylkesmannen i Buskerud

Tilgjengelighet

Dokumentet er offentlig tilgjengelig.

Andre BioFokus rapporter kan lastes ned fra:
<http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>

BioFokus: Gaustadallèen 21, 0349 OSLO

Telefon 2295 8598

E-post: post@biofokus.no Web: www.biofokus.no

Forord

På oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud har BioFokus laget en oversikt over bekkekløfter i Buskerud. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært Eldfrid Engen. Prosjektansvarlig hos BioFokus har vært Tom H. Hofton.

Oslo, 10.12.2007.

Tom H. Hofton

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud har BioFokus (ved Tom H. Hofton) laget ei oversiktsliste over potensielt biologisk interessante bekkekløfter i fylket.

Topografiske kart og flyfoto er systematisk gjennomgått, og det er også gjort søk i viktige kilder (diverse rapporter og notater, delvis upublisert), samt også lokalkunnskap. Resultatet har blitt 183 områder som antas å ha større eller mindre potensial for naturverdier knyttet til naturtypen bekkekløft. Områdene fordeler seg på hele fylket, men med konsentrasjon til midtre og øvre deler av de store dalførene.

Det er også gjort en grov (dvs. beheftet med mange usikkerheter) inndeling i tre prioriteringskategorier, etter antatt potensiell (eller for noen områder kjent) naturverdi. Av disse 183 er 59 ansett som å ha stort potensial (kjent eller ukjent) mht naturverdi (prioritet 1), 67 er ansett som middels potensial (eller kjent verdi), mens 57 er vurdert som ha potensial for moderate naturverdier (prioritet 3). Prioritert etter regionvis representativitet (dvs. der det i tillegg til naturverdi er lagt stor vekt på geografisk spredning over hele fylket), er 58 klassifisert som høy prioritet, 53 som middels prioritert, og 72 som lavest prioritert.

I tillegg til denne rapporten er det til Fylkesmannen også levert Excel-fil med bekkekløftlista. Alle områdene er inntegnet på topografisk kart 1:50 000 og nummerert, og finnes som egne pdf-filer (levert til Fylkesmannen).

Innhold

1	INNLEDNING	6
1.1	BAKGRUNN.....	6
1.2	METODE.....	6
1.3	PRIORITERING AV KLØFTENE	6
2	BEKKEKLØFTENE I BUSKERUD	8
2.1	BUSKERUD SOM "KLØFTEFYLKE"	8
2.2	BEKKEKLØFTER I BUSKERUD - LOKALITETSLISTE	9
	REFERANSER	19

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Som et ledd i oppfølgingen av Stortingsmeldingen om biologisk mangfold (St. meld. Nr. 25 (2002-2003)), og i strategien om bevaring av biologisk mangfold i Norge, er det satt i gang systematiske naturfaglige registreringer av naturtypen bekkekløfter. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom DN og NVE. Formålet er:

- (1) Få en oversikt over naturforhold og biologisk mangfold i bekkekløfter generelt,
- (2) Utrede hvilke bekkekløfter som har så store naturverdier at vern etter naturvernloven bør vurderes,
- (3) Bedre kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med utbygginger av småkraftverk

I 2007 er det gjennomført feltkartlegginger i Sør-Trøndelag, Oppland og deler av Hedmark (utført av BioFokus, Miljøfaglig Utredning og NINA i samarbeid). Prosjektet er planlagt videreført med feltkartlegging i flere fylker i 2008. I forbindelse med ønsket Fylkesmannen i Buskerud å få en oversikt over potensielt naturfaglige verdifulle bekkekløftlokaliteter i fylket.

1.2 Metode

Første "innfallspunkt" i oversikten har vært å gjennomgå topografiske kart for hele fylket. På disse kartene kan en oftest plukke ut områder som topografisk sett vil kunne klassifiseres som bekkekløfter. Deretter er en rekke ulike kilder konferert og gjennomgått. Dette har omfattet ulike typer rapporter og notater (bl.a. verneplanrapporter, konsekvensvurderinger, vassdragsrapporter), naturtypedata (begrenset til det som ligger tilgjengelig på nettet via Naturbase), egen og andre lokalkunnskap om områdene, etc. Flyfoto (tilgjengelig på nettet) har vært en viktig kilde til informasjon, i form av "grovscanning" av områdenes inngrepsstatus. Det er knyttet en del usikkerheter til vurderinger av flyfoto, bl.a. er bildene noen ganger tatt på en tid av dagen da kløftene ligger skyggelagt.

Prosjektets tidsrammer har vært for begrenset til at det på langt nær har vært mulig å gjennomgå alle aktuelle/potensielle kilder, men trolig har en fått med mange av de viktigste.

Tilnærmet alle kløfter som på topografisk kart synes å kunne falle inn under naturtypen, er sjekket nøyere opp (flyfoto, leting etter kilder). I denne prosessen har en rekke områder blitt vurdert som uinteressante, i de fleste tilfeller pga. omfattende påvirkning (hogst).

1.3 Prioritering av kløftene

Det er forsøkt å gjøre en grovskala prioritering av bekkekløftene. Det må sterkt understrekes at for mange av de områdene som ikke har vært kartlagt tidligere, er denne vurderingen beheftet med store usikkerheter. Likevel vil en slik "første-screening" mht potensielle naturverdier for mange områder kunne fungere for å få i det minste en pekepinn.

Prioriteringen er gjort med to innfallsvinkler:

1. Naturverdi

Her er kløftene rangert etter ren naturverdi, uavhengig av representativitet eller geografisk fordeling. De kløftene som antas å ha høy verdi er gitt verdien 1, middels verdi 2, og lavere verdi 3. Verdi"vurderingen" er gjort med tanke på bred bredde, grovt sett fundert i kriteriene som har blitt brukt i kartleggingen av kløftene i Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland i 2007 (dette følger i hovedsak skogvernmetodikken, se Hofton & Blindheim (red.) 2007).

2. Regionalt

Her har kløftene blitt veid opp mot både potensiell naturverdi og geografisk fordeling. Bekkekløftene i fylket er ujevnt fordelt, og et utvalg kun basert på potensiell naturverdi vil lett kunne føre til at tyngepunktet av undersøkelsesområder blir liggende på noen få kommuner. For å få en tilstrekkelig spredning av kløftene utover hele fylket, har derfor fylket blitt inndelt i noen grove "kløfteregioner" (helt grov og overfladisk inndeling, uten basis i tidligere inndelinger). Det har så blitt gjort en prioritering fra 1 (høy prioritet) til 3 (lav prioritet) der det er lagt vekt på at alle regioner (og utforminger/typer av bekkekløfter), skal være rimelig representert.

Utvalg av undersøkelsesområder

Hvordan en til slutt velger å gjøre utvalget av undersøkelsesområder, blir et spørsmål om prioritering. Ønsker en å fange opp alle de mest verdifulle kløftene i fylket, bør en kanskje velge 1. innfallsvinkel. Om man vil legge størst vekt på å få en god spredning og representativitet (for å kunne beskrive hvordan naturtypen bekkekløft ter seg generelt), er kanskje 2 bedre. Kanskje vil en kombinasjon kunne være optimalt.

2 Bekkekløftene i Buskerud

2.1 Buskerud som "kløftefylke"

Etter ønske fra Fylkesmannen gis her en svært kort gjennomgang.

Buskerud er et "kløftefylke", med et stort antall større og mindre, markerte bekkekløfter. Dette skyldes naturgrunnet, med store dalfører som har bratte høye dalsider, der en rekke større og mindre sidebekker har skåret seg ned i berggrunnen. Berggrunnen i fylket er også variert og av en slik karakter, bl.a. med et stort antall svakhetssoner, at disse nedskjæringene i dalsidene gjerne blir til mer eller mindre markerte kløfter.

Kløftene fordeler seg ujevnt innad i fylket. Størst konsentrasjon av markerte bekkekløfter finnes i et bredt belte gjennom midtre-øvre deler av fylket. Regioner som skiller seg ut er Numedal fra nord i Flesberg opp til Tunhovdfjorden (dvs. nordre deler av Flesberg, hele Rollag, nedre deler av Nore og Uvdal), midtfylket (midtre-øvre deler av Sigdal, Krødsherads nordvestre del, Vikersfjell-traktene), sørsiden av Tyrifjorden (Modum (-Lier-Hole), samt nedre og midtre Hallingdal (særlig Flå og Gol, men også deler av Nes). Det er også tett med kløfter i Hemsedal, men dette er i hovedsak fjellnære kløfter med lite barskog. I nedre deler av fylket er bekkekløfter sjeldnere (men kan være spesielle, kystnære/lavtliggende typer med særegne kvaliteter).

Basert på kjent kunnskap og utførte kartlegginger kan en trolig si med en viss grad av sikkerhet at det er Oppland og Buskerud (samt tilgrensende deler av Telemark og midtre Hedmark) som skiller seg ut som de viktigste kløftefylkene – både mht variasjon, utforminger og biologiske verdier knyttet til naturtypen.

2.2 Bekkekløfter i Buskerud - lokalitetsliste

Pri V: prioritering mht potensiell/kjent naturverdi (1 høy, 3 lav). Pri R: Prioritering mht både naturverdi og geografisk spredning

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
1	Nedre Numedal	Kongsberg	Skinnes S	3	3	1 km	80-150	1813 IV	NL 55 93-94	N-vendt lita kløft. Flyfoto: Mye uthogd, men også intakte partier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
2	Nedre Numedal	Kongsberg	Kleppan S	3	3	1 km	80-400	1713 I	NL 54 93-94	N-vendt lita kløft. Flyfoto: Uthogd øverst og nederst, midtparti kan være intakt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
3	Nedre Numedal	Kongsberg	Skolibekken	3	3	1,3 km	100-440	1713 I	NL 52 93-94	N-vendt kløft. Flyfoto: mye ungsog/hogstflater, men trolig også en del intakte partier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
4	Nedre Numedal	Kongsberg	Støleelva ved Vettestadsetra	3	3	2 km	360-520	1714 II	NL 42-43 96-97	To mindre restpartier med eldre skog. Mesteparten av kløfta ellers er uthogd. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
5	Nedre Numedal	Kongsberg	Trangedalen	3	3	1 km	520-600	1713 I	NL 43 93-94	Lita, trang, sørøstvendt kløft. Bård Engelstad pers. medd.: "Egentlig to daler som løper sammen. Storsteinet og noe spesielt. Ikke særlig humid."	Flyfoto
6	Nedre Numedal	Kongsberg	Reineelva	3	3	1,5 km	180-400	1714 II	NL 53 97-98	Mye hogd, men trolig en del intakt i den vestvendte siden. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
7	Nedre Numedal	Kongsberg	Sagdalen	3	2	2 km	120-400	1714 II	NL 52 97-99	Mye hogd (særlig vestsiden), men trolig en del intakt på østsiden. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
8	Nedre Numedal	Kongsberg	Meskestadknatten	3	3	0,7 km	260-400	1714 II	NM 48-49 00	N-vendt brattparti, restparti eldre skog. Resten av kløfta uthogd. Utgjør nordligste del av fase 1- området "Borgedalen". Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Svalastog & Korsmo 1993
9	Nedre Numedal	Kongsberg	Senning-Grønntjern	3	3	0,6 km	455-520	1714 II	NM 50 04	Trang lita kløft mellom to vann. Flyfoto: gammelskog. Bård Engelstad pers. medd.: "En slags canyon mellom Sending-Grønntjern og Ålevannet."	Flyfoto
10	Nedre Numedal	Kongsberg	Ognevannsbekken	3	3	0,7 km	250-400	1714 II	NM 45 08	SV-vendt lita kløft. Flyfoto: ser ut til å stå igjen et restparti eldre skog, resten av kløfta er hogd.	Flyfoto
11	Nedre Numedal	Kongsberg	Hvamsbekken	2	2	1,3 km	180-280	1714 II	NM 43-44 09-10	S-vendt kløft. Flyfoto: noe vanskelig å se, men trolig restparti med eldre skog her. Grenser til Ulebergåsen NR (kalkskog), potensielt kalkrikt nede i juvet også. Gammelgranlav (Bård Engelstad pers. medd.)	Flyfoto
12	Nedre Numedal	Kongsberg	Kjørstadelva	2	1	5 km	170-320	1714 II	NM 39-42 02-05	NØ-vendt, lang, smal kløft. Flyfoto: mye hogd, men også intakte partier. Kalkrikt, bl.a. bergstarr, reinrose, rødflangre, kalktelg. Potensial for særegent artsmangfold, bl.a. moser på kalkberg. Nær Lauarvanna og Bjørnekollen NR.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
13	Nedre Numedal	Kongsberg	Mørkbekken	2	1	0,5 km	150-230	1714 II	NM 40 05-06	Nordvendt lita kløft. Bård Engelstad pers. medd.: "Følg vei fra gården Kjørstad til kryssing av Mørkbekken. Juvet ligger på nedsida av veien her. Dette starter nedenfra som en litt stor ravinedal, men ender opp i ei ganske spektakulær fossegrytte."	Flyfoto, Engelstad 2007
14	Nedre Numedal	Kongsberg	Kobberbergselva ved Moane	3	1	1,1 km	130-180	1714 II	NM 35-36 09	Ø-vendt smal kløft. Funn av rødlistearter (bl.a. kort trolleskjegg). Lok 20 hos Fjeldstad et al. 2001.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen), Fjeldstad et al. 2000
15	Nedre Numedal	Kongsberg	Bramsane	3	2	1,5 km	200-300	1714 III	NM 32-33 10	Ø-vendt smal kløft, E134 på sørsiden. Hogd nær inntil. Tørr sørvendt skrent med rik furuskog (kalkskog). Kalkgranskog på sørsiden. Funn av rødlistearter (fiolgubbe). Lok 40 hos Fjeldstad et al. 2001.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen), Fjeldstad et al. 2000
16	Midtre Numedal	Flesberg	Holtanbekken	3	3	1 km	500-640	1714 IV	NM 23 42-43	NØ-vendt lita kløft "innpå åsen". Flyfoto: ser intakt ut. På kanten til å kunne kalles kløft, men potensielt fuktig granskog med brukbart potensial.	Flyfoto
17	Midtre Numedal	Flesberg	Djupedalsbekken	2	2	0,5 km	300-430	1714 IV	NM 21 34-35	NØ-vendt lita kløft. Restparti gammelskog, hogd over og under. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
18	Midtre Numedal	Flesberg	Vrengja	2	2	1,3 km	240-540	1714 IV	NM 20-21 35	NØ-vendt, trang, litt større kløft. Regulert vassdrag. Flyfoto: ser ut til å være mye intakt, men kanskje noe glissent (furu?). Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
19	Midtre Numedal	Flesberg	Ramneskardbekken	1	1	1 km	380-540	1714 IV	NM 19 37	NØ-vendt lita kløft. Flyfoto: ser intakt ut (hogd nedover). Funn av huldregras og plomme-nype (VU). Lang karplanteliste. Trolig rik skog. Huldrestry og ulvelav funnet like sør for området (Maugerudkletten).	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
20	Midtre Numedal	Flesberg	Gjuva	1	1	3 km	220-540	1714 IV	NM 17-18 3-39	Stor kløft. Regulert. Mye hogd, men også en del intakt, trolig store kvaliteter i gjenværende partier. Mulig bra flommarksskog nederst. Huldrestry.	Naturbase, Avisartikkel DT 1998?, Ut i Naturen fjernsyn 13.11.2007.
21	Midtre Numedal	Rollag	Rostadbekken	2	2	0,8 km	200-400	1714 IV	NM 18 41	NØ-vendt kløft, gammel granskog. Klare naturverdier.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdatabasen), Nøkkelbiotop registrert 2000 (Prevista/kommunen?)

Bekkekløfter i Buskerud – oversikt over potensielt biologisk interessante lokaliteter

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
22	Midtre Numedal	Rollag	Lågen ved Ulvik	1	1	1,1 km	200-300	1714 IV	NM 18 45-46	Trangt parti med gammelskog langs Lågen. Gammel granskog. Fuktig, mye skjeeglav. Bra potensial.	Flyfoto Naturbase, Bendiksen et al. 1991, Bendiksen & Svalastog 1999, Nøkkelbiotop reg 2000 (Prevista/kommunen?), Fylkesmannen i Buskerud 2000
23	Midtre Numedal	Rollag	Sørkjeåe	1	1	3,5 km	260-700	1714 IV	NM 14-16 43-45	Relativt stor kløft. Gammel granskog. Trolig betydelige kvaliteter. Nederst sumpskogsområde reg i VP2 barskog (gitt *).	
24	Midtre Numedal	Rollag	Bratteberg	3	3	0,6 km	360-620	1714 IV	NM 14 48-49	Bratt, lita, NØ-vendt kløft. Gammel granskog, "overgangstype" småkløft/bratt fuktig NØ-vendt granskog.	Flyfoto Artsdatabanken (Artsdatabasen), Nøkkelbiotop trolig reg (Prevista/kommunen?)
25	Midtre Numedal	Rollag	Okseåe	3	3	1 km	350-840	1715 III	NM 13 52	Bratt kløft. Mye hogd (flyfoto), men også partier gammelskog igjen. Funn av skoddelav.	
26	Midtre Numedal	Rollag	Synnsteåi	3	3	0,8 km	280-380	1615 II	NM 08-09 53-54	N-vendt bekkedal/kløft. En del hogd, men kan være verdifulle gjenværende partier.	Flyfoto
27	Midtre Numedal	Rollag	Hølaåe	3	3	1,3 km	520-620	1615 II	NM 08 51-53	N-vendt bekkedal. Kan være verdifull.	Flyfoto
28	Midtre Numedal	Rollag	Medåe	2	2	3 km	240-540	1615 II	NM 07-08 53-55	N-vendt kløft. Trolig mye hogd, men kan også være verdifulle gjenværende partier. Muligens potensial for fossesamfunn.	Flyfoto
29	Midtre Numedal	Rollag	Sundtjønnåe	2	3	2 km	580-730	1615 II	NM 05-07 52	Ø-vendt fjellskogskløft/bekkedal. Gammel granskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
30	Midtre Numedal	Rollag	Juvsjordeseter (Skjervebrekka)	3	3	1,5 km	550-700	1615 II	NM 06-07 51-52	Ø-vendt kløft. Noe hogd, men også noe intakt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
31	Midtre Numedal	Rollag	Nørdesteåe	1	1	4,5 km	360-680	1615 II	NM 04-07 53-54	Ø-vendt stor kløft. Bratt, svingete, dramatisk topografi. Trolig ganske mye gjenværende gammelskog. Potensielt store verdier.	Flyfoto Flyfoto, Nøkkelbiotop reg 2000 (Prevista/kommunen?)
32	Midtre Numedal	Rollag	Kjømmeåe	2	2	1 km	340-550	1714 IV	NM 18-19 48	V-vendt lita kløft. Restbiotop gammel granskog. Huldrestry.	
33	Midtre Numedal	Rollag	Elddalen-Saupsettjønn	2	3	3,5 km	420-700	1714 IV, 1715 III	NM 21-23 49-51	NØ-vendte småkløfter. Fuktig gammel granskog. Naturskog.	Artsdatabanken (Artsdatabasen), Nøkkelbiotop registrert 2000? (Prevista/kommunen?)
34	Midtre Numedal	Rollag	Rollagelva/Søråi	1	1	2,5 km	280-620	1715 III	NM 16-17 54-55	Ganske godt registrert (men suppleringer hadde vært nyttig). Store verdier. Mange rødlistearter. Inngår i verneprosess Trillemarka-Rollagsfjell.	Hofton 2003a, Bendiksen 2004, Naturbase, Artsdatabanken (Artsdatabasen)
35	Midtre Numedal	Rollag	Nordåe	3	3	1,5 km	260-550	1715 III	NM 15-17 54-55	SV-vendt bekkekløft. Endel ungsog, men også intakte partier.	Nøkkelbiotop reg (OVF-skog Buskerud, rapport finnes)
36	Midtre Numedal	Rollag	Tundra-Langvassåe	1	1	3 km	250-590	1615 II, 1715 III	NM 11-13 57-58	Godt undersøkt. Meget store verdier, svært mange rødlistearter (ca 50). Inngår i verneprosess Trillemarka-Rollagsfjell.	Bendiksen 2004, Hofton 2004a, Hofton 2006, Naturbase, Artsdatabanken (Artsdatabasen)
37	Midtre Numedal	Rollag	Langvassåe	3	3	1 km	360-440	1615 II	NM 11 58-59	Fortsettelse av lokaliteten Tundra-Langvassåe oppover. Trolig en del/mye hogd, men bør undersøkes. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto Flyfoto, Svalastog & Korsmo 1993, Nøkkelbiotop reg 2000 (prevista) ?
38	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Teigsåi	2	3	1 km	280-650	1615 II	NM 01-02 62-63	Bratt Ø-vendt kløft. Gammel granskog. Kvaliteter ukjent. Bra potensial.	Artsdatabanken (Artsdatabasen)
39	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Bjørndalen	2	2	1,5 km	280-920	1615 II	NM 00-01 64	Bratt Ø-vendt kløft dal-fjell. Kvaliteter ukjent. Stort potensial.	
40	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Hellekleivåi	1	1	2 km	280-1000	1615 II	NM 00-01 65	Bratt Ø-vendt kløft dal-fjell. Delvis påvirket, men også en del intakt (flyfoto). Kvaliteter ukjent. Stort potensial.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdatabasen)

Kort oversikt over potensielt biologisk interessante bekkekjøfter i Buskerud

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
41	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Sagbekken	1	2	1,5 km	280-1000	1615 II	NM 00 65-66	Bratt NØ-vendt kløft dal-fjell. Mye intakt, men også noe hogd (flyfoto). Kvaliteter ukjent. Stort potensial.	sen) Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdataba- sen)
42	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Eidsåi-Gjuvsgrendi	1	1	9 km	300-1000	1615 II	MM 95-99 66-68 NM 00 67	Stort kløftekompleks fra lavland til fjell. Av de største kløfteområdene i fylket. Det meste er gammelskog. Øvre deler fjellskogspreget, og hardt gjennomhogd tidligere. Nedre deler størst kvaliteter, bl.a. mye mjuktjafs, dårligere i øvre deler.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdataba- sen), Nøkkeliotoper reg 2000 (Prevista?), Oldervik & Hofton 2007 (in prep), Svalastog & Korsmo 1993.
43	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Sørlandsåi	2	3	2 km	560-700	1615 II	NM 08-09 67-68	Gammel fuktig granskog. Funn av praktlav, mjuktjafs.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdataba- sen), Fylkesmannen i Buskerud 1999a, Nøkkeliotoper reg 2000 (Prevista?).
44	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Gåsetjørnbekken	1	1	3 km	440-600	1615 II	NM 07 66-68	Gammel granskog. Mye gammelskog, men trolig noe fragmentert. I SV gammel, rik granskog med hekkende hønschauk (funnet 2000). En del rødlistearter (lav, sopp).	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdataba- sen), Fylkesmannen i Buskerud 1999a, Nøkkeliotoper reg 2000 (Prevista/Viken/kommunen).
45	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Okseløkbekken	2	3	1,5 km	480-580	1615 II	NM 06-07 67-68	Gammel granskog, bergvegger. Flere rødlistearter (bl.a. trådrag).	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdataba- sen), Fylkesmannen i Buskerud 1999a, Nøkkeliotop reg 2000 (Prevista/Viken/kommunen).
46	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Juva ved Guterud	1	2	3,5 km	280-740	1615 II	NM 01 72-73	Vest- og nordvendte bratte småkløfter. Rikt. Gammel granskog. Huldresty.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdataba- sen), Nøkkeliotoper reg 2000 (Prevista?).
47	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Økta	1	1	4,5 km	280-640	1615 II	NM 01-03 74-78	Lang SV-vendt kløft. Mye rik skog. Mye intakt, men også noe hogd. Trolig verdifull. Vassdraget regulert.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsdataba- sen)
48	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Borgåi	1	1	2 km	300-620	1615 I	NM 00 80-82	S-vendt kløft. Mye rik skog, det meste trolig intakt. Trolig verdifull. Mange sjeldne lav påvist. Vassdraget regulert.	Artsdatabanken (Artsdataba- sen)
49	Midtre Numedal	Nore og Uvdal	Lågen ved Øy- gardsgrend	1	1	9 km	300-720	1615 I	MM 96-98 80-86	Fylkets største og mest dramatiske elvejuv. Vassdraget regulert, trolig vært mye fosse- røyskog før regulering. Mye gammelskog intakt, men også noe hogd. Trolig store kvalite- ter.	Artsdatabanken (Artsdataba- sen)
50	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Stordalen SV for Rødberg	3	3	1 km	400-700	1615 I	MM 96 79-80	Nordvendt, lita, bratt kløft. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
51	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Osli	1	1	4 km	480-900	1615 I, II	MM 94-96 78-79	Nordvendt bratt li med flere markerte kløfter. Flyfoto: ser i all hovedsak intakt ut. Stort potensial, kan være verdifullt område.	Flyfoto
52	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Svartevassåi	3	3	1,3 km	600-820	1615 II	MM 93 77-79	Nordvendt trang kløft. Nederst uthogd, også hogd mye på sidene, men selve juvet ser intakt ut.	Flyfoto
53	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Deveggåi	3	3	2,5 km	530-880	1615 III	MM 90 76-79	Nordvendt kløft/bekkedal, nokså slak. Flyfoto: ser ut til å være gammelskog, men trolig noe glissent. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto

Bekkekløfter i Buskerud – oversikt over potensielt biologisk interessante lokaliteter

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
54	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Haugåsbekken	3	3	1,5 km	580-840	1615 III	MM 89-90 77-78	Nordøstvendt kløft/bekkedal, nokså slak. Flyfoto: ser ut til å være gammelskog, men trolig noe glissent. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
55	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Tverråi	1	1	2,5 km	500-900	1615 III, IV	MM 85-86 78-80	Nordvendt kløft/bekkedal, nokså slak. Mye gammelskog, partivis gammel naturskog med mye læger og høy kontinuitet. Rikt på vedboende sopp, inkludert høyt rødlistede arter.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
56	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Gjuvsbekken	2	2	2,5 km	780-920	1615 III, IV	MM 83-85 78-79	Nordøstvendt fjellskogskløft. Trang, mye berg (flyfoto). Gammelskog. Flere rødlistearter vedboende sopp.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
57	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Lødingardsåi	1	2	2,5 km	520-940	1615 III, IV	MM 81-82 78-80	Nordvendt bekkekløft. Gammelskog, gran, barblanding. Flere rødlistearter vedboende sopp (bl.a. mye sprekkjuke). Spenner helt fra dalbunnen.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
58	Øvre Numedal	Nore og Uvdal	Ølmøsa	2	1	3,5 km	560-1050	1615 III, IV	MM 77-79 77-80	Nordøstvendt, bratt, dramatisk, ganske stor kløft. Regulert vassdrag. Karplantelister finnes. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
59	Drammensom-rådet	Hurum	Sætreelva	3	1	2 km	10-150	1814 II	NM 85 15-16	Nordvendt lita kløft. Frodig skog. Registeringer av flere rødlistede karplanter og insekter.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Fylkesmannen i Buskerud 1999b
60	Drammensom-rådet	Røyken	Åroselva ved Dalebråten	2	2	2 km	10-100	1814 II	NM 81-83 20-21	NØ-vendt liside langs Åroselva. Flere naturtyper reg. Rik løvskog, dels edelløvskog, flommarksskog etc. Deler vurdert i verneplan for edelløvskog.	Flyfoto, Naturbase, Hanssen 2004, Artsdatabanken (Artsbasen), Fylkesmannen i Buskerud 1999b, NN 1973.
61	Drammensom-rådet	Røyken	Åroselva ved Ølstad	3	3	1 km	60-90	1814 II	NM 81 22-23	Ø-vendt liside langs Åroselva. Trolig frodig løvskog, men kan være påvirket. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
62	Drammensom-rådet	Røyken	Åroselva Skryset-Heggedal	1	1	3 km	60-140	1814 I	NM 80-81 25-27	Langt parti langs Åroselva. Mye frodig løvskog (edelløvskog, gråor-heggeskog). Potensielt kalkskog i brattskråningene? Delvis påvirket og fragmentert, delvis mer intakt med verdifulle partier. Går over i Asker kommune.	Flyfoto, Svalastog & Korsmo 1993, Fylkesmannen i Buskerud 1982, Hanssen 2004, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
63	Drammensom-rådet	Lier	Eikdambekken	2	2	4 km	80-380	1814 IV	NM 65-66 28-29	Sørøstvendt markert bekkekløft. Nederst ravine med løvskog. Flyfoto: ser ut til å være mye intakt (gammelskog). Karplantelister finnes. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
64	Drammensom-rådet	Lier	Glitra	2	1	3,5 km	100-300	1814 IV	NM 64-67	Østvendt ganske stor markert kløft. En del hogd, men også en del intakte partier. Potensielt bra kvaliteter i gjenværende gammelskog. Karplantelister.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
65	Drammensom-rådet	Lier	Laukedalen	2	2	3 km	340-560	1814 IV	NM 64-65 37-39	Sørøstvendt markert bekkekløft. Mesteparten er gammelskog. Innslag av rødlistearter. Brukbare kvaliteter.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Hofton 2003b
66	Drammensom-rådet	Lier	Nykjua	2	2	1,3 km	400-520	1814 IV	NM 62-63 42-43	Sørøstvendt kløft med bratte sider. Gammel, fuktig granskog. Brukbart potensial.	Flyfoto, Hofton 2004b
67	Drammensom-rådet	Lier	Veslevannsbekken	3	3	1,4 km	180-340	1814 IV	NM 69 40-41	Sørvendt kløft, trang. Flyfoto: gammelskog. Potensielt kalkrikt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
68	Tyrifjorden	Lier	Holmenelva	3	3	1,4 km	120-340	1814 IV	NM 71-72 44-45	Østvendt markert kløft mot Holsfjorden. Flyfoto: Eldre skog, men trolig en del kulturskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
69	Tyrifjorden	Lier	Sagelva	2	2	2,5 km	120-400	1814 IV	NM 69-71 46	Østvendt ganske stor kløft. Mye hogd, men også en del intakt. Huldregras øverst (der det nå er hogstflate).	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Whist 1997
70	Drammensom-rådet	Lier	Helgerudbekken - Renskaug	3	3	4 km	20-100	1814 IV	NM 67-69 28-30	Ravinedaler ned mot Lierelva. Rik løvskog. Dammer med liten salamander. Karplantelister. Kvaliteter dårlig kjent.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)

Kort oversikt over potensielt biologisk interessante bekkeløfter i Buskerud

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
71	Drammensom-rådet	Lier	Lierelva ved Snarum	3	3	2 km	20-60	1814 IV	NM 68-69 30-31	Ravinepartier langs Lierelva. Rik løvskog. Karplantelister. Kvaliteter dårlig kjent.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
72	Drammensom-rådet	Lier	Nordelva - Gåsebekken	1	1	10 km	30-120	1814 IV	NM 69-72 35-39	Stort ravinesystem med rik løvskog, flommarksskog, flekkvis gammel granskog med mye dødved (ved Korsrud), hagemarksskog. Nyere grusuttak sør for Holtsmark (sett på flyfoto). Trolig største gjenværende ravinesystem i Buskerud. Kvaliteter dårlig kjent, men deler av området utvilsomt svært viktig.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Bredeesen 2001
73	Drammensom-rådet	Lier	Tronstad	2	2	4 km	60-180	1814 IV	NM 69-71 39-40	Ravinesystem med rik løvskog. Inkluderer Tronstad naturreservat. Trolig noe hogd. Karplantelister. Kvaliteter dårlig kjent.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Fylkesmannen i Buskerud 1982
74	Drammensom-rådet	Lier	Syiling kirke - Altanåsen	2	3	2 km	65-160	1814 IV	NM 70-72 41	Ravinesystem med rik løvskog. Trolig noe hogd. Karplantelister. Kvaliteter dårlig kjent. Grenser til Altanåsen med velutviklet kalkskog.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
75	Drammensom-rådet	Drammen	Kolfuru	3	3	0,9 km	30-260	1814 III	NM 73 17	Nordvendt lita kløft ned mot Drammensfjorden. Flyfoto: ser intakt ut. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
76	Drammensom-rådet	Drammen	Kolbergdalen	2	2	1,3 km	120-380	1814 IV	NM 63 25-26	Sørvendt kløft. Flyfoto: Delvis intakt. Potensielt kalkrikt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
77	Drammensom-rådet	Drammen	Kjosterudgjuvet	1	1	1,6 km	30-350	1814 IV	NM 62 25-26	Sørvendt trangt gjel. Rikt. Huldregras, junkerbregne.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
78	Drammensom-rådet	Nedre Eiker	Grytjerna	2	3	1 km	190-290	1814 III	NM 56 20-21	Nordvendt lita kløft. Flyfoto: ser ut til å være gammelskog. Potensielt kalkrikt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
79	Drammensom-rådet	Nedre Eiker	Veia	1	1	3 km	40-340	1815 III	NM 54-55 20-22	Nordvendt kløft, omgitt av småkupert og litt kløftete skoglandskap. Delvis markert kløftepreg. Mye kalkskog, et stort antall kalkskog-rødlisterarter påvist.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
80	Drammensom-rådet	Nedre Eiker	Knabben NØ	2	2	0,6 km	160-340	1814 IV	NM 59-60 26	Østvendt lita kløft, bratt. Flyfoto: gammelskog. Potensielt kalkrikt. Nær Solbergfjellet NR. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
81	Drammensom-rådet	Nedre Eiker	Solbergvarden V	1	2	1,5 km	257-580	1814 IV	NM 58 26-27	Sørvendt, bratt, markert kløft. Gammel skog. Potensielt kalkrikt. På sørsiden av tjernet velutviklet, artsrik kalkskog.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
82	Drammensom-rådet	Nedre Eiker	Bjørkedokk	3	3	0,9 km	20-180	1814 IV	NM 57 25	Sørvendt, bratt, lita kløft. Tørt, kalkrikt. Grenser til kalkfuruskog med bl.a. rød skogfrue.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
83	Drammensom-rådet	Nedre Eiker	Øvre Krokstadbekken	3	3	0,8 km	20-120	1814 IV	NM 55 25	Sørvendt lita kløft inneklemt i bebyggelse. Gammel løvskog, artsrik.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
84	Drammensom-rådet	Øvre Eiker/Hof	Tryterudelva	2	1	1,8 km	80-260	1814 III	NM 55-56 12-14	Sørvendt markert kløft. Flyfoto: En del intakt. Potensielt kalkrikt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
85	Drammensom-rådet	Øvre Eiker	Vesleelva ved Hakavik	2	3	1 km	80-220	1714 II	NM 51-52 10	Østvendt ganske markert lita kløft. Flyfoto: ser i hovedsak intakt ut. Potensielt kalkrikt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
86	Drammensom-rådet	Øvre Eiker	Storelva ved Hakavik	2	1	2 km	40-350	1714 II	NM 52 09-10	Nord- til østvendt ganske markert kløft. Flyfoto: noe hogd, men også en del intakt. Potensielt kalkrikt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
87	Midtfylket	Øvre Eiker	Tverrelva	3	3	1 km	480-660	1714 I	NM 40-41 34-35	Nordvestvendt lita kløft. Flyfoto: i hovedsak intakt, gammelskog. Funn av enkelte signalarter.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen), Svalastog & Korsmo 1993, Muligens nøkkelbiotopkartlagt (Viken) ?
88	Midtfylket	Øvre Eiker	Kjerringbekken	3	3	1,5 km	200-560	1714 I	NM 44-45 34-35	Nordøstvendt lita kløft. Flyfoto: noe hogd, men mye intakt. Funn av enkelte signalarter (bl.a. huldregras).	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
89	Midtfylket	Modum	Kista	3	3	2,4 km	30-120	1714 I	NM 52 46-48	Trangt parti langs Drammenselva, potensielt spesielt pga. stor lavlandselv. Flyfoto: Trolig delvis intakt. Gamle funn av karplanter og lav (bl.a. stavklokke, kort trollskegg). Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
90	Midtfylket	Mo-	Ramfoss	1	1	5 km	110-200	1715 II	NM 44-46 58-63	Bratte skråninger langs Snarumselva. To delområder, nord og sør for eksisterende reser-	Flyfoto,

Bekkekløfter i Buskerud – oversikt over potensielt biologisk interessante lokaliteter

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
		dum/Krødsherad								vat. Flyfoto: en del hogd, men også mye gammelskog. Spesielle forhold: bratte gammel-skogsskråninger langs stor elv, tjukke løsmasser. Potensielt store verdier også utenfor reservatet.	Artsdatabanken (Artsbasen), Lindblad 1996, Bendiksen & Svalastog 1999
91	Tyriifjorden	Modum	Sønstebydalen	2	3	1 km	160-300	1814 IV	NM 55-56 41-42	Nordvestvendt, markert men lita kløft. Flyfoto: En del hogd, men også en del intakt. Potensielt kalkrikt. Kort karplanteliste. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
92	Tyriifjorden	Modum	Melåa	1	2	1,6 km	80-400	1815 III	NM 61 51-53	Nordvendt, trang, markert kløft. Flyfoto: En del hogd, men også en del intakt. Trolig kalkrikt. Foss nederst (?).	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
93	Tyriifjorden	Modum	Askerudbekken	1	1	1,1 km	130-360	1815 III	NM 62-63 52-53	Nordvendt, markert kløft. Flyfoto: intakt. Kalkrikt. Rik sopp- og karplanteflora. Trolig store verdier.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
94	Tyriifjorden	Modum	Dyrbakkbekken	3	3	2 km	80-450	1815 III	NM 64-65 51-53	Nordøstvendte, markerte kløfter. Flyfoto: en del hogd, men også intakte partier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
95	Tyriifjorden	Modum	Kimmerudbekken	1	1	1,2 km	70-330	1814 IV	NM 66-67 50	Nordøstvendt, markert kløft. Flyfoto: i all hovedsak intakt. Trolig kalkrikt. Potensielt store verdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
96	Tyriifjorden	Modum	Pilterudelva	1	2	2 km	70-340	1814 IV	NM 66-68 49-50	Nordøstvendt, trang, markert kløft. Flyfoto: Noe hogd, men også en del intakt. Kalkrikt. Karplanteliste. Potensielt store verdier.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
97	Tyriifjorden	Modum	Svarverudelva	1	1	2 km	140-460	1814 IV	NM 68-70 48-49	Nordøstvendt, trang, markert kløft. Flyfoto: hogd i midtre del, ellers mye intakt. Rik flora (karplanteliste). Trolig kalkrikt. Potensielt store verdier. Grenser til kalkskog med mange rødlistede jordboende sopp mot øst.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
98	Tyriifjorden	Hole	Sønsterudelva	1	1	1,5 km	65-400	1814 IV	NM 72 50-51	Lita, bratt SV-vendt kløft. Gammel skog, mye dødved, rikt, edelløvtrær. Mange sjeldne og truede arter. Utgjør del av et stort, svært verdifullt område i skrentene langs Holsfjorden og nordover forbi Hvalpåsen.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Svalastog & Korsmo 1993, Lindblad 1996, Hofton & Solvang 2007
99	Tyriifjorden	Hole	Neseterdalen	1	1	1,1 km	180-460	1814 IV	NM 71 52-53	Bratt S-vendt kløft. Gammel skog, mye dødved, rikt, mye edelløvtrær. Mange sjeldne og truede arter. Utgjør del av et stort, svært verdifullt område i skrentene langs Holsfjorden og nordover forbi Hvalpåsen.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Svalastog & Korsmo 1993, Lindblad 1996, Hofton & Solvang 2007
100	Tyriifjorden	Ringerike	Aurdalsbekken (Åsbygda)	2	3	2 km	230-520	1815 II	NM 75-76 73	Trang og bratt V-vendt kløft. Flyfoto: ser ut til å være relativt intakt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
101	Tyriifjorden	Ringerike	Damåsbekken	3	3	1 km	350-540	1815 II	NM 75-76 72	Trang, bratt V-vendt kløft. Flyfoto: ser ut til å være hovedsakelig intakt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
102	Tyriifjorden	Ringerike	Veksal	2	2	0,5 km	80-135	1815 III	NM 66 71	Ravine med gammelskog. Relativt gammel skog. Sjelden med gammel ravinegranskog.	Flyfoto, Lindblad 1996
103	Midtfylket	Ringerike	Gjuvbekken	2	2	2,5 km	440-700	1815 IV	NM 55-56 87-89	Sørvendt markert kløft. Flyfoto: ser i hovedsak intakt ut. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
104	Midtfylket	Ringerike	Tjuvenborgbekken	1	1	4 km	500-780	1815 IV	NM 53-54 88-91	Sørvendt markert kløft. Flyfoto: i all hovedsak gammelskog. Bra potensial. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
105	Midtfylket	Ringerike	Leintjerna	3	3	1,5 km	560-700	1715 I	NM 52-53 89-90	Sørvendt kløft. Flyfoto: i hovedsak gammelskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
106	Midtfylket	Ringerike	Rokoa	2	2	2 km	200-600	1815 IV	NM 56-58 91-92	Nordøstvendt bratt kløft. Flyfoto: en del gammelskog, men også noe hogd. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
107	Midtfylket	Ringerike	Gryteelva	3	3	3 km	360-800	1815 IV	NM 55-56 95-96	Nord- til østvendt kløft. Flyfoto: mest gammelskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
108	Midtfylket	Ringerike	Storgjuvbekken - Sandvasselva	1	1	8 km	380-670	1715 I	NM 45-47 96-99	Markerte kløfter og juv, store arealer, mesteparten gammelskog. Betydelige kvaliteter, en del rødlistearter. Mye mjuktjafs.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Svalastog & Korsmo 1993, Lindblad 1996
109	Midtfylket	Ringerike/Sør-Aurdal	Vidøla	2	2	2 km	320-480	1716 II	NN 44 09-10	Nordvendt markert bekkekløft. Flyfoto: en del gammelskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
110	Midtfylket	Ringerike/Sør-Aurdal	Fesja	3	3	1,3 km	350-500	1716 II	NN 44 13	Sørvendt meget trang bekkekløft. Flyfoto: ser ut til å være delvis intakt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
111	Midtfylket	Ringerike/Sør-Aurdal	Gildra	2	3	2 km	280-480	1716 II	NN 46 14-15	Sørvendt markert bekkekløft. Flyfoto: ser ut til å være stort sett intakt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
112	Midtfylket	Ringerike	Fetjarheimen	2	3	1,5 km	300-540	1716 II	NN 48-49 10-12	Nordvendt markert bekkekløft. Flyfoto: ser intakt ut. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto

Kort oversikt over potensielt biologisk interessante bekkekløfter i Buskerud

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
113	Midtfylket	Ringerike	Knappbekken	2	2	2 km	220-480	1716 II	NN 50 11-12	Nordvendt, smal men trolig nokså markert kløft. Nederst en stor foss. Flyfoto: ser intakt ut langs elvestrengen. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
114	Midtfylket	Sigdal	Horga	3	3	0,7 km	250-300	1715 III	NM 31 53	Lite parti markert kløft, mye bergvegger, eldre skog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
115	Midtfylket	Sigdal	Svartebergbekken	2	2	1,1 km	140-420	1715 III	NM 29 57	Nordvendt, lita, bratt kløft. Gammelskog, noen rødlistearter.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
116	Midtfylket	Sigdal	Ramstadhelvete	1	1	0,6 km	130-200	1715 II	NM 34 58	Trang og markert kløft i lavlandet. Rikt. Gammel granskog, mye læger, fossefall + barblandskog på finkornete sedimenter. Betydelige kvaliteter. Mange rødlistearter. Naturbase-beskrivelse relativt misvisende.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
117	Midtfylket	Sigdal	Sluffa	2	3	1 km	450-500	1715 III	NM 33 61-62	Trang sprekkeløft med gammel granskog. En del mjuktjafs.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
118	Midtfylket	Sigdal	Skjærsbekken	1	1	1,5 km	280-500	1715 III	NM 24 60-61	Nordvendt, trang og markert kløft. Gammel granskog, rikt. Småfosser, fuktig. Hogd deler av lia 2004, men fortsatt store verdier, selve kløfta intakt. Verneprosess pågår Trillemarka-Rollagsfjell.	Hofton 2003a, Bendiksen 2004, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
119	Midtfylket	Sigdal	Ulbergselva	3	3	1,7 km	150-360	1715 III	NM 23-24 62-63	Sørøstvendt lita kløft. Mest gammelskog, men også noe hogd. Moderat potensial.	Flyfoto
120	Midtfylket	Sigdal	Nedalselva	1	1	5 km	150-500	1715 III	NM 19-23	Stor, markert bekkekløft. Varierende påvirket; en del hogd, men også mye intakt. Delvis meget store verdier, med svært mange rødlistearter.	Flyfoto, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Holtan (red.) 2006
121	Midtfylket	Sigdal	Nedalselva ved Kvernhusvatnet	2	2	0,5 km	520-640	1715 III	NM 16-17 63	Markert bekkekløftparti, med en større foss. Fuktig, nokså gammel granskog. Flere rødlistearter.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
122	Midtfylket	Sigdal	Sinerbekken-Dukelibekken	2	2	2,3 km	380-700	1715 III	NM 18-20 68-69	Markert østvendt bekkekløft. En del hogd, men gjenværende partier fuktig gammel granskog. Mjuktjafs, huldrestry. To naturtypelok. Øvre del inngår i verneprosess Trillemarka-Rollagsfjell.	Hofton 2003a, Bendiksen & Svalastog 1999, Bendiksen 2004, Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Engen 1999
123	Midtfylket	Sigdal	Grønhovdselva	1	2	1 km	200-380	1715 III	NM 21-22 40	Markert østvendt bekkekløft. Gammel granskog, fuktig, større fossefall. Edelløvskog. En del rødlistearter. Delvis utbygd småkraftverk. 2 naturtypelokaliteter.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Engen 1999
124	Midtfylket	Sigdal	Skårsbekken	3	3	1,5 km	460-700	1715 III	NM 18-19 73-74	Markert, lita, bratt østvendt kløft. Eldre fuktig granskog. Inngår i verneprosess Trillemarka-Rollagsfjell.	Hofton 2004c, Bendiksen 2004, Artsdatabanken (Artsbasen)
125	Midtfylket	Sigdal	Åsan	1	1	1,3 km	300-600	1715 III	NM 18-19 75	Østvendte småkløfter. Rik, gammel blandingsskog. Meget store naturverdier, mange rødlistearter. Inngår i verneprosess Trillemarka-Rollagsfjell.	Hofton 2003, Bendiksen 2004, Artsdatabanken (Artsbasen)
126	Midtfylket	Sigdal	Sølandsbekken	2	2	2 km	280-600	1715 III	NM 17-18 76-77	Østvendt markert kløft, med bratte N-vendte småkløfter. Fuktig granskog. Potensielt bra verdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
127	Midtfylket	Sigdal	Djupendal	1	1	1 km	220-270	1715 III	NM 20 76	Gjel langs Eggedøla. Gammel granskog, mye bergvegger, spesielle forhold (lysåpent + høy fuktighet). Potensielt rik lavflora.	Naturbase, Bredland 2000
128	Midtfylket	Sigdal	Sagbekken	2	2	1 km	280-520	1715 III	NM 22 75	Vestvendt markert kløft. Rik, gammel gran- og blandingsskog. Noen rødlistearter.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Bredland 2000
129	Midtfylket	Sigdal	Sløgja	1	1	3 km	300-700	1715 III, IV	NM 20-22 78-80	Sørvestvendt, stor, dramatisk kløft. Det meste er gammelskog, rikt, fuktig, fossefall, mange rødlistearter. Store naturverdier. Mindre partier er hogd.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
130	Midtfylket	Sigdal	Åselva	3	3	2,5 km	500-900	1715 IV	NM 19 80-82	Sørvendt markert kløft. Åsfossen stort fossefall. Mye hogd i midtpartiet, men også en del intakt gammelskog. Øverst en større foss.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
131	Midtfylket	Sigdal	Nastabekken	1	2	1,5 km	400-620	1715 III	NM 15-16 76-78	Markert nordvendt kløft. Gammel fuktig granskog. Huldrestry, trådragg. I all hovedsak intakt.	Naturbase
132	Midtfylket	Sigdal	Brennebekken	1	1	1,8 km	400-760	1715 III, IV	NM 13-15 78-79	Markert østvendt kløft. Gammel fuktig granskog. En del rødlistearter. Rikelig trådragg. I hovedsak intakt. Betydelige naturverdier.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
133	Midtfylket	Sigdal	Urdejtjennbekken	2	2	2,5 km	500-900	1715 IV	NM 12-14 80-81	Markert østvendt kløft. Meget fuktig, gammel granskog, flere fossefall. Noen rødlistearter.	Naturbase,

Bekkekløfter i Buskerud – oversikt over potensielt biologisk interessante lokaliteter

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
										Intakt.	Artsdatabanken (Artsbasen)
134	Midtfylket	Sigdal	Kleivselva	1	1	4 km	440-940	1715 IV	NM 15-16 80-83	Markert, trang, sørvendt, ganske stor kløft. Fuktig, gammel granskog. Intakt. Kvaliteter dårlig kjent.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
135	Midtfylket	Sigdal	Skodøla	3	3	1,3 km	680-870	1715 IV	NM 14 83-84	Markert, lita, sørvendt kløft. Eldre granskog, foss.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen)
136	Midtfylket	Krødsherad	Kvernbecken	3	2	1,5 km	180-420	1715 II	NM 36 70-71	Markert, sørvendt lita kløft. Flyfoto: Delvis intakt, men også noe hogd. Kan være bra potensial. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
137	Midtfylket	Krødsherad	Djupedalsbekken (Fjellhvil)	2	2	1,3 km	260-800	1715 III	NM 31-32 76	Trang, bratt østvendt kløft. Gammel fuktig granskog. Bra potensial. Huldresty, huldregras.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Lund 1982, Solvang 2005
138	Midtfylket	Krødsherad	Storebølningen	2	1	1,3 km	260-800	1715 III	NM 31-32 77	Trang, bratt østvendt kløft. Gammel fuktig granskog. Bra potensial. Kvaliteter ukjent.	
139	Midtfylket	Krødsherad	Ringneselva	2	2	6 km	200-600	1715 I, IV	NM 30 33 80-84	Stor, lang, markert kløft, av fylkets største. Store deler er uthogd, men mindre partier gjenværende gammelskog kan ha betydelige naturverdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
140	Midtfylket	Krødsherad	Laksejuv	2	2	3 km	600-1100	1715 IV	NM 27-30 83-84	Stor østvendt, fjellnær kløft. Gammel gran- og fjellbjørkeskog. I hovedsak intakt, bortsett fra nederst. En del naturverdier, men lite undersøkt.	Naturbase, Artsdatabanken (Artsbasen), Solvang 2005
141	Nedre Hallingdal	Flå	Buøynevi	2	3	1,3 km	150-500	1715 I, IV	NM 32-33 90-91	NØ-vendt, trang, markert kløft. Flyfoto: En del hogd, men også en del intakt. Karplantelister finnes. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
142	Nedre Hallingdal	Flå	Gulsvikelvi	1	1	10 km	170-900	1715 IV	NM 26-32 87-93	NØ-vendt, meget stor og markert kløft. Flyfoto: Ganske mye hogd, men også en god del intakte partier. Potensielt store naturverdier. Huldresty 1975. Karplantelister. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen) Hofton 1999, Artsdatabanken (Artsbasen)
143	Nedre Hallingdal	Flå	Sjølingelvi	1	1	2 km	220-580	1715 IV	NM 27-29 92-94	Nordøstvendt, trang, markert kløft. Gammel, fuktig granskog. Viktige naturverdier.	
144	Nedre Hallingdal	Flå	Vesleåi (Steinmoen)	1	2	2,5 km	180-520	1715 IV	NM 22 96-98	Nordvendt, markert kløft. Flere fossefall. Gammel, fuktig granskog. Klare naturverdier, en del rødlistearter. Småkraftverkplaner (godkjent?).	Småkraftverkrapport finnes (?)
145	Nedre Hallingdal	Flå	Gyltebekken	1	2	1,6 km	190-550	1715 IV	NM 20-21 96-98	Nordvendt, bratt, markert kløft. Flyfoto: i hovedsak intakt. Potensielt store naturverdier. Kanskje fossefall. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
146	Nedre Hallingdal	Flå	Grøslandselvi	1	2	5 km	240-780	1715 IV	NM 16-20 95-97	NØ-vendt, stor, markert kløft. Flyfoto: Mye hogd, men også en del intakt. Potensielt store naturverdier. Karplantelister finnes. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
147	Nedre Hallingdal	Flå	Jeppebekken	1	1	2,5 km	180-800	1715 IV	NM 15-17 98-99	NØ-vendt, bratt kløft, med bratte lisider rundt. Flyfoto: Helt intakt. Potensielt store naturverdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
148	Nedre Hallingdal	Flå	Solheimselvi	2	1	3,5 km	200-580	1715 I	NM 33-34 95-97	S-vendt, bratt, markert kløft. Flyfoto: mesteparten intakt, men mye hogd kloss inntil. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
149	Nedre Hallingdal	Flå	Haramobekken	3	3	1,4 km	180-540	1715 IV	NM 29-30 96-97	S-vendt, bratt, ganske grunn, lita kløft. Flyfoto: ser i hovedsak intakt ut. Antakelig noe "tørr", men kan være rikt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
150	Nedre Hallingdal	Flå	Vesleåi (Padderud)	2	3	2 km	160-600	1715 IV	NN 25-26 00-02	SV-vendt, bratt, markert, lita kløft. Flyfoto: ser i hovedsak intakt ut. Kan være verdifull. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
151	Nedre Hallingdal	Nes	Sevreåi	1	2	4,5 km	170-680	1615 I, 1715 IV	NN 11-12 00-03	N-vendt, stor, markert kløft. Mye intakt, men mye også hogd på østsiden i midtre-øvre del. Øverst fosserøyskone. Bra arts mangfold, sjeldne lavarter. Viktige naturverdier.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
152	Nedre Hallingdal	Nes	Avdagsholbekken	3	3	1,2 km	500-800	1615 I	NN 09-10 03	Ø-vendt, markert kløft. Flyfoto: ser i hovedsak intakt ut. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
153	Nedre Hallingdal	Nes	Sandåni	2	3	3,5 km	180-720	1616 II	NN 06-09 07-08	Ø-vendt kløft, dels markert, dels slakere. Flyfoto: en del påvirket, men også intakte partier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Småkraftverkrapport (?)
154	Nedre Hallingdal	Nes	Nybuelvi	2	3	2 km	360-840	1616 II, 1716 III	NN 10-12 13	V-vendt, bratt, ganske lita kløft. Flyfoto: I all hovedsak intakt, men hogd kloss inntil juvet i nedre del. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
155	Nedre Hallingdal	Nes	Fiskebekkgjuvet	3	3	1,5 km	530-750	1616 II	NN 08-09 20-21	Lita, men delvis markert, V- til S-vendt kløft. Inkluderer Bjørudsnatten/Fiskebekkgjuvet verneområde (naturresevat eller administrativt vern statskog). Nøkkelpotoper reg (OVF-skog).	Flyfoto, Hofton 2000
156	Nedre Hallingdal	Nes	Storeskardnuten	1	2	3,5 km	270-1000	1616 II	NN 02-04 12-13	Meget bratte, N-vendte lier og 3 bekkekløfter. Flyfoto: mest intakt, men en del hogd i nedre del. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
157	Nedre Hallingdal	Nes	Tronrudåni	2	3	1,5 km	380-620	1616 II	NN 00 12-13	N-vendt, markert bekkekløft. Fuktig eldre granskog i bunnen, tørrere bærlyngskog på sidene. Flere rødlistede lav påvist.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)
158	Nedre Hallingdal	Gol	Eiklesberget	1	1	3 km	280-800	1616 II	MN 98-99 27-29	N-vendte, markerte bekkekløfter. I all hovedsak intakt, gammel granskog. Potensielt store	Flyfoto

Kort oversikt over potensielt biologisk interessante bekkekløfter i Buskerud

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
159	Nedre Hallingdal	Gol	Liaåni	1	2	1,5 km	220-530	1616 II	NN 01 28-29	naturverdier. Kvaliteter ukjent. SV-vendt markert, bratt kløft. Intakt, gammelskog. Trolig rikt. Potensielt viktige verdier.	Flyfoto
160	Nedre Hallingdal	Gol	Rusteåni	1	1	4 km	260-720	1616 II	MN 99 30-33	S-vendt, stor og markert kløft, av fylkets største. Mye intakt gammelskog, men også en del hogd (kabeldrifter ca år 2000). Viktige naturverdier.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen), Naturbase, Gaarder 1998 (?)
161	Nedre Hallingdal	Gol	Hemsil	1	1	3 km	240-360	1616 II	MN 94-96 30-32	SØ-vendt, stor kløft omkring hovedelva Hemsil. Bratte sider. Flyfoto: ser i hovedsak intakt ut. Ei av få kløfter langs hovedvassdrag i fylket. Potensielt viktige naturverdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
162	Nedre Hallingdal	Gol	Verma	2	2	2 km	320-700	1616 III	MN 88-89 26-28	SØ-vendt, markert, bratt kløft. Flyfoto: Intakt. Noen gjengrodd små beiteløkker. Trolig rikt. Potensielt verdifullt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
163	Øvre Hallingdal	Ål	Lya	2	2	1,3 km	360-520	1616 III	MN 82-83 25	SØ-vendt, markert kløft ned mot hoveddalføret. Flyfoto: Ser rimelig intakt ut, men trolig småkraftverk med dam. Lenger opp hogd. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
164	Øvre Hallingdal	Ål	Votna	2	2	2,5 km	420-540	1616 III	MN 75-78 23-24	Ø-vendt, markert kløft ned mot hoveddalføret, omgitt av kulturlandskap. Flyfoto: i hovedsak intakt. Trolig rikt. Potensielt viktige naturverdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
165	Øvre Hallingdal	Ål	Kvinda	2	1	2 km	480-700	1616 III	MN 72-74 20-21	Ø-vendt, markert kløft ned mot hoveddalføret, omgitt av kulturlandskap. Flyfoto: i hovedsak intakt. Trolig rikt. Potensielt viktige naturverdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
166	Øvre Hallingdal	Ål	Kula	3	3	2 km	460-800	1616 III	MN 75 19-20	NV-vendt, nokså grunn, lita kløft. Flyfoto: mye hogd, men også en del intakt. Kulefossen kan være interessant fossefall. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
167	Øvre Hallingdal	Hol	Skiftesgrove	3	3	1,3 km	580-960	1516 II	MN 64 14-15	N-vendt, lita, trolig markert kløft. Flyfoto: hogd hele vestsiden, men trolig selve juvet intakt. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
168	Øvre Hallingdal	Hol	Usteåne ved Kvisla	1	1	4 km	490-680	1516 II	MN 61-64 14-16	NØ-vendt, markert, nokså stor kløft. Flyfoto: I hovedsak intakt. Ei av få kløfter i fylket langs hovedvassdrag. Potensielt viktige verdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
169	Øvre Hallingdal	Hol	Usteåne ved Slåtto	3	3	3 km	780-980	1516 II	MN 50-53 08-09	NØ-vendt, ganske slak elvedal, fjellnær. Flyfoto: I hovedsak intakt, trolig mest bjørkeskog. Trolig ganske marginalt potensial. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
170	Øvre Hallingdal	Hol	Budøla	3	3	3 km	800-1020	1516 II	MN 55-57 12-14	SØ-vendt, stor, markert kløft, fjellnær. Flyfoto: I hovedsak intakt, trolig mest bjørkeskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
171	Øvre Hallingdal	Hol	Hovsfjorden sør-side	2	2	4 km	610-1050	1516 II	MN 56-58 18-19	Bratt N-vendt lise med 4 små, men til dels markerte bekkekløfter. Flyfoto: I hovedsak intakt. Trolig mye bjørk. Potensielt verdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
172	Øvre Hallingdal	Hol	Bråsetjuvet Belvassgrove	1	1	6 km	660-1000	1516 II	MN 51-53 19-20	Bratt N-vendt lise med 4 små, men til dels markerte bekkekløfter. Flyfoto: I hovedsak intakt. Trolig mye bjørk. Potensielt verdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
173	Øvre Hallingdal	Hol	Hivju	1	1	2 km	700-1060	1516 III	MN 49 19-20	Bratt N- og Ø-vendt fjellnært kløftelandskap, dramatisk topografi. Større fossefall øvre del, potensielt fosserøyskone (vassdraget uregulert). Flyfoto: Intakt. Bjørkeskog + spredt furu. Frodig og rik bjørkeskog. Potensielt viktige verdier. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto, Bendiksen et al. 1991
174	Øvre Hallingdal	Hol	Urunda	2	3	4 km	680-850	1516 II, III	MN 49-50, 21-24	S-vendt, stor og markert kløft, fjellnær. Mye bjørkeskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
175	Øvre Hallingdal	Hol	Ufysja	3	3	1,5 km	820-960	1515 I	MN 57 02-03	N-vendt, dyp, markert kløft, fjellnær. Noe påvirket av veinngrep på vestsiden. Trolig mest bjørkeskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
176	Øvre Hallingdal	Hemsedal	Hydna	2	3	0,6 km	640-1000	1616 IV	MN 79 41-42	Ø-vendt, meget bratt lita kløft under Hydnefossen (høyt fossefall). Rasmarker. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
177	Øvre Hallingdal	Hemsedal	Skyrvedøla	3	3	3 km	680-1100	1616 IV	MN 76-77 43-44	N-vendt, markert kløft fra snau fjellet. Flyfoto: Ser i hovedsak intakt ut. Trolig mest bjørkeskog. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
178	Øvre Hallingdal	Hemsedal	Dyrgja	3	3	2 km	670-1100	1616 IV	MN 75-76 43-44	NØ-vendt markert kløft. Hovedsakelig i bjørkebeltet, men går ned i granskogen. Flyfoto: Noe påvirket/hogd nederst. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
179	Øvre Hallingdal	Hemsedal	Sollaustbekken	2	1	2 km	660-1050	1616 IV	MN 74-75 46	NØ-vendt kløft med flere sidebekker og bratte lier. Flyfoto: helt intakt. Kan være interessant. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
180	Øvre Hallingdal	Hemsedal	Trøymsåne	2	1	3 km	700-1100	1616 IV	MN 75-76 48-50	S-vendt, stor, markert kløft. Trolig for det meste bjørkeskog. Går opp i snau fjellet. Kan være rik fjellflora. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
181	Øvre Hallingdal	Hemsedal	Lauvdøla	2	1	3,5 km	740-1050	1516 I	MN 68 45-48	N-vendt, stor, dyp kløft. Trolig i hovedsak bjørkeskog. Flyfoto: ser intakt ut. Trolig fossefall, men regulert. Kvaliteter ukjent.	Flyfoto
182	Øvre Hallingdal	Hemsedal	Rjukanfossen	2	2	1,4 km	660-730	1516 I	MN 69-71 48-49	Kløfteparti langs Hemsila. Stor foss, svært fuktig, fosserøyskamfunn finnes (Terje Blindheim pers. medd.). En del påvirket, men også noe intakt. Rødlistede karplanter kjent. Kvaliteter dårlig kjent.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)

Bekkekløfter i Buskerud – oversikt over potensielt biologisk interessante lokaliteter

Nr	Region	Kommune	Område	Pri V	Pri R	Lengde	Hoh	Kart	UTM	Kommentarer	Referanser
183	Øvre Hallingdal	Hemsedal	Gjuva	2	2	2,5 km	740-1100	1516 I	MN 69-70 54-56	S-vendt, stor, dyp kløft, fjellnær. Flyfoto: I hovedsak bjørkeskog. Potensielt rikt (karplanter, moser). Interessante sommerfugl og karplanter påvist.	Flyfoto, Artsdatabanken (Artsbasen)

Referanser

Artsdatabasen: <http://artskart.artsdatabanken.no/>

Bendiksen, E. & Svalastog, D. 1999. Barskogsundersøkelser på Østlandet i forbindelse med utvidet verneplan. NINA Oppdragsmelding 619.

Bendiksen, E. 2004. Barskogsundersøkelser med hensyn til biologiske verdier i forbindelse med verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell. NINA Oppdragsmelding 830.

Bendiksen, E., Fangen, B.M., Hvoslef, S., Often, A., Pedersen, O. & Wesenberg, J. 1991. Verneplan IV. Botaniske befaringer fra 40 vassdrag på Østlandet og Sørlandet. NINA Utredning 24.

Bredesen, B. 2001. Korsrud. Siste Sjanse notat

Bredland, K. 2000. Kartlegging av viktige områder for biologisk mangfold i Sigdal kommune. Hovedoppgave, Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole.

Engelstad, B. 2007. Ekskursjon til bekkekløft sør for Lindtvedt/Kjørstad, Hostvedt. Kongsberg kommune 26.8.07. Nymfaea 3/2007: s.8

Engen, Ø. 1999. Varig vernede vassdrag i Sigdal kommune. Verneverdier langs Grønhovdsvassdraget 1998. Delrapport VVV nr. 1, Sigdal kommune.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hansen, L.O. 2001. E134 Damåsen-Saggrenda. Analyse av verdi og sårbarhet for tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001:24

Fylkesmannen i Buskerud 1982. Utkast til verneplan for edellauvskog i Buskerud fylke. 44 s.

Fylkesmannen i Buskerud 1999a. Verdier i Vergja i Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal kommuner i Buskerud. VVV-rapport 1999-1.

Fylkesmannen i Buskerud 1999b. Botaniske registreringer langs kysten av Buskerud. "Oslofjord-verneplanen". Rapport nr. 4 - 1999.

Fylkesmannen i Buskerud 2000. Verdier i Sørkjeå i Rollag kommune i Buskerud og Tinn kommune i Telemark. Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrag- og energidirektorat. VVV-rapport 2000-14.

Gaarder, G. 1998-99. Rusteåni notat.

Hanssen, E.W. 2004. Verneplan for Oslofjorden. Supplerende botanisk-mykologiske undersøkelser av Åroselva i Røyken kommune. Oppdragsrapport til Fylkesmannen i Buskerud. Rapport 003. HB - Naturforvaltning Even W. Hanssen.

Hofton, T.H. & Solvang, R. 2007. Naturtyper ved E16 Skardet - Hvalpåsen. Notat.

Hofton, T.H. 1999. Nøkkelpotop Sjølingelvi. Siste Sjanse notat.

Hofton, T.H. 2000. Nøkkelpotoper, restaureringsbiotoper og hensynsområder i OVF-skoger i Buskerud. Statskog Ressursdata Rapport xx-2000

Hofton, T.H. 2003a. Trillemarka-Rollagsfjell. En sammenstilling av registreringer med hovedvekt på biologiske verdier. Siste Sjanse rapport 2003-5

Hofton, T.H. 2003b. Biologiske verdier i Neverkollen-Lurtopp området i Finnemarka, Lier kommune, Buskerud. Siste Sjanse notat 2003-13

Hofton, T.H. 2004a. Tundra - Langvassåe i Rollag kommune - biologiske verdier og anbefalt forvaltning. Siste Sjanse notat 2004-20

Hofton, T.H. 2004b. Tverråsen – Nykjua i Lier kommune – biologiske verdier og vurdering som utvidelse til Finnemarka naturreservat. Siste Sjanse notat 2004-19

Hofton, T.H. 2004c. Supplerende biologiske registreringer i Trillemarka-Rollagsfjell. Siste Sjanse notat 2004-2

Hofton, T. H. & Blindheim, T. (red.), Klepsland, J., Reiso, S., Heggland, A., Abel, K., Brandrud, T.E. & Fjeldstad, H. 2007. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 3 Årsrapport for registreringer i Hedmark og Midt-Norge sør for Saltfjellet 2006. NINA Rapport 268. 185 s inkl vedlegg.

Holtan, D. (red.) 2006. Unike skoger – Forslag til vern. Rapport, Norges Naturvernforbund, Skogutvalget.

Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1.

Lund, T. 1982. Krødsherads planteliv.

Naturbase: www.naturbase.no


NN 1973. Landsplan for edelløvskogsreservater. Naturvernrådet.

Oldervik, F. G. & Hofton, T. H. 2007. Gjuvsgrendi kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2007: 14

Solvang, R. 2005. Biologisk mangfold i Krødsherad kommune. Kartlegging av naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold 2004. Asplan Viak

Svalstog, D. & Korsmo, H. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Buskerud. NINA Oppdragsmelding 360.

Whist, C.M. 1997. Sagelva nøkkelbiotop. Siste Sjanse notat.



BioFokus er en ideell stiftelse som skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. BioFokus ønsker å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

En kunnskapsbasert forvaltning forutsetter god dokumentasjon av de arealene som skal forvaltes. BioFokus legger derfor stor vekt på feltarbeid for å sikre oppdaterte og relevante data om botanikk, zoologi, økologi, samt avgrensning og verdisetning av områder.

Høy kompetanse er en forutsetning for å kunne registrere og presentere biologisk mangfold-data på en god måte. BioFokus sine medarbeidere er derfor godt skolert innenfor en rekke artsgrupper og har en bred økologisk forståelse for de ulike naturtypene som de arbeider med, det være seg skog, kulturlandskap eller ferskvann. Digitale verktøy som databaser, GIS og bilde-behandling er viktige redskaper i vårt arbeid for å anskueliggjøre naturverdier på en best mulig måte.

Stiftelse utgir en digital rapportserie som heter BioFokus-rapport, <http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>