

Biologisk mangfold i Nesodden kommune oppdatering av naturtypedata 2008

Terje Blindheim



Ekstrakt

BioFokus har på oppdrag fra Nesodden kommune laget en sammendragsrapport fra naturundersøkelser i kommunen fra 2000-2008. Ulike prosjekter, databehandling og ny dokumentasjon er gjennomgått. Det er gitt en kort gjennomgang av hvilke og hvor mange naturtyper som finnes i kommunen per januar 2008.

Nøkkelord

Akershus
Nesodden
Follo
Naturtypekartlegging

Omslag

FORSIDEBILDER
Øvre (Ertebikke): Kim Abel
Midtre (Røer): Kim Abel
Nedre (Blylagsdammen):
Kim Abel

LAYOUT (OMSLAG)
Blindheim Grafisk

ISSN: 1504-6370

ISBN: 978-82-8209-030-8

Biofokus-rapport 2008-1

Tittel

Biologisk mangfold i Nesodden kommune,
oppdatering av naturtypedata 2008

Forfatter

Terje Blindheim

Dato

25.01.2008

Antall sider

47 sider

Publiseringstype

Digitalt dokument (Pdf). Som digitalt dokument inneholder denne rapporten "levende" linker.

Oppdragsgiver

Nesodden kommune

Tilgjengelighet

Dokumentet er offentlig tilgjengelig.

Andre BioFokus rapporter kan lastes ned fra:
<http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>

BioFokus: Gaustadallèen 21, 0349 OSLO
Telefon 2295 8598


E-post: post@biofokus.no Web: www.biofokus.no

Forord

Stiftelsen Biofokus har på oppdrag fra Nesodden kommune foretatt en oppdatering av kommunens naturtypekart, og oppsummert de ulike kartleggingsprosjektene som kommunen har gjennomført siste 5 år. Ellen Lien har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver. Terje Blindheim i BioFokus har vært prosjektansvarlig og ansvarlig for å utarbeide denne rapporten. Takk til Bård Bredeesen for avgrensninger av lokaliteter på Røer/Sørby/Solberg.

Oslo, 25. januar 2008

Terje Blindheim



Bildene viser furuskog på skrinne koller, droningstarr i rik sump (tv) og rik edelløvskog (nederst)

Sammendrag

Fra 2000 – 2007 har det blitt gjennomført flere ulike kartleggingsprosjekter med fokus på biologisk mangfold i Nesodden kommune. Denne rapporten er skrevet for å gi en oversikt over hva som er gjort i de ulike prosjektene og å vise hvordan data fra de disse har blitt behandlet. Det har også blitt foretatt noen oppdateringer av naturtypekartet i denne forbindelse.

Nesodden kommune hadde etter første runde av naturtypekartleggingen kartlagt totalt 107 ulike naturtypelokaliteter. Etter den tid har det blitt gjennomført kartlegging av biologiske verdier i skog, amfibieundersøkelser har blitt gjennomført og systematisert, viltkartlegging har blitt gjennomført. I tillegg har det foregått en del aktivitet på ideell basis som har tilført viktig informasjon om arter og naturtypelokaliteter. Per januar 2008 er det dokumentert totalt 203 ulike naturtypelokaliteter i kommunen.

Innhold

1	INNLEDNING	6
1.1	OPPDRAG / BAKGRUNN	6
2	RESULTATER	7
2.1	SAMMENSTILING AV DATA I NATUR2000	7
2.1.1	<i>Viltdata</i>	<i>7</i>
2.1.2	<i>Naturtypedata fra 2003 (Bratli (2003)) og MiS kartleggingen.....</i>	<i>7</i>
2.1.3	<i>Verdivurdering.....</i>	<i>8</i>
2.1.4	<i>MiS data fra 2003</i>	<i>9</i>
2.1.5	<i>Lokalitetsnummerering</i>	<i>9</i>
2.2	DIGITALE KART	9
2.3	NY NATURTYPEHÅNDBOK I 2006	9
2.4	NYE LOKALITETER OG ARTSFUNN 2008	11
2.4.1	<i>Røer.....</i>	<i>11</i>
2.5	NATURTYPE DATA I KOMMUNENS DATABASE PER JANUAR 2008	12
3	DISKUSJON.....	46
3.1	PROBLEMER KNYTTET TIL OPPDATERING I 2006	46
3.2	VILT OG NASJONALT VIKTIGE KULTURLANDSKAP	46
3.3	VIDERE OPPDATERING	46
	REFERANSER	47

1 Innledning

1.1 Oppdrag / Bakgrunn

BioFokus har på oppdrag fra Nesodden kommune blitt bedt om å lage en dokumentasjon over kommunens naturtypekartlegging per 2008. Nesodden kommune ble kartlagt for naturtyper første gang i perioden 2000-2002 av NIJOS (nå Skog og Landskap) ([Bratli 2003](#)). Etter denne tid har det blitt foretatt skogregistreringer etter MiS metoden i 2003 og viltkartet ble oppdatert i 2004 med enkelte feltregistreringer i 2003 ([Heggland et al. 2004](#)). Begge de to sistnevnte arbeidene ble utført av BioFokus. I 2006 ble BioFokus bedt om å sammenstille eksisterende naturdata i Nesodden kommune og legge disse dataene inn i kommunens database for håndtering av informasjon om biologisk mangfold.

All naturtypekartlegging og viltkartlegging som skjer i kommunene blir presentert i Direktoratet for naturforvaltning sin database – Naturbase (www.naturbase.no). Dataene som foreligger på denne basen per januar 2008 er dataene fra første generasjons naturtypekartlegging presentert i Bratlie (2003), samt viltkartleggingens resultater fra 2003. Nasjonalt viktige kulturlandskap (Rør) er også lagt ut på denne nettsiden. På grunn av manglende kapasitet kan det ta noe tid før disse datasettene blir oppdatert i naturbase og per januar 2008 er ikke den siste sammenstillingen fra 2006 lagt inn i naturbase. De nyeste dataene er imidlertid presentert i [Folloportalens kartverktøy](#).

Per januar 2008 presenteres altså to ulike naturtypedatasett for Nesodden kommune. Forskjellene i datasettene har ført til usikkerhet med hensyn på hvilket datasett kommunen legger til grunn i sin arealforvaltning og hvorvidt oppdateringen som skjedde i 2006 har ført til uriktige tolkninger av de grenser som forelå fra 2003.

Denne rapporten er skrevet for å få frem fakta rundt de siste årenes naturtypekartlegging og viltkartlegging i kommunen.

2 Resultater

2.1 Sammenstilling av data i Natur2000

I forbindelse med samordningen av naturinformasjon mellom Follokommunene har BioFokus tilrettelagt eksisterende naturdata fra Nesodden kommune i natur database-håndteringssystemet Natur2000 (Naturkart DA). Dette arbeidet ble gjort i desember 2006. Under følger en kort oppsummering av hva som er gjort og hva som finnes av data i databasen. Databasen ble oversendt Naturkart DA 30. desember 2006 for videre implementering i Follokommunenes felles database. Dataene ble implementert i det felles systemet i 2007.

2.1.1 Viltdata

Viltdataene ble lagt inn i Natur2000 under siste oppdatering av viltkartet i 2003-2004 (Heggland et al. 2004). I etterkant av disse registreringene er det blitt registrert en rekke amfibiedammer. Disse dataene er blitt lagt inn i både naturtypekartet og viltkartet.

Amfibieregistreringer

Lokaliteter som var registrert av Sandaas frem til 2003 er inkludert i viltdatasettet som nå også er overført til naturtypetemaet. I tillegg er alle lokaliteter registrert fra 2004-2006 og som inneholder rødlistede amfibier lagt inn i basen. De aller fleste amfibielokaliteter er kartfestet som punkt. Det er imidlertid gjort unntak for dammer som også inneholder andre arter enn amfibier, eller hvor registreringen av dammen ikke nødvendigvis har hatt viltarter som amfibier som utgangspunkt. I den konkrete forvaltningen bør dette være uproblematisk da en uavhengig av om det er et punkt eller en flat vil få opp et ensartet faktaark for lokaliteten.


2.1.2 Naturtypedata fra 2003 (Bratli (2003)) og MiS kartleggingen

Totalt 107 naturtypelokaliteter ble avgrenset, verdisatt og beskrevet i første runde av naturtypekartleggingen (Bratli 2003). 32 av de 107 lokalitetene ble berørt av skogkartleggingen (MiS) i 2003. De 32 lokalitetene som ble vurdert i skogsammenheng hadde opprinnelig et areal på ca. 3460 daa. Etter vurdering i henhold til MiS metodikk ble ca. 1360 daa av disse ikke vurdert som interessante i skogsammenheng. For 26 av lokalitetene ble grensene endret, mens 6 lokaliteter ble fjernet i sin helhet da kvaliteten i de ikke var store nok til å klassifisere de som naturtyper eller MiS biotoper. Lokalitet 31 (Søndre Granerud-Hokholt) var den største lokaliteten som ble fjernet i sin helehet. Denne har blitt kartlagt på bakgrunn av viltverdier tidligere, men inneholdt få eller ingen interessant skog som tilfredsstilte de kriterier det ble kartlagt etter i 2003. Store områder innenfor avgrensningen var ganske nylig hogd. Denne lokaliteten alene utgjorde 320 daa.

Det ble også fjernet en del areal i Bergskogen da kvalitetene der ikke var store nok utenfor de to biotopene som ble avgrenset der (lok. 274, 275). Avgrensningen følger nå den som ble gitt av NOF opprinnelig. Viltområdet er avgrenset noe videre enn naturtypelokaliteten. Nytt feltarbeid bør gjøres for å stadfeste evt. andre kvaliteter i dette området.

Det er flere årsaker til at flere av de tidligere registrerte områdene i skog har blitt tatt ut eller fått nye grenser:

- Bedre tilgang på godt kartmateriale har forbedret avgrensingene (bestandskart og ortofoto fra 2003 har vært viktig her).
- Bedre økonomi i prosjektet har sikret mer nøyaktige avgrensinger enn det som var mulig innenfor ressursene i den første kartleggingen (gjelder skog).
- Hele eller deler av biotoper hadde blitt hogd mellom første og siste registrering.
- En del større områder beskrevet i Bratlie (2003) inkluderer gårdstun, veier og åkermark som ikke har særlig biologisk interesse.
- Fokuset for skogregistreringene i 2003 var skog alene og ikke kulturlandskap og dammer m.m. Av denne grunn er en del arealer i området Rør og Sørby som ikke har blitt klassifisert som skog som er falt ut. Det er snakk om store gamle tær, beitemark, hagemark med yngre skog og alleèr. Dette har skjedd fordi begge disse områdene har blitt veldig grovt kartlagt tidligere og avgrenset som en stor lokalitet. De enkelte naturtyper er beskrevet, men altså ikke avgrenset som enkeltobjekter.



Figur 1: Kartet viser et utsnitt ved Rør. Stiplede linjer viser registreringene fra 2003. Områder med blå farge er de arealene som ble registrert i forbindelse med skogregistreringen i 2003. Lokalitetene med tykk rød strek er resultatet av samordninga i 2006. Lokaliteter med blått som ikke har rød ytterlinje er lokaliteter med C verdi som har blitt valgt bort i MiS prosessen. Se punktene over for en gjennomgang av bakgrunnen for forskjellene som er oppstått.

2.1.3 Verdivurdering

Flere av lokalitetene som er vurdert på nytt har fått ny verdi. Dette er gjort med bakgrunn i nye feltregistreringer og gjennom en generell harmonisering av verdi-settingen i alle Follokommunene. Verdiene er bl. a. senket fra A til B for dammer som kun inneholder liten salamander (ny rødlistestatus fra des. 2006) og for en del lokaliteter som kun har arter av laveste rødlistekategori. Det er også gjort justeringer for lokaliteter som er høyt verdisatt på bakgrunn av funn av treslaget lind.

2.1.4 MiS data fra 2003

MiS data fra skogregistreringene fra 2003 er innarbeidet i datasettet. Lokalteter med lokal verdi (C verdi) som ble valgt bort i utvalgsprosessen er imidlertid utelatt. Dette er gjort for å harmonisere de to datasettene og unngå at forvaltningen må operere med to ulike datasett for naturtyper i skog. For mer informasjon om prinsippene knyttet til MiS kartlegging henvises det til Skog og landskap sine [nettsider](#).

2.1.5 Lokaltetsnummerering

De ulike datasettene som er lagt inn i basen kan til en hvis grad spores ut fra hvilket lokalitetsnummer som er tildelt lokalitetene. Tabell 1 gir et raskt overblikk.

Tabell 1: Nummerserier for ulike prosjekter i Nesodden kommune

Lokalitets-nummer	Prosjekt	Kommentar
1-107	NIJOS 2003	Opprinnelige lokalitetsnummere for de 107 registrerte naturtypene fra første kartlegging i 2002-3. Totalt 39 lokaliteter er slettet fra denne serien, men en del av dem er blitt flyttet over sum punkttema og gitt nytt nummer. En del lokaliteter i skog er erstattet av nye registreringer. Noen av skoglokalitetene er slettet fordi de kvalitetene var dårlige eller de har vært hogd etter første gangs registrering. Noen lokaliteter hvor verdien er beskrevet som "liten lokal verdi" er slettet fra materialet.
200-278	MiS kartlegging	Nye lokaliteter i forbindelse med MiS kartleggingen i 2004. En del gamle NIJOS (Skog og landskap) lokaliteter er flettet inn her.
280-299	Nye objekter januar 2008	Områder som er lagt til på bakgrunn av innspill fra personer som er godt kjent i Røer/Solberg/Sørby området, samt egne observasjoner og nye tilgjengelige data fra Artskart og muntlige kilder.
1001-1127	Viltkartlegging i 2004 samt Sandaas data.	Lokaliteter fra siste oppdatering av viltkartet, samt lokaliteter fra Sandaas 2004-2006. Dammer fra Bratli (2003) kan også være lagt inn her.

2.2 Digitale kart


I forbindelse med oppdateringen og sammordningen av data i en felles database har BioFokus produsert sosifiler for naturtypetemaet som kan brukes av Folloprosjektet og kommunen. Det er laget en fil for punkttemaet og en fil for flatetemaet. En grov oversikt over lokalitetenes utbredelse i kommunen kan sees av kartet på neste side.

2.3 Ny naturtypehåndbok i 2006

I 2006 ble det lansert en ny oppdatert versjon av naturtypehåndboka fra 1999. I databasen kan en del av naturtypene være oppdatert, men kodene for sosifila som lages har gamle koder. I tillegg til dette er det kommet en ny rødliste i desember 2006 som kan gi utslag for verdisettingen av lokaliteter.


BioFokus har ikke gjort endringer i kommentartekstene med tanke på at vi har fått en ny rødliste.

Oversiktskart over naturtypelokaliteter i Nesodden kommune per januar 2008



2.4 Nye lokaliteter og artsfunn 2008

I forbindelse med skrivingen av denne rapporten har det blitt gjort en jobb for å få med noen av lokalitetene som ble utelatt under den samordningen av data som skjedde i 2006. Totalt 6 nye lokaliteter er kommet til. Disse er merket med blått på figur 2. Alle lokalitetene finnes i Rør/Sørby/Solberg området.



Figur 2. Lokaliteter med blå farge er lagt til naturtypekartet i 2008 på bakgrunn av nye opplysninger og bedre stedsangivelse. Rørtjernet i sør er det største av de seks nye områdene.

2.4.1 Rør

På lokalitet nr. 2 Rør er det blitt foretatt kartlegging av både sopp, karplanter og insekter siste to år. Nedenfor er rødlisteartene som per i dag finnes i Artskart (www.artsdatabanken.no) listet, se tabell 2. Funn av Solblom har ført til at grensene er noe utvidet rundt hytta som står øst for Rørtjern. Her bør det vurderes skjøtsel i form av slått eller beite. I tillegg til artene under er den rødlistede billen *Mycetophagus fulvicollis* (NT) blitt registrert her i 2006. Alle artene funnet i dette området er lagt inn i basen. Nyfunn av andre arter er ikke behandlet i denne omgang.

Tabell 2: Arter hentet fra artskart januar 2008. Kun arter som er funnet eller tilgjengeligjort siste to år.

Kilde	Gruppe	RL	Latinsk navn	Norsk navn	Innsamlet	Lokalitet.
Naturhistorisk Museum	Sommerfugler	NT	<i>Macrochilo cribrumalis</i>	Punktviftefly	26.6.2006	rørtjernet
Naturhistorisk Museum	Sopp krysslister	NT	<i>Cortinarius dulosus</i>	frau- Barstrøslørsopp	12.9.2004	rør. eikeskog, blandet skog m. gråor, lønn, m.m. + gamle dammer m. sumpvegetasjon. leg./det.:alf nilsson
Naturhistorisk Museum	Sopp	NT	<i>Hygrophorus persoonii</i>	Eikevokssopp	24.10.2004	nesodden: rør eikeskog
Naturhistorisk Museum	Sopp	EN	<i>Geastrum scens</i>	rufe- Rødbrun- stjerne	jord- 2.10.2006/07	nesodden: rør rik edelløvskog med mye eik. ved basis av hul ask

Kilde	Gruppe	RL	Latinsk navn	Norsk navn	Innsamlet	Lokalitet.
Naturhistorisk Museum	Sopp	NT	Fistulina hepatica	Oksetungesopp	30.8.2006/07	nesodden: røer edelløvskog med mye eik, blåveis. ved basis av eik
Naturhistorisk Museum	Sopp	VU	Lepiota jacobii		11.9.2006	nesodden: røer rik edelløskog m/eik, ask, lønn og hassel.
Naturhistorisk Museum	Karplanter	VU	Arnica montana	Solblom	12.8.2005	nesodden: ved hytte ø for røtertjern noen sterile rosetter i tett klynge, mellom hytte og grasdekt kjerrevei

2.5 Naturtypedata i kommunens database per januar 2008

Totalt 203 områder er fordelt på verdi med 33 A områder, 110 B områder og 60 C områder. Tabell 2 under viser at det er hovednaturtypene ferskvann/våtmark og skog som er de to hyppigst forekommende med henholdsvis 89 og 73 av lokalitetene. Av naturtypene er dam den klart mest frekvente med hele 88 lokaliteter (43,3%). Totalt 17 ulike naturtyper er registrert i kommunen per januar 2008.

Tabell 2: som viser fordelingen av hovednaturtyper, naturtyper og deres verdi.

Hovednaturtype	Naturtype	Verdi	Antall
Ferskvann/våtmark	Dam	A	20
		B	63
		C	5
	Rik kulturlandskapssjø	C	1
Sum type			89
Kulturlandskap	Annen viktig forekomst	B	1
		C	1
	Artsrik veikant	B	1
		C	1
	Hagemark	A	2
		B	3
	Naturbeitemark	B	1
		C	1
	Parklandskap	B	1
	Slåttemark	A	1
		B	6
		C	4
	Store gamle trær	A	1
		B	1
C		4	
Sum type			29
Kyst og havstrand	Rikt strandberg	A	5
	Sand- og grusstrand	C	1
Sum type			6
Rasmark, berg og kantkratt	Kantkratt	A	1
		B	4
		C	1
Sum type			6
Skog	Annen viktig forekomst	C	3
	Gammel barskog	B	3
		C	10
	Gammel lauvskog	B	3
		C	10
	Rik blandingsskog i lavlandet	B	1
		C	1
	Rik edellauvskog	A	2
		B	16
		C	12
	Rik sumpskog	A	1
		B	6
		C	5
	Sum type		

Totalt alle

203

Tabell 3: viser en oversikt over naturtypelokalitetene. Listen er sortert på lokalt nr. i kommunens database.

Lok. nr.	Lokalitetsnavn	Hovednaturtype	Naturtype	Utforming	Verdi
1	Toåsen	Skog	Gammel barskog	Furuskog	C
2	Røer	Kulturlandskap	Hagemark	Eikehage	A
3	Langøyene N	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	Sørlig med varmekrevende arter	A
5	Kvistemyrdammen	Ferskvann/våtmark	Dam		A
6	Vest for Kvistemyr	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	C
8	Engsdammen	Ferskvann/våtmark	Dam		C
10	Rognskjærdammen øst	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B
14	Sør for Eng	Skog	Rik edellauvskog	Or-askekog	C
15	Sevholdtdammen	Ferskvann/våtmark	Dam		C
17	Sørbydammen	Ferskvann/våtmark	Dam	Eldre fisketomme dammer	B
19	Kirkebøen	Ferskvann/våtmark	Dam		B
22	Roås	Ferskvann/våtmark	Dam		B
23	Ellingstادتjern	Ferskvann/våtmark	Dam		B
28	Flaskebekktjernet	Ferskvann/våtmark	Dam		A
33	Løes	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	B
36	Oksval brygge	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	C
41	To gård	Kulturlandskap	Annen viktig forekomst		B
42	Buksedammen	Ferskvann/våtmark	Dam		B
43	Sprodammen	Ferskvann/våtmark	Dam	Isdammer	B
44	Nydammen S for Sprodammen	Ferskvann/våtmark	Dam	Isdammer	B
45	Torghagedammen	Ferskvann/våtmark	Dam	Isdammer	B
46	Temsen	Ferskvann/våtmark	Dam	Isdammer	B
47	Bråtedammen	Ferskvann/våtmark	Dam	Isdammer	B
48	Øst for Sprodammen	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	C
51	Storerudbråten	Skog	Annen viktig forekomst		C
52	Gaupemyrdammen	Ferskvann/våtmark	Dam		A
53	Persilengtjern	Ferskvann/våtmark	Rik kulturlandskapssjø	Næringsrik utforming	C
54	Fagerstrand brygge	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	B
55	Solbakken	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	B
56	Solbakken øst	Skog	Rik edellauvskog		C
57	Lillerud NV	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	C
58	Lillerud SV	Skog	Rik edellauvskog	Or-askekog	C
59	Lillerud NØ	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	C
60	Kjerringbukta	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	C
61	Humlesekken	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	C
63	Store Rud	Kulturlandskap	Hagemark	Eikehage	B
69	Ved steinbruddet N for Nordre Spro brygge	Rasmark, berg og kantkratt	Kantkratt		B
70	Vest for Sprodammen	Skog	Annen viktig forekomst		C
71	Mellom Temsen og Nydammen	Skog	Annen viktig forekomst		C
73	Høybråten vestre	Kulturlandskap	Store gamle trær		C
75	N-spissen av Kavringen	Rasmark, berg og kantkratt	Kantkratt		B
76	Linneflauet	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	C
77	Flaskebekkveien	Kulturlandskap	Artsrik veikant		C

Lok. nr.	Lokalitetsnavn	Hovednaturtype	Naturtype	Utforming	Verdi
78	Blylaget brygge - Linaro	Rasmark, berg og kantkratt	Kantkratt		B
79	Nord for Bomansvik brygge	Rasmark, berg og kantkratt	Kantkratt		B
81	Sør for Sørby brygge	Rasmark, berg og kantkratt	Kantkratt		C
82	Ved Nesodden kirke	Kulturlandskap	Artsrik veikant		B
83	NØ for Nesodden kirke	Kulturlandskap	Naturbeitemark		C
84	Øst for Nesodden kirke	Skog	Rik edellauvskog		B
86	Nord for Bommenveien	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C
87	Bleksli	Kulturlandskap	Store gamle trær		C
89	Sørstrand på Ommen	Kulturlandskap	Annen viktig forekomst		C
90	Fjell	Kulturlandskap	Store gamle trær		C
91	Husbergøya	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	Sørlig	A
92	Nordre Skjærholmen	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	Sørlig med varmekrevende arter	A
93	Søndre Skjærholmen	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	B
94	Langøyene S	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	Sørlig med varmekrevende arter	A
95	Ildjernet	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	Sørlig med varmekrevende arter	A
96	Landsteilene	Kyst og havstrand	Sand- og grusstrand	Grus- og steinstrand med spesiell flora	C
97	Persteilene	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	A
98	Storsteilene	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	B
99	Fyrsteilene	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	B
100	Knerten	Kulturlandskap	Slåttemark	Tørr, meget baserik eng i lavlandet	B
101	Gamle Hellvik brygge	Rasmark, berg og kantkratt	Kantkratt		A
103	Østre Skoklefall gård	Kulturlandskap	Store gamle trær		C
104	Solberg	Kulturlandskap	Hagemark	Eikehage	B
106	Bratli	Skog	Rik edellauvskog		A
107	Søndre Hasle	Kulturlandskap	Hagemark	Eikehage	A
201	Agnormåsan Sør	Skog	Gammel barskog	Granskog	C
202	Grøndalen	Skog	Gammel barskog	Granskog	C
205	Sylta Nordvest II	Skog	Gammel barskog	Granskog	C
207	Store Rud II	Kulturlandskap	Store gamle trær	Ikke-skjøttet	B
208	Toppen Sørvest	Skog	Rik blandings-skog i lavlandet	Sørboreal blandings-skog	C
209	Labråten	Skog	Gammel lauv-skog	Gamelt ospeholt	C
210	Nordby Nordvest	Skog	Gammel barskog	Granskog	C
211	Toppåsen Øst	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	B
212	Nylandsås	Skog	Gammel lauv-skog	Gamelt ospeholt	B
213	Gjøfjell Vest	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	C
214	Gjøfjell Øst	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	C
215	Nylennaveien	Skog	Gammel lauv-skog	Gamelt ospeholt	C
217	Trommeskinnmyra nord	Skog	Gammel barskog	Furuskog	C
218	Svenskemyr	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B
222	Bondan	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	B
223	Mellomstrand	Skog	Gammel lauv-skog	Gammel bjørkesuksesjon	C
224	Svarteberget	Skog	Gammel lauv-skog	Gammel bjørkesuksesjon	C
225	Mikkelstrand	Skog	Gammel barskog	Furuskog	C
226	Flatebybråten vest	Skog	Gammel lauv-skog	Gammel bjørkesuksesjon	C
228	Sylta	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C
229	Granerudstøa sør	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	B

Lok. nr.	Lokalitetsnavn	Hovednaturtype	Naturtype	Utforming	Verdi
230	Engsdammen øst	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C
231	Sevholdammen nord	Skog	Gammel lauv-skog	Gammel bjørkesukse-sjon	C
233	Håkonskastet	Skog	Rik blandings-skog i lavlandet	Sørboreal blandings-skog	B
234	Håkonkastsletta	Skog	Gammel lauv-skog	Gammel bjørkesukse-sjon	C
235	Håkonkastsletta øst	Skog	Gammel lauv-skog	Gammelt ospeholt	B
236	Flaskebekktjernet Sør	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C
237	Flaskebekktjernet SØ	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B
238	Kringsjøveien øst	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	C
239	Ommen	Skog	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	B
242	Gaupefjell vest	Skog	Gammel lauv-skog	Gammelt ospeholt	B
245	Baltserud øst	Skog	Gammel barskog	Granskog	B
247	Lønnås vest	Skog	Gammel lauv-skog	Gammel bjørkesukse-sjon	C
248	Holmsbakken	Skog	Gammel lauv-skog	Gammelt ospeholt	C
250	Rudstrand	Skog	Gammel barskog	Furuskog	C
252	Naverud Ø	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	A
253	Grøndalen	Skog	Rik sumpskog		B
254	Løes Nordre	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
255	Kongebråten N	Skog	Gammel barskog	Granskog	C
256	Røer N	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
258	Røer S	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
260	Sørby S	Skog	Rik edellauvskog	Or-askekog	A
261	Sørby Ø	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
262	Sørby N	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
263	Flateby S	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	C
264	Flateby V	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
265	Sandaker N	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	C
266	Nordre Sandaker	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
267	Grimsåsen	Skog	Gammel barskog	Furuskog	C
268	Hasla	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B
269	Rosenhøy	Skog	Gammel barskog	Granskog	B
270	Krystalldammen	Skog	Gammel lauv-skog	Gammel bjørkesukse-sjon	C
271	Hokholt	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
274	Ruin S	Skog	Rik sumpskog	Rik sumpskog	B
275	Berger	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
276	Berger N	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	C
277	Bergerbanen	Skog	Rik edellauvskog	Lågurt-eieskog	B
278	Haukemyr	Skog	Gammel barskog	Gammel granskog	B
280	Røertjernet	Ferskvann/våtmark	Dam		B
281	Røer 3	Kulturlandskap	Store gamle trær	Hult tre	A
282	Søndre Solbergvei	Kulturlandskap	Hagemark	Eikehage	B
283	Søndre Solbergvei sør	Kulturlandskap	Naturbeitemark	Frisk/tørr, middels ba-serik eng	B
284	Sørby	Kulturlandskap	Parklandskap	Allé	B
285	Sørby Ø II	Kulturlandskap	Hagemark	Askehage	
1052	Odden	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1053	Lagveien	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1054	Løkkeveien	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1055	Hellviktingen N	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1056	Ringveien	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1057	Ringveien S	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1058	Nesodden lettindustri	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1059	Berger gård	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1060	Solberg gård vest	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1061	Edv. Jacobsens vei	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1062	Tangen terrasse 2	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1063	Øvre Utsiktsvei 35	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1064	Solnedgangen 24	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1065	Skovrodammen	Ferskvann/våtmark	Dam		B

Lok. nr.	Lokalitetsnavn	Hovednaturtype	Naturtype	Utforming	Verdi
1066	Skoklefeldtjernet	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1068	Illjernet N	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1069	Illjernet S	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1070	Sunnaas N	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1071	Sunnaas S	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1073	Nyborgdam, store	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1074	Karlstad	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1076	Sørby N	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1077	Sørby S	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdammer	B
1078	Røer 1	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdammer	B
1079	Røer 2	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1080	Søndre Løes	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1081	Holt	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdammer	A
1082	Bjerkerud	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1083	Rud syd	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1084	Baldsrud	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1085	Ugleveien 36	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1086	Naverud gård	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1087	Blylagsdammen S	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1088	Blylagsdammen N	Ferskvann/våtmark	Dam		C
1089	Krystalldammen	Ferskvann/våtmark	Dam		C
1090	Søndre Hasle	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1091	Hasle NS	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1092	Søndre Grøstad S	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1093	Grøstad N	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1094	Heimli	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdammer	B
1095	Høybråten vestre	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1097	Hellaveien 186	Ferskvann/våtmark	Dam		C
1098	Nydammen	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1099	Dal	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1100	Labråten	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1101	Lille Nyborgdammen	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1102	Granerud søndre	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1103	Granerud midtre øst	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1104	Granerud midtre syd	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1105	Klufta	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1106	Damengveien nord	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1107	Myklerud nordre	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1108	Ødegård	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1109	Ugleveien 38	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1110	Agnor nordre syd	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1111	Kjelleråssvingen vest	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1112	Agnor nordre nord	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1113	Wistbakken 45	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1114	Steiner skolen	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1115	Johnsrud beite	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdammer	A
1116	Løeshagaveien	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1117	Sletta Ø	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1118	Skoklefeldt V	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1119	Teigen nordre rensedam	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1120	Lønnås	Ferskvann/våtmark	Dam		A
1121	Naverud	Ferskvann/våtmark	Dam	Eldre dammer	fisketomme B
1122	Fjellstrand - Glanern	Ferskvann/våtmark	Dam	Eldre dammer	fisketomme B
1123	Hellaveien 91	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdammer	B
1124	Nylenna	Ferskvann/våtmark	Dam	Eldre dammer	fisketomme B
1125	Myklerudbanen	Ferskvann/våtmark	Dam		B
1126	Nydammen N	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdammer	B
1127	Åslund NV	Ferskvann/våtmark	Dam	Gårdsdammer	A

Nedenfor er de 203 lokalitetene listet. I denne oversiktet er også kommentarfeltet med. Fullstendige faktaark som også inkluderer aller artsfunn og kilder kan fåes ved henvendelse til kommunen.

1: Toåsen - Skog - Gammel barskog, Furuskog **C** (verdi)

Toåsen omfattes av verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Lokaliteten ligger på vestsiden av Nesodden nordvest for To gård. Vegetasjonen består i følge Korsmo & Svalastog (1993) for det meste av fattige typer, vesentlig lavfuruskog, men også noe bærlyngskog, blåbærgranskog, fattig sumpskog og tresatt myr. Dessuten inngår myra Tomosan og to mindre tjern. Floraen er også fattig med et visst suboseanisk preg. Skogen er gammel og det forekommer en del død ved. Forsiktig plukkhogst og småflatehogst er foretatt tidligere. Myrvegetasjonen er også relativt intakt, men det er foretatt noe grøfting i sumpskogen. I en mindre del av området mot nord finnes eldre granskog, vesentlig blåbærskog, men også noe lågurtskog (Haugen 1995). Dette området har nordvendt, flersjiktet skog med mye dødt trevirke i flere nedbrytningsstadier. Gran dominerer, men også bjørk, furu, svartor, rogn, osp og selje finnes her. Den rødlistede arten rynkeskinn (DC) er registrert. Området er mye brukt til friluftsliv og bærer preg av dette. Mange stier krysser området og en lysløype ligger inntil lokaliteten i nord. Området ble i barskogsplanen vurdert som et meget verneverdig supplementsområde. Det er avgrenset etter Haugen (1991). Lokaliteten er ikke kvalitetsikret i forbindelse med miljøregistreringsprosjektet i skog i 2003. På bakgrunn av observasjoner under viltkartlegginga vurderes området totalt sett å inneha spredte kvaliteter knyttet til noe eldre gran- og furuskog, men at verdiene er lokale (c verdi).

2: Røer - Kulturlandskap - Hagemark, Eikehage **A** (verdi)

Lokaliteten er siste avgrenset i forbindelse med skogkartleggingen i kommunen i 2003. Området rundt Røer og Løes er variert og inneholder store naturverdier, og det foreligger flere undersøkelser fra området. I følge Hanssen et al. (1985) er dette Østlandets nordligste og største sammenhengende eikeblandingsskog. Foruten kulturpåvirket edelløvskog finnes gamle havnehager, beitemark, gamle trær, alléer, åkerholmer, dammer, og rundt Røertjern vierkratt og våtmarksvegetasjon. Flatby (1994) undersøkte området i forbindelse med registrering av nasjonalt verdifulle kulturlandskap og anså det som et spesielt verneverdig område. Det store innslaget av store og gamle edelløvtrær, særlig eik, preger området. Ellers finnes også blant annet ask, alm, lønn, lind, hassel, bøk, bjørk, rogn og gran. Tuntreet på gården skal være ca 800 år gammelt. Floraen inneholder arter som blåveis, geitved, leddved, korsved, lerkespore, gullstjerne og marianøkleblom. I beitemark og kantkratt finnes blant annet gjeldkarve, rødknapp, gulmaure, kantkonvall, gullkløver, bergmynte, smalkjempe, engnellik og fagerklokke. Ved hytta øst for tjernet vokser flekkgrisøre og den rødlistede arten solblom (hensynskrevende). Rundt Røertjern finnes vierkratt og sumpskog, blant annet med myrkongle. Ellers finnes småkløfter med gamle edelløvtrær og rik moseflora langs bekker.

Bredesen & Andreassen (1992) undersøkte fuglelivet i området. En lang rekke hekkende arter ble påvist. Blant de mest interessante observasjonene kan nevnes rødlisteartene skogdue (sårbar), vendehals (sårbar) og dvergspett (hensynskrevende). Pirol skal også være observert i området. Ellers kan nevnes bøksanger, kattugle, løvmeis og sivspurv. Hanssen et al. (1985) registrerte flere svært sjeldne insekter knyttet til gamle trær i området mellom riksveien og gården. Trærne er til dels svært store og ett var hult og med rødmduldet ved. Syv rødlistede arter ble funnet, blant annet *Euglenes oculatus*, *Scraptia fuscata* og *Atheta neglegens*. Funnene var de første i landet for førstnevnte og sistnevnte art. Maurarten *Lasius brunneus*, som er en karakterart for gamle, hule eiketrær med rødmdull ble også funnet, og den rødlistede soppen oksetungesopp (DC) er registrert i området. I 2004-2007 er det påvist flere rødlistede markboende sopparter i hagemarksskogen. I tundammen er rødlistearten spissnuteufrosk (sjelden) påvist av Strand (1996). Den store variasjonen, artsrikdommen og antallet rødlistearter medfører at området har store naturkvaliteter. Området er en integrert mosaikk av flere kulturmarkstyper, og behandles derfor samlet, da det er naturlig å se de høye naturverdiene i hele området i sammenheng. En beskrivelse av delområder finnes i Bredesen & Andreassen (1992). Gammel eikehage med funn av flere sjeldne insekt- og sopparter tilsier verdi som svært viktig (A verdi).

3: Langøyene N - Kyst og havstrand - Rikt strandberg, Sørlig med varmekrevende arter **A** (verdi)

Lokaliteten ble siste befart i forbindelse med botanisk registreringer på øyene i Oslo og Nesodden i 2001 (Bjreke 2002). Den påfølgende teksten er i sin helhet hentet fra denne rapporten: Langøyene var opprinnelig to øyer. De lå under kirken i middelalderen, seinere under gården Skoklefall på Nesodden frem til 1820. Sementfabrikk fra 1841 til 1860. I 1870 bodde det en familie på hver øy, men i 1891 var det bygget 15 sommerboliger på Langøyene (Waage 1998). I 1902 ble øyene solgt til Oslo kommune. Det grunne sundet mellom øyene ble brukt som søppelfylling i flere år. Hele midtpartiet er utfylling over denne søppelplass. Fastboende på øya til 1950-åra.

Langøyene av i dag er en av Osloboernes store utfluktsøyer. Den gamle fyllingen mellom øyene er en grønn stor plen som brukes til spill og festligheter. Velorganisert badestrand med kiosk på sørsida og tillatt camping på vestøya. Østøya er naturistområde.

Plantefunn:

- " Kalkfuruskog på begge øyene, minst gjennombrutt av stier på østøya.
- " Krattsamfunn, spesielt fint utviklet på den bratte østsiden.
- " Kalktørreng på strandklippene.
- " Grøntområde på midtpartiet. Gjødsetlet og tilsådd med plen. Ugrassamfunn.
- " Bergknappsamfunn på strandnære klippområder.
- " Steinstrand med driftvollsamfunn.
- " Små striper med strandengsvegetasjon.

Botaniske registreringer:

I herbariet på Botanisk museum, NHM, Oslo finnes 141 kollektorer fra Langøyene, tilhørende 94 forskjellige plantearter. Den gamle fyllingen har medvirket til mange observasjoner av mer spektakulære arter som ramtillablom, *Guizotia abyssinica* (1927), jødekirsebær, *Physalis alkekengi* (1927), blomkarse, *Tropaeolum majus* (1928), rugfaks, *Bromus secalinus* (1920), vin, *Vitis vinifera* (1924, 1927, 1937), hønsesirise, *Echinochloa crus-galli* (1930) og rødmelde, *Chenopodium rubrum* (1921, 1928). Bebyggelsen med sine hager har ført til registreringer av hagerømlinger som f.eks. registrering av kronvikke, *Securigera varia* (1976, 1997) og

luktskjærsmine, *Philadelphus coronarius* (1989). Majoriteten av disse arter er tilfeldige og er utgåtte i dag.

I herbariet ligger 6 kollektar av saftmelde, *Suaeda maritima*, fra tidsperioden 1920-1927 og 3 av sodaurt, *Salsola kali*, fra 1920-21, men ingen seinere funn. Ved registreringen i 2001 ble disse sumpstrandplanter ikke påtruffet, og må klassifiseres som utgått fra lokaliteten. Heller ikke noen passende biotop kunne påtreffes.

I 1984 ble det registrert 260 arter (Rustan, upubl.). Sommeren 2001 ble det observert 287 arter på Langøyene. Nykommere som kan noteres: strandkål, *Crambe maritima*, kvastsvæve, *Hieracium cymosum*, strandkjeks, *Ligusticum scoticum*, storblåfjør, *Polygala vulgaris*, bitterblåfjør, *P. amarella*, karve, *Carum carvi*, og takhaukeskjegg, *Crepis tectorum*. 43 arter registrert i 1984 ble ikke påtruffet i 2001, deriblant strand-snikjetråd, *Cuscuta europaea* ssp. *halophyta*, hundekveke, *Elymus caninus*, vindeslirekne, *Fallopia convolvulus*, sibirbjønnkjeks, *Heracleum sibiricum*, nattsmelle, *Silene noctiflorum*, og krusfrø, *Selinum carvifolia*. Tallene viser at til tross for at artsantallet er relativt konstant, så er graden av utskiftning av arter høy.

I kalkfuruskogen på vestøya vokser det et stort bestand av kalkgrønnaks, *Brachypodium pinnatum*, et gras som sjelden er blitt registrert i Indre Oslofjord. I skogen vokser spredte individer av orkideen rødflangre, *Epipactis atrorubens* og flere arter av asal: sølvasal, *Sorbus aria*, rognasal, *S. hybrida*, bergasal, *S. rupicola*, norsk asal *S. norvegica*, og svensk asal, *S. intermedia*. På begge øyene finner vi mange enkeltindivider av stjernetistel, *Carlina vulgaris*. En av de få vokseplassene i Indre Oslofjord for ekte malurt, *Artemisia absinthium*. Flere større forekomster av bakkeveronika, *Veronica arvensis*, og bakkeforglemmegei, *Myosotis ramosissima*, på østøya. Mange innførte arter av Cotoneaster, spesielt på vestøya.

Klippene og kalktørrengen på den nordlige delen av østøya er botanisk sett av meget høy kvalitet, dels pga. av artsrikedommen, dels artsutvalget med bl.a. oslosildre, *Saxifraga osloënsis*, trefingersildre, *Saxifraga tridactylites*, takhaukeskjegg, *Crepis tectorum*, bakkeveronika, *Veronica arvensis*, og en rekke arter knyttet til fuktigheten ved kulper i klippene. Rett til venstre fra båtbrygga ligger et klippeområde med skinn vegetasjon, hvor det vokser oslosildre, *Saxifraga osloënsis*, og trefingersildre, *Saxifraga tridactylites*.

Ett fertilt eksemplar av strandkål, *Crambe maritima*, vokste på sørvendt steinstrand på vestøya, dette var ikke registrert i 1984 (Rustan, upubl.), og må regnes som nyetablert.

Man bør observere at det høye artsmangfoldet på Langøyene delvis skyldes "ugrassamfunnet" i tilknytning til grøntområdet og de naturaliserte hagerømlingene. Artslista for 2001 er derfor delt opp i tre kolonner, en for østre øya, en for midtpartiet og en for vestre øya. Vi ser da at arter som småborre, *Arctium minus*, agurkurt, *Borago officinalis*, gjetertaske, *Capsella bursa-pastoris*, veitistel, *Cirsium vulgare*, klengemaure, *Galium aparine*, ugrasbalderbrå, *Matricaria perforata*, tunrapp, *Poa annua*, gåsemure, *Potentilla anserina*, vårpengeurt, *Thlaspi caerulescens*, høymole, *Rumex longifolius*, åkerdylle, *Sonchus arvensis*, og tunarve, *Sagina procumbens*, et typisk utvalg av ruderalplanter, kun ble registrert på den midterste delen av øya, og ikke vokste i den "naturlige" vegetasjonen.

Den vestre delen har opprinnelig fin kalkfuruskog og krattsamfunn, men kraftig slitasje og perforering av området med stier grunnet campingturisme gjør at området ikke har noe helhetlig biologisk bevaringsverdi per i dag (Bjøreke 2002).

Etter lansering av ny rødliste desember 2006 har en rekke karplanter som er registrert på lokaliteten falt inn som rødlistearter, de fleste som Nt (nær truet) arter. I tillegg en en lavart knyttet til strandberg rødlistet som truet (EN). Dette faktum og funn av flere rødlistede sopparter og insekter gir verdi som svært viktig (A verdi) på tross av en del påvirkning.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Som situasjonen ser ut år 2001 ser jeg ikke noe behov for verneforslag på Langøyene. Øya har tett båtttrafikk fra Vippetangen sommerstid, og utgjør en av Indre Oslofjords beste badeplasser og mest yndete utfluktsmål. Turismen bør fortsette å kanaliseres via tette båtturer til Langøyene, hvor hoveddelen av de besøkende oppholder seg badeplassen og grøntområdet. Derved beskyttes andre øyer for sterk slitasje (Bjøreke 2002).

5: Kvistemyrdammen - Ferskvann/våtmark - Dam, **A** (verdi)

Dette er en liten dam omkranset av skog med svartor, bjørk, rogn og noe ask. Skogen på sør- og vestsiden er hogd, mens det på nord- og østsiden i skrenten mot bebyggelsen finnes større trær. I følge Bolghaug & Dolmen (1996) ble det funnet larver av både stor og liten salamander og spissnutet frosk. De hevder at dammen bør vernes på grunn av artsrikdommen av amfibier og individrikdommen av vannlevende organismer. Strand (1996) undersøkte også dammen og fant begge salamanderartene. Han regnet den som en særlig verneverdig dam. Gunnar Halvorsen har nylig undersøkt dammen og funnet flere rødlistede arter, rundskivesnegl (Ex?), billen *Rhantus suturalis* (DC), sørlig høstlibelle (R) og liten bruskigle (R). Dammen omfattes av "Oslofjordverneplanen", hvor den ble gitt høyeste prioritet (Verneplanutvalget for Oslofjorden 1999). Langs bredden inngår vanlig vannkantvegetasjon med blant annet flaskestarr, skogsivaks og fredløs. I selve dammen finnes hvit nøkkerose og vanlig tjønnaks.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det er ønskelig å holde de oppskyttende trærne nede for å bevare soleksponeringen.

6: Vest for Kvistemyr - Skog - Rik edellauvskog, Alm-lindeskog **C** (verdi)

Lokaliteten består av en liten alm-lindeskog i rasmak under bratt skrent. I tresjiktet inngår til dels gammel lind med spettehull, rogn, osp, lønn, ask, villmorell og hassel. Floraen er rik med trollbær, mye blåveis, våreterknapp, kantkonvall, svartburkne og blodstorkenebb. På bergene og ved basis av trær finnes middels interessante mose- og lavararter.

8: Engsdammen - Ferskvann/våtmark - Dam, **C** (verdi)

Engsdammen ligger rett ved hovedveien og er påvirket av en veifylling. Vegetasjonen er relativt fattig med flaskestarr, sennegrass, bred dunkjevle, myrhatt, lyssiv og fredløs. I selve vannet finnes hvit nøkkerose og vanlig tjønnaks. Bolghaug & Dolmen (1996) hevder at dammen har et forholdsvis fattig dyreliv, trolig pga. predasjon fra karpefisk. I 2001 var dammen nedtappet.

10: Rognskjærdammen øst - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *B (verdi)*

Rundt den østre delen av Rognskjærdammen finnes både relativt fattig barskog og på østsida rikere barskog og edelløvskogspartier med svartor, ask og hassel. Edelløvslogen spenner fra varmekjær kildeløvskog til alm-lindeskog over korte avstander. Den sjeldne mosen ullmose ble funnet her, sammen med en rekke andre kravfulle sumpskogsmoser. Karplantefloraen er også meget rik med blant annet slakkstarr og sumphaukskjegg, barlind, myske, ramsløk, firblad og skavgras, foruten mer vanlige arter som krypsleie, gjøksyre, myrmaure, bekkeblom. Selve dammen som domineres av elvesnelle, deles i to av hovedveien og den er følgelig påvirket av veifylling. Korsmo (1974) nevner lokaliteten "S for Svestad" i verneplan for edelløvskog, men da den ikke er lokalisert på kart, er det usikkert om det refereres til det samme området. Ut fra hans beskrivelse er det imidlertid sannsynlig. Han oppgir at skogen er en inoptimal svartorskog, ferskvannsvariant, med forekomst av ramsløk, skavgras og slakkstarr.

Bolghaug & Dolmen (1996) hevder at dyrelivet ser ut til å være fattig. Ingen sjeldne arter ble registrert, men larver av padde ble funnet. Kildeløvskog er en av de mest truede vegetasjonstypene vi har i landet. Forekomsten dekker imidlertid bare små arealer lengst øst i lokaliteten og gis derfor kun verdi som viktig (B verdi).

14: Sør for Eng - Skog - Rik edellauvskog, Or-askeog *C (verdi)*

Lokaliteten består av en liten, frodig edelløvskog med svartor, lønn og ask langs et bekkebed. Ut mot stranda går skogen over til rike kantkratt med bl.a. blodstorkenebb, kantkonvall, kanelrose og geitved. Floraen er rik med lokalt til regionalt sjeldne arter som breiflange og sanikkel, og det er mye blåveis. Stedvis er marka fuktigere. Her finnes bl.a. fredløs og mye mjødurt.

15: Sevholdtdammen - Ferskvann/våtmark - Dam, *C (verdi)*

Lokaliteten består av to dammer tett inntil hverandre omgitt av hogstflater, noe lågurtskog og en boligeiendom. Vegetasjonen er relativt fattig med lyssiv, vanlig tjønnaks, fredløs og sennegrass. Langs bredden står litt ørevier og hengebjørk. Det er ikke kjent om lokaliteten er viktig for amfibier. Ikke undersøkt av Sandås.

17: Sørbydammen - Ferskvann/våtmark - Dam, Eldre fisketomme dammer *B (verdi)*

I følge Strand (1996) er dette en skogsdam med forekomst av vanlig frosk og liten salamander. Strand (1996) omtaler lokaliteten som særlig verneverdig. Liten salamander regnes som "nær truet" på den nasjonale rødlista. I dammen er også stokkand og kvinand registrert (Bredesen 1994).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ligger ved boligfelt og kan være truet av videre utbygginger (Strand 1996).

19: Kirkebøen - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Dette er i følge Strand (1996) en hagedam med forekomst av liten salamander (sårbar). Lokaliteten ligger i tilknytning til lokalitet 33, og bør ses i sammenheng med den rike løvskogen der. Forekomst av liten salamander gir verdi som viktig (B verdi).

22: Roås - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Ved Roås ligger en liten hagedam som i følge Strand (1996) har en forekomst av liten salamander. Arten regnes som "nær truet" på den nasjonale rødlista. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

23: Ellingstادتjern - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Ellingstادتjern er et lite skogstjern som i følge Strand (1996) har forekomst av liten salamander og padde. Liten salamander regnes som "nær truet" på den nasjonale rødlista, lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Den nærmeste skogen rundt tjernet er tatt med som buffersone.

28: Flaskebekktjernet - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Fuglelivet i og rundt Flaskebekktjernet er registrert av Norsk ornitologisk forening (NOF 1995b). Vegetasjonen består av fattig bar- og løvskog. Ung skog dominerer. 33 fuglearter er registrert, av disse er 28 hekkende. Gulsanger ble observert, ellers forekommer kun vanlige arter. Lokaliteten inneholder fire ulike amfibearter og trolig også stor salamander som enda ikke er påvist. Området er noe omtrentlig avgrenset. Fun av flere truede amfibearter, rike kantsamfunn av våtmarker og viktige verdier for fugl gir verdi som svært viktig (A verdi). To rike skoglokaliteter er avgrenset separat i sør.

33: Løes - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B (verdi)*

Lokaliteten består av gammel, grovvokst edelløvskog med mye eik, og yngre gjengroingskog med osp, bjørk og eik (Haugan 1996b). Noe ask, lind, lønn, hassel og furu finnes også. Verdifullt er forekomstene med gamle edelløvtrær, spesielt gammel eik. Tidligere skal det være registrert nattergal og pirol i lokaliteten. Det er mye død ved i området og dvergspett, som er regnes som hensynskrevende, har fast tilhold. Området er under gjengroing. Dvergspett har krav til store mengder død ved, og det er derfor viktig å sikre god tilgang på dette. Inntil lokaliteten ligger en dam (lokalitet 19), hvor liten salamander finnes.

36: Oksval brygge - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet *C (verdi)*

Rett ved Oksval brygge ligger en liten lokalitet med artsrikt kantkratt og tørrbergvegetasjon. Floraen er rik og inneholder en del arter typisk for de kalkrike øyene i Indre Oslofjord. Mest interessant er en forekomst med knollmjørdurt. Ellers finnes blant annet blodstorkenebb, berberiss, prikkperikum, bergmynte, markjordbær, gulmaure, fingerstarr og flekkgrisøre. Lokaliteten ligger inneklemt mellom brygger, parkeringsplass og bebyggelse. En sti som passerer området bidrar til å redusere naturverdiene. Små lommer med rik flora i bebyggelsen er likevel et verdifullt naturinnslag. Lokaliteten er derfor tatt med selv om den har lav lokal verdi.

41: To gård - Kulturlandskap - Annen viktig forekomst, *B (verdi)*

Området omfatter kulturmarka ved To gård og en smal sone av skogen rundt gården. Kulturlandskapet er variert med beitemark, slåtteeng, natureng, en dam, alléer og store edelløvtrær, blant annet flere store gamle eiker. På enga sør for gården stor en stor kroneik. Floraen på engene er artsfattig og inneholder vanlige arter som gulaks, markjordbær, ryllik og rødkløver. Dels finnes et nylig rydda beite, dels fulldyrka eng. I gjengroende hagemark og på knausene nord for gården finnes rikere flora, med blant annet flekkgrisøre, fingerstarr, hengeaks, rødknapp og knollerteknapp. Skogen rundt består av til dels ung og tett granskog, plantefelt løvskog og blandingsskog.

Norsk ornitologisk forening har registrert 56 fuglearter i området, hvorav 43 regnes som hekkende (Myhr 1998). Av mer uvanlige arter nevnes den rødlistede arten vendeheis (V), samt spurveugle, bøksanger, tornskate og stillits. Spurvehauk, musvåk, orrfugl, gjøk, svartspett og ravn streifer også innom området. Lokaliteten er noe omtrentlig avgrenset. Selv om området stedvis er relativt påvirket og intensivt drevet, er det vurdert som viktig, på grunn av rikt fugleliv, innslag med rik flora og forekomster med flere kulturmarkstyper.

Lokalitetens ulike naturtyper bør avgrenses mer eksakt og gis verdi separat.

42: Buksedammen - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Dette er en isdam med fattig vannvegetasjon omkranset av fattig furuskog og røsslyngdekte knauser. Dammen er uten veiforbindelse og mindre påvirket enn flere av de andre dammene i området. Gråhegre ble observert. Ellers finnes arter som slåttestarr, vanlig tjønnaks, vassgro, flaskestarr og bukkeblad. Langs kanten står hengebjørk, trollhegg, ørevier, osp og furu. Dammen inngår i et kompleks av dammer mellom Svestad og Fagerstrand. Sandås (1996) angir at spissnutet frok er funnet i dammen. Det er noe usikkerhet knyttet til dette funnet. Funn av nær truet art tilsier verdi som viktig (B verdi).

43: Sprodammen - Ferskvann/våtmark - Dam, Isdammer *B (verdi)*

Lokaliteten består av en relativt stor isdam med middels rik vann- og vankantvegetasjon. Typiske arter er klourt, dunkjevle, fredløs, flaskestarr, myrhatt og melkerot. Langs bredden står svartor, trollhegg og selje. I vest grenser dammen mot en vei, og villabebyggelse finnes helt inntil lokaliteten. På østsiden ligger en liten skogskrent med rik lågurtskog. Helt sør nær Buksedammen finnes sumpvegetasjon med bl.a. elvesnelle og eldre svartor i kanten av dammen. Lokaliteten er en del av et kompleks med isdammer.

44: Nydammen S for Sprodammen - Ferskvann/våtmark - Dam, Isdammer *B (verdi)*

Rett sør for Sprodammen ligger Nydammen. Den er forbundet med Sprodammen gjennom en liten bekk. Vannkantfloraen er middels rik med blant annet myrkongle, fredløs, skogsivaks, bukkeblad og mjølkerot. Langs bredden vokser blant annet ørevier og svartor. Dammen er omkranset av gammel granskog. Inkludert i lokaliteten er en liten kløft med rikere skog sør for dammen hvor blant annet lind og hassel inngår. Lokaliteten inngår i et kompleks av flere isdammer.

45: Torghagedammen - Ferskvann/våtmark - Dam, Isdammer *B (verdi)*

Dette er en liten dam inneklemt mellom hovedveien og flere villahager. Vann- og vannkantvegetasjonen er nokså triviell med bred dunkjevle, flaskestarr, myrhatt og mjølkerot. I kanten står ørevier, hengebjørk og hybriden mellom hvitpil og skjørpil. Lokaliteten inngår i et kompleks av flere isdammer mellom Fagerstrand og Svestad.

46: Temsen - Ferskvann/våtmark - Dam, Isdammer *B (verdi)*

Dette er en liten isdam som ligger langs hovedveien. Vegetasjonen er middels rik med blant annet bred dunkjevle, myrkongle, mjølkerot, fredløs, andmat og skogsivaks. Langs bredden vokser blant annet istervier og ørevier. Lokaliteten inngår i et kompleks av flere isdammer mellom Fagerstrand og Svestad.

47: Bråtedammen - Ferskvann/våtmark - Dam, Isdammer *B (verdi)*

Lokaliteten består av en relativt stor isdam omgitt av villabebyggelse, vei og noe skog. Floraen er middels rik med bred dunkjevle, elvesnelle, myrhatt og fredløs. Fra tidligere finnes innsamlinger ved Botanisk museum i Oslo av myrkongle og tvebustarr. Langs bredden står selje, hengebjørk og trollhegg. Lokaliteten inngår i et kompleks av flere isdammer mellom Fagerstrand og Svestad. Langs grusveien i sør finnes et sumpskogsparti med en del skavgras.

48: Øst for Sprodammen - Skog - Rik edelløvskog, Alm-lindeskog *C (verdi)*

Dette er en liten lokalitet med rik edelløvskog i blokkrik skrent rett øst for Sprodammen. Lokaliteten flater ut mot Sprodammen hvor den grenser til sumpvegetasjon med svartor. I tresjiktet inngår blant annet ask, sommereik, hassel og svartor, foruten gran og gammel osp. Vegetasjonen er av lågurtskog med blant annet blåveis, fingerstarr, myske, sanikkel og skogsalat. På bakken og på steiner finnes ganske rik moseflora med kysttornemose, hasselmoldmose, rottehaletmose og stortujamose.

51: Storerudbråten - Skog - Annen viktig forekomst, C (verdi)

Lokaliteten omfatter en barlindforekomst i gammel, men noe hogstpåvirket lågurtgranskog. Noen barlindindivider finnes spredt i lokaliteten. Ellers er floraen ganske rik med arter som blåveis, kranskonvall, skogsvinerot og skogsalat. Lokaliteten ligger inneklemt mellom bebyggelse og veier og påvirkes av dette.

52: Gaupemyrdammen - Ferskvann/våtmark - Dam, A (verdi)

Gaupemyrdammen er en relativt stor dam på vestsiden av hovedveien nord for Fagerstrand. Gunnar Halvorsen (pers. medd.) har her funnet den rødlistede teger *Hydrometra gracilenta* (DM). Her finnes også den sjeldne kransalgen skjørglattkrans (Langangen 1996), som regnes som sårbar (V). Arten er bare kjent fra noen få lokaliteter rundt Oslofjorden, men den er liten og lett å overse. For øvrig er vannvegetasjonen fattig med arter som hvit nøkkerose, gulldusk, lyssiv, bukkeblad, flaskestarr og fredløs. Rundt dammen finnes svartor og hengebjørk. I skogbunnen finnes noe rik vegetasjon med blant annet hengeaks og skogsalat. Både mort og abbor finnes i dammen, noe som kan forklare at salamander ikke er registrert her.

53: Persilengtjern - Ferskvann/våtmark - Rik kulturlandskapssjø, Næringsrik utforming C (verdi)

Persilengtjern er et lite tjern omkranset av sumpskog, sumpvegetasjon og myr, delvis beliggende mot kulturlandskap. I kanten rundt tjernet dominerer stedvis tette belter med takrør. Sumpvegetasjonen er velutviklet og rik med arter som kattehalv, dunkjevle og gulldusk. I selve vannet og langs bredden finnes gul nøkkerose, andemat, myrkongle, kjempepiggeknepp og vassgro. Ellers finnes vassrørkvein, klourt, gulstarr, fredløs, mannasøtgras, elvesnelle og krypsoleie. I sumpskogen inngår moser som kysttornemose og saglommemose. Den tilgrensende skogen preges av grøfthing, men er tatt med som en buffer mot sumpvegetasjonen og selve tjernet. Grøfthingen er særlig tydelig langs bekken på sørsida. På fuktig mark inngår blant annet svartor i løvskogen, mens eldre granskog finnes på tørrere partier.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Vegetasjonen rundt tjernet er sårbar for grøfthing.

54: Fagerstrand brygge - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet B (verdi)

Rett nord for Fagerstrand brygge på vestsida av veien ligger en liten tørreng med artsrik flora. Av spesielt interessante arter kan nevnes den kalkkrevende og varmekjære arten knollmjørdurt. Ellers finnes arter som åkermåne, lakrismjelt, kransmynte, bergmynte, gulmaure, blodstorkenebb og gjeldkarve. Enga preges av gjengroing, og påvirkning fra bebyggelsen omkring og en del nitrofile, høyvokste "ugressarter" kommer inn, særlig ved huset på sørsiden. Den rike floraen ser ut til å fortsette på Statoil-tomta. En hest beitet deler av lokaliteten i 2001. Trolig har eng opprinnelig vært slått og/eller beita, og skjøtsel for å ivareta den opprinnelige floraen er trolig nødvendig. En eik står midt i eng.

55: Solbakken - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet B (verdi)

Rundt Solbakken ligger en lokalitet med små kalktørrenger i veksling med svaberg og kant- og krattvegetasjon. Floraen er svært artsrik med flere interessante arter, først og fremst knollmjørdurt, som er en sjelden varmekjær art. Ellers kan nevnes arter som bergmynte, berberiss, mørkkongsløys, flekkgrisor, hvit bergknapp, svarterteknapp, knoppurt, smalkjempe, rødknapp, fjellrapp, gulmaure, blodstorkenebb, bakkemynte, markmalurt, nesleklokke og storblåfjær. På bergene finnes svartburkne og den noe kalkkrevende mosen putevrimose, og på stranda vokser bl.a. strandvortemelk og strandrug. Spredt står enkelte aske- og lønnetrær og noe einer. Selve hagen er inkludert i lokaliteten, men det er den opprinnelige vegetasjonen rundt og ned mot fjorden som har høyest naturverdi. Lokaliteten grenser til skogen i lokalitet 56 mot øst og bør ses i sammenheng med denne.

56: Solbakken øst - Skog - Rik edellauvskog, C (verdi)

Rett øst for Solbakken ligger et lite parti med åpen edelløvskog og kantkratt. Eik er vanligst, men også ask, lind, hassel og svartor inngår. Øverst går skogen over til blandingsskog med furu, eik, hassel og lind. Skogen er stort sett småvokst, men noen eldre trær finnes. Floraen er artsrik med en blanding av kant- og lågurtskogarter. Her kan nevnes berberiss, blodstorkenebb, prikkperikum, markjordbær, hengeaks, leddved, storblåfjær, flekkgrisor, korsved, skogvikke og bergmynte. Lokaliteten grenser til lokalitet 55 og bør ses i sammenheng med denne.

57: Lillerud NV - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet C (verdi)

Lokaliteten omfatter et lite tørrengfragment ved en hytte rett NV for Lillerud. Her finnes bl.a. den varmekjære og kalkkrevende arten knollmjørdurt. Ellers finnes fagerklokke, prestekrage, kantkonvall, skogkløver, kransmynte, bergmynte og dunhavre. En stor eik står også i lokaliteten, som ligger på tomte til hytta. Lokaliteten har lav lokal verdi.

58: Lillerud SV - Skog - Rik edellauvskog, Or-askeog C (verdi)

Lokaliteten omfatter relativt ung askeskog på begge sider av bekken mellom Lillerud og dammen på sørsiden. Vegetasjonen er relativt variert og veksler mellom fuktige og tørre skogstyper. I tresjiktet inngår mye ask, foruten lind, hassel, lønn, alm og eik. Enkelte større trær finnes. Mot sør overtar gran på tørrere og mer fattig mark. Floraen er artsrik med blant annet grov nattfiol, brunrot, firblad, svarterteknapp, marianøklebånd, nesleklokke og kransmynte. I skogbunnen og på blokker og små bergskrenter finnes rik moseflora. Skogen preges ellers av mye ungt askeoppslag. Den rike vegetasjonen fortsetter ned mot dammen, men denne delen ble ikke undersøkt da den var sperret av med gjerde.

59: Lillerud NØ - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet C (verdi)

På nordsiden av veien ligger et lite område klassifisert som kalkrik eng. Floraen er artsrik og flere av artene er basekrevende. Mest interessant er forekomsten med den varmekjære og sjeldne arten knollmjørdurt. Ellers finnes arter som smalkjempe, småengkall,

rødknapp, gjeldkarve, grov nattfiol, gullkløver og gulmaure. Enga er forholdsvis tørr og preges av gjengroing med busker og einer. I lokaliteten finnes også hagemarklignende partier, blant annet med en del middels gammel eik på grunnlendte koller. Ellers finnes en del osp og ask. For å hindre fortsatt gjengroing med konkurransesterke ugrasarter og busker og trær kreves skjøtsel i form av beite eller slått.

60: Kjerringbukta - Skog - Rik edelløvskog, Alm-lindeskog *C* (verdi)

På nordsiden av Kjerringbukta rett nord for Solbakken ligger et lite område med edelløvskog i blanding med furuskog i bratt sørvestvendt skrent. I tresjiktet inngår mye til dels gammel lind. Svartor finnes nærmest stranda. Deler av lokaliteten inneholder strandberg og kantkratt, og under små skrenter og knauser er det en del steinblokker. Floraen er artsrik med kantkrattarter og edelløvskogsarter i blanding. Det ble registrert arter som blodstorkenebb, fingerstarr, leddved, hengeaks, lakrismjelt, skogsalat, berberis, markjordbær, svarterteknapp, prikkperikum og bergmynte. Mer spesielt er forekomst av rødflangre, som er en basekrevende og sjelden art i regionen. På Nesodden er den kjent fra Langøyene og ved Ildjernet. Funn av vårbendel er også relativt interessant.

61: Humlesekken - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet *C* (verdi)

Lokaliteten består av ulike strandtyper, vesentlig relativt fattig strandbergvegetasjon, strandengfragmenter og tørrbakkepartier med middels rik flora. Mest interessant er en forekomst med den kalkkrevende, varmekjære og sjeldne arten knollmjørdurt. Ellers finnes flere typiske tørreng- og kantkrattarter, blant annet blodstorkenebb, bergmynte, rødknapp, knoppurt, vill-løk og gulmaure. Innslag av strandplanter som strandvortemelk, rødsvingel, saltsiv, strandrug og fjærekoll finnes enkelte steder. Dette medfører større variasjon i artsammensetning og større arts mangfold. Lokaliteten ligger inntil fritidsbebyggelse og påvirkes noe av det.

63: Store Rud - Kulturlandskap - Hagemark, Eikehage *B* (verdi)

Nord for tunet på Store Rud ligger en havnehage med store, gamle aske- og eiketrær. Den største eika måler 120 cm i diameter i brysthøyde. Store gamle eiketrær er viktige for en rekke insekter, lav og sopp. Særlig viktige er de grove trærne. Verdien viktig (*B* verdi) gis på bakgrunn av de enkelte grove trærne.

69: Ved steinbruddet N for Nordre Spro brygge - Rasmak, berg og kantkratt - Kantkratt, *B* (verdi)

Inneklemt mellom steinbrudd nord for Nordre Spro brygge ligger et område med artsrike kantkratt, bergknauser og tørrbakkeelementer. I østre del går vegetasjonen over i frodig edelløvskog, hvor ask, alm, lind, og lønn inngår i tresjiktet. Kantkrattene preges av blant annet rosearter, blant annet steinnype og brusknype. Floraen er artsrik med flere kravfulle arter. Blant annet er det mye bergmynte, for uten arter som kantkonvall, kyståkermåne, blodstorkenebb, prikkperikum, fingerstarr, blåveis og firblad. Funnet av kyståkermåne er interessant, da denne kystarten er sjelden i regionen. Det foreligger kun opplysninger om tre eldre innsamlinger i Oslo og Bærum, og to av nyere dato fra Frogn (Stabbetorp et al. 1990-96).

Området Fagerstrand - Spro blir nevnt som en interessant insektlokalitet av Hanssen & Hansen (1998). Særlig er det funnet mange rødlistede sommerfugler, men det antas at mange av disse er forsvunnet på grunn av nedbygging og området gis derfor lav verneverdi i Oslofjordverneplanen. Likevel er det grunn til å være oppmerksom på forekomstene, da det kan tenkes de mest interessante insekthabitatene nettopp er slike restområder, som denne lokaliteten.

70: Vest for Sprodammen - Skog - Annen viktig forekomst, *C* (verdi)

Lokaliteten omfatter en hogstpåvirket liten skoglokalitet på vestsiden av veien ved Sprodammen. Her er det rik flora i undervegetasjonen, mens den tidligere frodige skogen er tilplantet med gran. Trolig har det opprinnelig vært innslag av svartorskog i området. Lokaliteten er tatt med på grunn av forekomst av barlind, sanikkel, blåveis, kransmynte, mye firblad og nattfiol, men må sies å ha lav lokal verdi.

71: Mellom Temsen og Nydammen - Skog - Annen viktig forekomst, *C* (verdi)

Lokaliteten omfatter et variert skogsområde mellom Temsen og Nydammen. Terrenget er kupert med små kløfter og koller, og det er rikelig med mosedeekte bergvegger. Skogen er variert med blant annet delvis tilplantet svartorsumpskog, hagemarkpreget løvskog, lågurtskog med gran og fattigere furuskog på kollene. I tresjiktet inngår blant annet svartor, hassel, gammel osp, og gammel eik. Stedvis er det rikere flora med sanikkel, fingerstarr, hengeaks, skogsalat og blåveis. Spredt finnes også noe barlind.

73: Høybråten vestre - Kulturlandskap - Store gamle trær, *C* (verdi)

I hagen ved Høybråten vestre står en stor gammel eik. Denne eika er ikke nærmere undersøkt, men slike trær kan ha både rik insektfauna og kryptogamflora.

75: N-spissen av Kavringen - Rasmak, berg og kantkratt - Kantkratt, *B* (verdi)

På nordspissen av Kavringen ligger et lite område med kalktørrenger i veksling med artsrike kantkratt og kalkrike strandberg. Floraen er rik, men påvirkes av nærliggende båtslipp og bebyggelse. Det er hagepreg i deler av lokaliteten, men spesielt mot nord er vegetasjonen relativt lite påvirket. Floraen er typisk for kalkøyene innerst i Oslofjorden, hvor en lang rekke sjeldne kalkkrevende og varmekjære arter forekommer. Av dette floraelementet kan nevnes nakkebær, knollmjørdurt, aksveronika, hjorterot og markmalurt. Vi finner også arter som marianøkleblom, trådrapp, berberis, bergskrinneblom, blodstorkenebb, prikkperikum, bakkemynte, dunkjempe, dvergmyspel, dunhavre og kantkonvall. På bergene finnes også rik mose- og lavflora med putevrimose og krypsilkemose. Spredt inngår noe lønn, lind, morell og einer. Bjureke (2002) har nylig gjennomført en botanisk undersøkelse av

lokaliteten. Hun fant til sammen 91 arter, blant annet krattalant, trefingersildre og bakkefiol, foruten de tidligere nevnte artene, og hun gir området høy lokal botanisk verdi.

76: Linneflauet - Skog - Rik edellauvskog, Alm-lindeskog *C* (verdi)

Langs stien ned den vestvendte lia mot Kavringen brygge ligger en åpen kantpreget edelløvskog. Lokaliteten ligger bratt og utilgjengelig til. Delvis finnes åpne kantsamfunn med kantkonvall, dvergmispel, bergskrinneblom og blodstorknebb. På lite dypere jord dominerer lindeskog. Enkelte av trærne er gamle. Floraen består av arter som alperips, fingerstarr, geitved, engfiol og berberis. Lokaliteten er noe påvirket av stien og bebyggelse, men er generelt lite utsatt pga. det bratte terrenget.

77: Flaskebekkveien - Kulturlandskap - Artsrik veikant, *C* (verdi)

Lokaliteten består av en forekomst med den regionalt sjelden arten ramsløk. Arten står i veikanten over en strekning på 2-300 meter. Her vokser også de naturaliserte artene rød lungeurt og gullvetann.

78: Blylaget brygge - Linaro - Rasmark, berg og kantkratt - Kantkratt, *B* (verdi)

Langs fjorden fra Blylaget brygge og nordover ca 400 m finnes rike kantkratt i mosaikk med ulike strandtyper. Floraen er artsrik med bl.a. den sjeldne basekrevende og varmekjære arten knollmjørdurt. Ellers finnes kantkratt- og tørrengarter som gulmaure, mye dunkjempe, blodstorknebb, åkermåne, kantkonvall, flekkgrisor, vill-løk, gjeldkarve, knoppurt, geitved, marianøklebånd og berberis, for å nevne noen. Spredt står det noe småvokst ask, lønn og furu. Nede ved stranda finnes fragmenter av strandenger med bl.a. strandrug, rødsvingel, strandvortemelk, strandkjempe, strandnellik og gåsemure. Enkelte spesielle naturaliserte arter ble også observert, som kjempeturt. Lokaliteten er noe påvirket av friluftsliv.

79: Nord for Bomansvik brygge - Rasmark, berg og kantkratt - Kantkratt, *B* (verdi)

Nord for Bomansvik brygge ligger en liten lokalitet med kantkratt, som går over i åpen edelløvskog, svaberg og strandengfragmenter. I overgangen mellom kratt og svaberg vokser den rødlistede arten hartmanstarr (DC). Arten vokser i sigevannspåvirkede sprekker og forsengkninger på bergene, helt i kanten av kyststien. Trolig er slitasje lite problematisk, men forekomsten bør holdes under oppsikt. Ut over dette finnes flere tørrbakke-, kant- og edelløvskogsarter som vill-lin, blodstorknebb, berberis, geitved, blåveis, fingerstarr, hagtorn, rognasal og gulmaure. Langs stranda vokser strandplanter som strandkjempe og havstarr. I tresjiktet inngår bl.a. lønn, furu, ask, eik og selje.

81: Sør for Sørby brygge - Rasmark, berg og kantkratt - Kantkratt, *C* (verdi)

Rett sør for Sørby brygge, langs en liten bekk helt nede ved fjorden, ligger en liten lokalitet med artsrike kantkratt. Spredt finnes også noe lind, lønn, eik og rogn. Ellers inngår flere kravfulle arter, først og fremst den sjeldne arten knollmjørdurt. Av andre arter kan nevnes blåveis, bakkemynte, lodnebregne, kantkonvall, gulmaure, knegras, fingerstarr, svartburkne og kornstarr. På berg vokser den noe kalkkrevende mosen putevrimose. Lokaliteten er svært liten og ligger inneklemt mellom hogstpåvirket skog og villahage. Naturverdiene blir også redusert av en del spor etter ferdsel, slik at området må sies å ha lav lokal verdi.

82: Ved Nesodden kirke - Kulturlandskap - Artsrik veikant, *B* (verdi)

Langs grusveien rett ved Nesodden kirke ligger en bergknaus med artsrik kant- og knausflora. På toppen av knausen har vegetasjonen tørrbakke- og tørrengpreg, men det er verken beiting eller slått i lokaliteten i dag. Den sjeldne arten knollmjørdurt finnes her, sammen med en lang rekke tørrbakke- og kantarter. Her kan nevnes blåveis, nyresildre, markjordbær, knollerteknapp, blodstorknebb, firkantperikum, tveskjeggveronika, skogsalat, knoppurt, gulmaure, dunhavre og kantkonvall. Litt hassel og eik finnes også. Lokaliteten er liten og ligger utsatt til mellom veien og gården, men er svært artsrik tross sitt beskjedne areal. Den bør ses i sammenheng med beiter og skog i lokalitet 83 og 84.

83: NØ for Nesodden kirke - Kulturlandskap - Naturbeitemark, *C* (verdi)

Nordøst for Nesodden kirke, nord for grusveien og i tilknytning til edelløvskogen i lokalitet 84, ligger et hestebeite i slak østvendt skråning. Beitemarka er delvis tresatt med blant annet eik, alm og ask. I øvre del er lokaliteten grunnlendt og tørr. Her finnes en del bergknauser og det er en god del rose- og einerkratt. Dette øker variasjonen i området, som for øvrig inneholder middels rik flora. Av arter kan nevnes blåveis, firkantperikum, blåklokke, jonsokkoll, markjordbær, gjeldkarve, knollerteknapp, legeveronika, rødknapp, bleikstarr og prikkperikum. På bergknausene finnes typiske arter som småsyre, tjæreblom og vårskrinneblom. I flattere mer næringsrike og fuktige partier blir floraen artsfattigere og mer ensartet. Her kommer arter som glattveronika, tunrapp, hvitkløver og balderbrå inn. Lokaliteten bør ses i sammenheng med skogen i lokalitet 84, og den artsrike floraen i lokalitet 82.

84: Øst for Nesodden kirke - Skog - Rik edellauvskog, *B* (verdi)

Området består av frodig edelløvskog langs bekken øst for Nesodden kirke. Stedvis er skogen beitepåvirket, stedvis hogstpåvirket. I nedre del er det hogd helt inntil lokaliteten på sørsiden av bekken. Skogen varierer fra frodige og fuktige gråor-heggeskogspartier til mer tørr hagemarkspreget alm/lindeskog og lågurtskog med stor gran. Delvis ligger lokaliteten i en trang kløft langs bekken. I øvre del står en gammel eik. I de frodige partiene inngår arter som firblad, skogsvinerot og strutseving. I den hagemarkspregete delen inngår mye stor og grov eik, foruten stor lind, hassel, svartor og en god del osp. Noe gran og furu finnes også. Ellers finnes mye blåveis, den sjeldne arten knollmjørdurt, marianøkleblom, fingerstarr, brunrot, mye trollbær, korsved og vivendel. Helt i øst ved veien er det også tatt med et lite parti med kantkrattpreget vegetasjon. Her finnes bl.a. lakrismjelt, dvergmispel, bergskrinneblom og blåfjær. Området har også et rikt fugleliv.

86: Nord for Bommenveien - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *C* (verdi)

Området består av flere rike skogtyper som lågurtsskog og edelløvskog i blanding med fattigere furuskog på knauser. I tresjiktet finnes hassel, svartor, og ask, foruten furu og gran. Spredt finnes middels gammel eik. Det er en del natthol i lokaliteten, foruten blåveis, hengeaks, dunhavre, skogfiol, leddved, korsved og jonsokkoll. I fuktige forsenkninger, overrislede grunne partier og langs en liten bekk finnes arter som kornstarr, blåknapp og fredløs. Langs veien inngår også artsrik kantvegetasjon med storblåfjær, blodstorkenebb, rundskolm og gressløk (forvilla), foruten mer typisk knausvegetasjon på sure berg med småsyre, engtjæreblom, smørbutikk, stemorsblom og småbergknapp. Området har en variert og artsrik vegetasjon på et lite areal, men er generelt nokså påvirket. Det har derfor relativt lav lokal verdi.

87: Bleksli - Kulturlandskap - Store gamle trær, C (verdi)

Langs stien ned til Bleksli og i en liten skrent bak husene finnes et lite område med store, gamle aske- og lønnetrær. Også hassel og stor osp finnes. I ospe hekker kvinnend årvisst (minst seks år på rad i følge grunneier). På trærne finnes rikkbarksarter med moser og lav, blant annet ekornmose, gulbånd, putehårstjerne, grynvrøge og bleiktjafs. Trærne står delvis i kanten på tunet, delvis i blokkrik skrent. Også karplantefloraen er middels rik med marianøkkelblom, tårnurt, prestekrage, trollbær, tveskjeggveronika og markjordbær.

89: Sørstrand på Ommen - Kulturlandskap - Annen viktig forekomst, C (verdi)

Nær stranda ved huset på Sørstrand sør på Ommen finnes en forekomst med den sjeldne arten svalerot. Den er trolig forvilla fra hager opprinnelig og vokser i følge Lid & Lid (1994) i kratt på kalkgrunn noen få steder i Oslo og et sted i Drammen. Den er foreslått som sjelden på den nasjonale rødlista. Populasjonen står nokså tett og enerådende over et areal på ca. 25 x 25 m, delvis i mektige skjellforekomster, sammen med arter som tjæreblom, svartbukkne og olavskjegg (på berg), vinterkarse, berggull og blodstorkenebb.

90: Fjell - Kulturlandskap - Store gamle trær, C (verdi)

På tunet ved gården Fjell står en meget stor og gammel ask og en stor eik. Trærne er blant de største av sitt slag i kommunen. På trærne finnes enkelte rikkbarksarter med moser og lav.

91: Husbergøya - Kyst og havstrand - Rikt strandberg, Sørlig A (verdi)

Husbergøya tilhører de kalkrike bergartene fra kambrosilur i Oslofeltet. Kalkøyene i indre Oslofjord har en uvanlig rik flora og fauna med mange arter som har sine viktigste forekomster i landet her. Husbergøya er tradisjonelt dårligere undersøkt enn flere av de andre mer berømte øyene, fordi den ikke har båtforbindelse. Dette er imidlertid en fordel da slitastressen fra friluftslivet blir mindre. På store deler av øya er det derfor lite slitt, opprinnelig kalkflora. Husbergøya er relativt høy, med en marker brattskrent som stuper rett i fjorden på vestsida. Vegetasjonen preges av åpne typer; strandberg, tørrenger og tørrbakker og kantkratt. Særlig på øst, sør, og vestsiden er det store områder med fine soneringer av kantkratt, tørreng- og tørrbergvegetasjon ut mot strandbergene helt nede ved fjorden. Fragmenter av strandeng-vegetasjon finnes også. På toppen, rundt husene og ned mot brygga finnes noe kalkfuruskog og edelløvskog. Ved brygga og rundt husene er vegetasjonen mer ruderalpreget.

Floraen på øya er undersøkt av Bjørke (2002). Hun fant til sammen 218 karplantearter på øya. En fullstendig artsliste gis ikke her, men viktige arter er blant annet aksveronika, knollmjødurt, hjorterot, blåfjær, maria nøkkelblom, åkermåne, krattsleie, dragehode, vårmarihand, osløløvetann, slåpetorn, blodstorkenebb, villeple, blåveis, bakketimian og markmalurt. Den rødlistede arten osloasal (R) vokser i den bratte vestsikanten. Også bråtestorkenebb (R) er tidligere funnet på Husbergøya. På den nordre delen og på Kalven finnes smånøkkel, dragehode, trefingersildre og oslosildre. Det er i de mest opprinnelige naturtypene de viktigste forekomstene ligger, men også ved brygga finnes rik flora på forstyrret mark.

På sørspissen er fuglelivet rikt. Både grågås, kanadagås og hvitkinngås bruker området. Nokså spesielt er forekomsten av noen fuglegjødslate, ruderalpregete "guanofunn" på sørspissen. Her finner vi mye strisennep, tevkarse, småstorkenebb og åkersvineblom sammen med den opprinnelige kalkfloraen med gråodre, nikkesmelle, markmalurt, hvit bergknapp, aksveronika m.m. Øya er vurdert samlet selv om de mer hagepregete områdene rundt husene og de forstyrrede habitatene ved brygga har minst interesse. Trolig er det mye mer å finne på øya av mindre godt undersøkte artsgrupper, som insekter, og "laverstående" planter og sopp. I lavsammenheng peker vestsikanten seg ut som potensielt interessant. Bjørke (2002) gir øya høy regional verdi. Hun peker på at den er lite berørt av hyttebygging og ferdsel, som gir en mer intakt flora og vegetasjon over store deler av øya. Mulige påvirkninger av økt ferdsel bør derfor vurderes nøye, og øya bør skjermes mot hyttebygging. Husbergøya er for øvrig nevnt i verneplan for våtmarker som "lite verneverdig" (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987).

Lokaliteten vurderes på bakgrunn av siste rødliste fra 2006 som svært viktig (A verdi) da det er mange rødlistearter og potensiale for en rekke sjeldne insektarter knyttet til tørrbergene.

92: Nordre Skjærholmen - Kyst og havstrand - Rikt strandberg, Sørlig med varmekrevende arter A (verdi)

Nordre Skjærholmen er en lav holme som tilhører de kalkrike bergartene i Oslofeltet. Øya er en viktig hekkeplass for sjøfugl, og er omtalt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (1987) som lokalt verneverdig. Både kanadagås og snøgås hekker på holmen (Andersen & Bergan 1992). Det finnes typisk kalkrik flora på øya, med flere sjeldne kalkarter (Bjørke 2002). Hun beskriver vegetasjonen som tørreng- og bergknappsamfunn stedvis med sterkt fuglegjødslate "guanopreg", blant annet med strisennep. Av arter framheves murbukne, krattalant, vill gullrot og steinstorkenebb. Fra tidligere foreligger innsamlinger ved Botanisk museum i Oslo av blant annet gråodre, asparges, knollmjødurt, hjorterot, aksveronika og bakkefiol. Spesielt er også en forekomst med filtryllik, som i regionen tidligere kun er kjent fra Malmøykalven. Øya omfattes av verneplan for Oslofjorden, hvor den gis middels verneverdi.

93: Søndre Skjærholmen - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet B (verdi)

Søndre Skjærholmen tilhører de kalkrike bergartene i Oslofeltet. Også denne øya er viktig hekkeplass for sjøfugl, og den er omtalt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (1987) som lokalt verneverdig. Kanadagås og hvitkinngås benytter øya. Bjørke (2002)

undersøkte floraen i 2001, og fant til sammen 138 arter. Øya er lav og huser først og fremst tørreng- og bergknappsamfunn. Ellers finnes typisk kalkflora med blant annet krattalant og smånøkkel. Sjeldne strandplanter som tusengylden (DC) og saftmelde har tidligere vært registrert. Vært å merke seg er også filtryllik og strandkål. I en dam kommer brønnkarse, flikbrønse, paddesiv og pollsivaks inn. På grunn av det tette fuglelivet opptrer også en spesiell fuglegjødsepreget flora med arter som stankarse, strisennep, grådodre og småstorkenebb. Øya har høy lokal verdi (Bjureke 2002) og gis derfor verdi som viktig (B verdi).

94: Langøyene S - Kyst og havstrand - Rikt strandberg, Sørlig med varmekrevende arter A (verdi)

Teksten under er hentet fra Bratli 2002 og kommentaren er skrevet for hele øya og en del historiske karplantefunn er også lagt inn. Se også Bjureke 2002 for ytterligere pressiseringer av den søndre delen av alene. Langøyene består av to kalkøyer forbundet med en grasdekt fylling. Øya er en populær badeplass og den er mye besøkt i forbindelse med ulike friluftaktiviteter. Denne aktiviteten er konsentrert omkring gressarealene på midtpartiet og den nordre delen som benyttes til campingliv. Her er det en del slitasje på den opprinnelige vegetasjonen. Floraen er undersøkt av Bjureke (2002). Hun fant til sammen 287 arter, men det høye antallet kan til en viss grad tilskrives de mange ruderatartene som er funnet på fyllinga mellom øyene. Vegetasjonen på øya er typisk for de kalkrike øyene i indre Oslofjord med rike strandberg, tørrenger, tørrbakker og kantkratt. Det finnes også edelløvskog og kalkfuruskog og små partier med strandengvegetasjon. Floraen er rik med flere karakterarter for den rike floraen på kalken i Oslofeltet. Eksempler er oslosildre, stjernetistel, dragehode, knollmjødurt, smaltimotei og krattssoleie. De rødlistede artene liguster (DC) og bråtestorkenebb (R) er også registrert. Det samme gjelder den rødlistede soppen småjordstjerne (DC). Langs stranda finnes strandkål, og de sjeldne artene saftmelde og sodaurt ble registrert tidlig på 1900-tallet. Det er for øvrig fra tidligere registrert en lang rekke spesielle ruderatplanter fortrinnsvis på fyllinga på midtpartiet, men mange av disse er nå utgått.

Øya er sporadisk undersøkt med hensyn til insekter (Hanssen & Hansen 1998), og den blir antatt å ha middels verneverdi. Lønnebuk (DC) er en rødlistet art som i Norge kun er kjent fra indre Oslofjord. Ellers er de rødlistede billene *Leioderus kollari* (DC), *Simo horticornis* (DM) og *Baris artemisiae* (DC) registrert. For *Simo horticornis* er dette den eneste kjente norske forekomsten. Øya har store naturfaglige verdier til tross for at den er utsatt for slitasje. Det er grunn til å tro det også finnes interessante forekomster av andre artsgrupper som lav og moser på øyene. Blant annet er de meget sjeldne kalkkrevende skorpelavene *Squamarina cartilaginea* (sørøya) og *S. degelii* (nord øya) funnet. En rekke rødlistede planter, lav og sopp og forholdsvis lite påvirkning tilsier verdi som svært viktig (A verdi).

95: Ildjernet - Kyst og havstrand - Rikt strandberg, Sørlig med varmekrevende arter A (verdi)

Ildjernet er en kalkøy på vestsiden av Nesoddlandet. Øya er sterkt påvirket av hyttebebyggelse, men spredt finnes rik flora typiske for de kalkrike øyene i indre Oslofjord. Flere interessante arter er registrert på Ildjernet, men øya har inntil Bjurekes registreringer i 2001 ikke vært gjenstand for detaljerte rapporteringer av plantelivet. Foruten grøntområder og hyttebebyggelse finnes kalkfuruskog, tørrenger, bergknappsamfunn og et strandeng/strandsumpområde. Den rødlistede arten liguster (DC) er tidligere registrert. Ellers finnes de sjeldne artene saftmelde, fjæresalturt, strandrisp og strandkjeks i strandenga nord for båtbyggga. Denne enga antas å ha regional verdi (Bjureke 2002). Blant andre interessante arter som har blitt registrert på øye er hjertegras, tornbeinurt, smånøkkel, smaltimotei, osloløvetann, bakkefiol og trefingersildre. I kalkfuruskogen finnes rødflangre, blåveis og marianøkleblom. Til sammen 241 arter ble observert av Bjureke. Det er et stort potensiale for forekomster av andre dårlig undersøkte grupper på øya; insekter, sopp, lav og moser. Øya er avgrenset i sin helhet, selv om de viktigste områdene er de som er minst berørt av menneskelig aktivitet. Det bør gjøres en ytterligere registrering hvor de ulike naturtypene blir skilt fra hverandre og gitt separat verdi. Store deler av området er påvirket mye av hyttebebyggelse og ferdsel.

96: Landsteilene - Kyst og havstrand - Sand- og grusstrand, Grus- og steinstrand med spesiell flora C (verdi)

Landsteilene er den øya som ligger nærmest land av øyene på Steilene. Øya står i forbindelse med Persteilene ved en kunstig anlagt fylling. Den er sterkt preget av menneskelig aktivitet. Store deler består av opparbeidet areal, brygger og hus. Rundt mesteparten av øya er det opprinnelige kalkrike svaberg og steinstrand. Innenfor er det bygd opp betongmur og fylt igjen med grus og sand. Denne grussletta dekker store deler av øya, men spredt stikker den opprinnelige berggrunnen opp. Dette medfører en blanding av ruderatvegetasjon og opprinnelig kalkkrevende vegetasjon (som også finnes på opparbeidet areal). Langs stranda vokser strandkål et par steder, bl.a. sammen med strandreddik. Ellers finnes bl.a. markmalurt, ormehode, aksveronika, rødkjeks, rundskolm, hjorterot, flattrapp, markkarse, nakkebær, strandkjeks, strandløk og tevkarse. Floren på øya er undersøkt av Bjureke (2002). Landsteilene inngår i øygruppa Steilene som alle består av kalkrike bergarter og som samlet har høy naturverdi, men den sterkt påvirkede Landsteilene kan isolert sett ikke sies å ha mer en lokal verdi. Steilene nevnes også som en regionalt til lokalt verneverdig lokalitet for fugl (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987). Lokaliteten er klassifisert som sandstrand på bakgrunn av verdifulle steinstrandpartier.

97: Persteilene - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet A (verdi)

På sørspissen av Persteilene ligger et område med kalkrike svaberg, tørrberg og kantkratt. Her finnes velutviklet kalkkrevende vegetasjon med flere sjeldne arter. Vegetasjonen består av artsrike kantkratt, kantvegetasjon, tørrenger, bergknauser og svaberg i fine soneringer ned mot fjorden. Kalkflora typisk for indre Oslofjord er fint utviklet og nokså lite slitt, men stedvis påvirkes den stedege floraen av hageflyktninger som sølvarve og gravbergknapp (Bjureke 2002). Typiske arter er nakkebær, markmalurt, aksveronika, hjorterot, knollmjødurt, nikkesmelle, blodstorkenebb og enghavre. På bergene finnes også rik kryptogamflora. Funn av den sjeldne skorpelaven *Lobothallia radiosa* indikerer at også flere sjeldne kalkkrevende og varmekjære lavararter (og moser) kan finnes ved grundigere studier. Særlig peker en stor, sørvendt skrent nedenfor husene seg ut som interessant. Funn av den sjeldne og rødlistede soppen grann styltesopp (V) er også interessant. Den finnes på et fåtall steder i Oslo, Asker, Bærum, Vestby og Farsund (Brochmann et al. 1981).

Rik flora med mange interessante arter finnes over hele øya, men sørspissen er framhevet på grunn av de fine utformingene der, og

fordi resten av øya er nokså sterkt preget av ulik menneskelig aktivitet, som forringer de botaniske verdiene. Steilene nevnes også som en regionalt til lokalt verneverdig lokalitet for fugl (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987).

98: Storsteilene - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet *B* (verdi)

På Storsteilene finnes områder med kalkrike svaberg, tørrberg og kantkratt. Øya er påvirket av tankanlegg som fantes der tidligere, men partier med mer opprinnelig kalktørreng, bergknauser, og steinstrand med driftvollvegetasjon finnes. Floraen på øya er undersøkt av Bjureke (2002). Hun fant 122 arter på øya. Storsteilene inngår i øygruppa Steilene som alle består av kalkrike bergarter og som samlet har høy naturverdi, men isolert sett har Storsteilene lav botanisk verdi pga. påvirkningen. Steilene nevnes også som en regionalt til lokalt verneverdig lokalitet for fugl (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987).

99: Fyrsteilene - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet *B* (verdi)

På Fyrsteilene finnes kalkrike svaberg, tørrberg og kantkratt. Her er det forekomster med kalkkrevende flora med flere sjeldne arter. Hele øya er grundig undersøkt floristisk av Bjureke (2002). Hun fant til sammen 81 arter. Av disse kan honningkarse og hjorterot nevnes. Fyrsteilene inngår i øygruppa Steilene som alle består av kalkrike bergarter og som samlet har høy naturverdi. På øya finnes en del spor etter menneskelig aktivitet. Blant annet finnes et hus som kan leies av Oslofjordens Friluftsråd. Bjureke gir øya høy lokal verdi. Steilene nevnes også som en regionalt til lokalt verneverdig lokalitet for fugl (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987).

100: Knerten - Kulturlandskap - Slåttemark, Tørr, meget baserik eng i lavlandet *B* (verdi)

Knerten er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987). Holmen er vernet som sjøfuglreservat. For øvrig inngår Knerten i øygruppa Steilene som alle består av kalkrike bergarter og som samlet har høy naturverdi. Her finnes også velutviklet kalkkrevende vegetasjon med flere interessante arter. Øya er undersøkt floristisk av Bjureke (2002), som fant 85 arter til sammen. Kalkarter som aksveronika finnes. Vegetasjonen består vesentlig av bergknaus, kantvegetasjon og tørrenger. En dam finnes, og det er noen mindre bukter med driftvollvegetasjon. Spesielle nitrofile ruderatsamfunn lik de man finner på Husbergøya og Skjærholmene med blant annet strisennep inngår. Ellers finnes en stor bestand av strandkarse. Også strandkål er registrert. Bjureke gir øya høy lokal verdi.

101: Gamle Hellvik brygge - Rasmark, berg og kantkratt - Kantkratt, *A* (verdi)

Lokaliteten omfatter en forekomst med den svært sjeldne arten hvitmure. Dette er en av Norges sjeldneste karplanter, kun kjent fra 6 steder, alle i indre Oslofjord. Arten vokser på tørre bakker og i skogkanter på kalkrik grunn. Hvitmure er kjent fra Konglungen i Asker, Tåsen og Ekebergskråninga i Oslo, foruten to eldre upresise angivelser, hvor den sannsynligvis er nedbygd (Høiland 1988). På Tåsen-lokaliteten er den i sterk tilbakegang, mens den opprinnelig er utgått i Ekebergskråninga. Der er den imidlertid utplantet fra frø fra Tåsen (Stabbetorp & Wesenberg 1990). Sammen med Konglungen-forekomsten representerer derfor Hellvikforekomsten trolig de eneste livskraftige populasjonene i Norge. Arten regnes som direkte truet. Den ble oppdaget på lokaliteten i 1967 (Høiland 1988), og forekomsten omfatter fire delpopulasjoner, delvis i naturlig tørreng- og kantkrattvegetasjon, delvis i overgang mot plen. På ett av disse stedene er den delvis dekket av hageavfall. Det bør vurderes å gjøre grunneier oppmerksom på forekomsten slik at ikke tilfeldigheter ødelegger forekomsten. Den vokser sammen med arter som knoppurt, smørbutikk, bergskrinneblom, hvitbergknapp, hengeaks, gulmaure og kantkonvall. Gjenvoksing med syrin, ask, rosekratt og hundekjeks truer forekomsten, som bør skjøttes. Lokaliteten omfattes av verneplan for Oslofjorden (Verneplanutvalget for Oslofjorden 1999), hvor den gis høyeste prioritet. For øvrig finnes hvitmure innplantet og naturalisert i en hage ved Loes.

Etter råd fra professor R. Elven ved Botanisk museum bør man skjerme detaljerte opplysninger om forekomsten. Forekomsten er derfor ikke omtalt i kommunens biomangfoldrapport.

103: Østre Skoklefall gård - Kulturlandskap - Store gamle trær, *C* (verdi)

På en liten kolle rett nord for Østre Skoklefall gård står det en stor gammel kroneik. Slike store trær kan være viktige for mange arter med insekter, sopp, moser og lav. Epifyttfloraen på denne eika ser imidlertid ut til å være nokså fattig.

104: Solberg - Kulturlandskap - Hagemark, Eikehage *B* (verdi)

På tunet på Solberg gård står flere gamle trær, mest eik, men også en meget stor ask. På asken vokser den relativt sjeldne skorpelaven bleikdoggnål. Ellers finnes rikkbarksarter på trærne, bl.a. askeragg og lindelav. På tunet vokser også lerkespore og gullstjerne. Inkludert i lokaliteten er også et parti med åpen hagemark dominert av stor eik. Her finnes bl.a. en del lerkespore og blåveis.

106: Bratli - Skog - Rik edellauvskog, *A* (verdi)

Ved Bratli sør for Nesoddtangen ligger en forekomst med den rødlistede arten ertevikke (V). Arten finnes i halvnaturlig vegetasjon på en fritidseiendom. Eierne er informert om forekomsten og ønsker å ta vare på arten. Nærmere 30 individer over ca 10 x 15 m ble talt opp, flere var unge individer. Arten ble først samlet i området i 1834 (Høiland 1988), og har siden opprettholdt en livskraftig bestand. I Norge har arten noen få forekomster rundt Oslofjorden og et lite stykke nedover langs kysten i Telemark og Agder. Kun en håndfull lokaliteter er intakte i Oslo og Akershus. Delvis på eiendommen og i bratt skrent fra tennisbanen og et stykke sørover langs veien finnes rik edelløvskog med rasmarkpreg. I tresjiktet inngår lind, hassel og spisslønn. Floraen er middels rik, typisk kantpreget med kransmynte, bergmynte, brunrot, fingerstarr, svarterteknapp, nesleklokke, fagerklokke og markjordbær. På bergvegger vokser svartburkne og krypsilkemose. Lokaliteten er inneklemt og sterkt påvirket av bebyggelse, men pga. topografien beholdes et visst naturlig preg.

107: Søndre Hasle - Kulturlandskap - Hagemark, Eikehage *A* (verdi)

Sør for S Hasle ligger to åkerholmer med hagemarkskog. I tresjiktet inngår mye eik, delvis nokså gammel, foruten ask, furu og gran. Floraen er tørrbakkepreget og middels artsrik, bl.a. med tårnurt, kantkonvall, prestekrage, ryllik, rødknapp, gjeldkarve, sølvmure og legeveronika. De mest interessante funnene er gullkløver, den kalkrevende varmekjære arten knollmjørdurt og den rødlistede kulturmarksarten solblom (DC). Sistnevnte vokser i åkerkant lengst øst i lokaliteten i gjengroende tidligere beita hagemark. Tilsammen 35 rosetter ble talt opp, hvorav tre blomstrende individer over et areal på 1 x 1 m.

201: Agnormåsan Sør - Skog - Gammel barskog, Granskog *C* (verdi)

To mindre søkk/bekkedrag som møtes. Relativt gammel granskog med en del død ved, men ingen kontinuitet. Grana er i forfall og det er en del gadd av små til middels dimensjoner. I vest er det et lite sumpområde med bla bekkedrase og myrkongle. Et lite midtparti med yngre skog er inkludert for å få god arrondering. Biotopen er variert, ligger relativt godt beskyttet og innehar gode død ved kvaliteter. Sjelden type i Nesodden, lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

202: Grøndalen - Skog - Gammel barskog, Granskog *C* (verdi)

Øst-vest rennende liten bekk. Hovedsakelig granskog med noe innslag av boreale løvtreslag. I midtre og østre deler av biotopen er det noen små bergvegger langs bekken. Langs bekken er det enkelte rikere partier med høgstaudeskog. De østre delene ligger under inngangsverdi for registrering, men sjeldenhet i landskapet tilsier at bekkemiljøet bør restaureres. I vest er det et parti med flommarkskog dominert av svartor og ask. I feltsjiktet er det strutseving som dominerer. Biotopen er variert med enkelte nøkkelementer som er sjeldne i området.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

205: Sylta Nordvest II - Skog - Gammel barskog, Granskog *C* (verdi)

Et lite bekkedrag med noe sumpskog i øvre deler og lågurt edelløvskog i nedre deler. I sumpskogen er det enkelte grove svartor og noen få læger av gran og løv. I de nedre deler er terrenget bratt og det er en del innslag av bla lind og annet edelløv. Det står en relativt grov lind i lia på 50-60 cm i diameter i brysthøyde. Biotopen er viktig grunnet at det er intakt eldre skog langs et bekkedrag og en variert treslagssammensetning. Sjeldne elementer i området. Området er også dokumentert tidligere, da med en større avgrensning. Se Bratli (2003).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

207: Store Rud II - Kulturlandskap - Store gamle trær, Ikke-skjøttet *B* (verdi)

En samling av relativt grove edelløvtrær, spesielt eik. Største eika er på ca 120 cm diameter i brysthøyde. De fleste ligger rundt 50 cm. Området mangler de eldste og groveste eksemplarene, men det er en stor samling av grove trær som på sikt vil være gunstig for artsspredning. Den søndre delen har mer hagemarkspreg. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Fristilling av store trær. Spesielt eik. Fortsatt styving av de som har vært styvet.

208: Toppen Sørvest - Skog - Rik blandingskog i lavlandet, Sørboreal blandingskog *C* (verdi)

Sørvestvendt li med et lite fuktdrag. Mye impediment og glissen skog. Ikke spesielt gammel, men flersjiktet. Vegetasjonen er mosaikkpreget og påvirket av fuktsiget. Vegetasjonen er en veksling mellom hovedsakelig bærlyngskog, lågurtskog og lågurt-edelløvskog. Det er innslag av basekrevende karplanter. Biotopen har en variert treslagssammensetning og vegetasjonstypene grenser mot kalkrike typer, noe som er sjeldent i området. Opphør av hevd og mangel på virkelig gamle trær gir lokal verdi (C verdi). En større lokalitet er avgrenset og beskrevet som lokalitet 68 i Bratli 2003.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

209: Labråten - Skog - Gammel lauvskog, Gamelt ospesholt *C* (verdi)

Nordvendt løvbestand med en liten bekk i de nordre delene. Grenser mot en skytebane. I nord er tresjiktet dominert av ask, samt innslag av noe lind, lønn og boreale løvtrær. Den nordre delen består av et lite søkk/kløft med bekken i bunnen. I nord flater området litt ut og utvider seg. Tresjiktet er dominert av bjørk og osp. Det er lite til ingenting av død ved. Biotopen er en av få rene løvsuksesjoner i området.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

210: Nordby Nordvest - Skog - Gammel barskog, Granskog *C* (verdi)

Nordvendt granskog i lite søkk. Rik vegetasjon med bla blåveis og myske. Dimensjonene på grana er tildes grove. Det er noe død ved, men ingen kontinuitet. Det er ingen gamle trær, men lokaliteten har stort potensiale på sikt samt at dette er ett av få steder på Nesodden med konsentrasjon av død ved.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

211: Toppåsen Øst - Skog - Rik edellauvskog, Alm-lindeskog *B* (verdi)

Sørøstvendt alm-lindeskog i blokkmark. Stort område med mye lind. I de nedre deler kommer det inn noe hassel og gran, mens det i øvre deler kommer inn noe eik, ask og furu. Dimensjonene på lina er stort sett små og det er lite til ingenting av død ved. Størrelsen på biotopen og mengden av lind gjør biotopen spesiell i Nesodden og på sikt har biotopen stort potensiale for å huse en rekke kravfulle arter av sopp og lav.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

212: Nylandsås - Skog - Gammel lauvskog, Gamelt ospeholt *B* (verdi)

Et lite bestand i svakt søkk med en del osp av middels dimensjoner. Innslag også av en del gran. Det er en del liggende død ved av osp og gran, mens det er kun en stående død osp. Biotopen er en av få ospesuksesjoner på Nesodden. Det ble funnet to rødlistearter av sopp på osp (begerfingersopp og ospehvitkjuke).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

213: Gjøfjell Vest - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eieskog *C* (verdi)

Eieskog i kant av åker. Antageligvis tidligere beitemark (noe beites ennå). Det er god aldersspredning på trærne og godt sjiktet. De eldste og grøveste trærne mangler. Tresjiktet er dominert av eik, men det er en del innslag av andre boreale treslag. Vegetasjonen er rik med bla blåveis, fagerklokke, svarterte knapp og ant nattfiol. Biotopen er spesiell grunnet rik vegetasjon samt stort innslag av eik. Mangel på store dimensjoner og lite død ved gir lokal verdi (C verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ta vare på treslagsvariasjon samt ta vare på og fristille de største eikene. Plukkhogst.

214: Gjøfjell Øst - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eieskog *C* (verdi)

Sørvendt og relativt glissen eieskog i kant av åker. Variert treslagssammensetning, men dominert av eik og furu. Noen middels grove eiketrær. Det er lite til ingenting av død ved. Vegetasjonen er relativt rik med bla svarterte knapp. Biotopen er spesiell grunnet rik vegetasjon og innslag av middels grov eik. Mangel på store dimensjoner og lite død ved gir lokal verdi (C verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

215: Nylennaveien - Skog - Gammel lauvskog, Gamelt ospeholt *C* (verdi)

Blandingsskog med hovedsaklig lind og osp i nord vest vendt skråning, delvis på leire. Antakelig gammelt beitet som har grodd igjen. Forholdsvis ung skog enda, men har på sikt potensiale til å utvikle viktige løvskogskvaliteter som er mangelfullt representert i landskapet. Lite elementer, areal og ingen skoglig kontinuitet tilsier lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

217: Trommeskinnmyra nord - Skog - Gammel barskog, Furuskog *C* (verdi)

Ugrøftet, fattig sumpskog med 100% torvmosedekning. Noen gamle fururer i noe som trolig er ganske gammel skog. Sjelden naturtype i regionen da det ikke er spor etter grøfting. Lite areal tilsier lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

218: Svenskemyr - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *B* (verdi)

Sammensatt biotop med bratt skråning i nord hvor det er blandingsskog med stort innslag av løvtrær, bergvegger og en del rasmark. I sør og øst er det rik svartorsumpskog med slakkstarr som er en sjelden naturtype i Norge. Sumpskogen er rik på svartor og vannstanden er forholdsvis høy da gammel grøft er i ferd med å gro igjen. Viktig biotop i regional sammenheng tilsier verdi som viktig (B).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

222: Bondan - Skog - Rik edellauvskog, Alm-lindeskog *B* (verdi)

Vestvendt bratt li med flate hyller hvor det vokser lindeskog med innslag av eik, osp og bjørk. Mellom hyllene og i sør er det fattigere furuskog og gammel granskog med en del løvinnslag. Stevis er det steile bergvegger, grov rasmark og ur. Det finnes død ved av ulike treslag i alle nedbrytningsfaser. Rik vegetasjon med bl. a. svarterteknapp, vårterteknapp og krossved. Større forekomst av lindeskog, samt en del død ved elementer tilsier regional verdi (B viktig). Se også Bratli (2003) for ytterligere informasjon.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

223: Mellomstrand - Skog - Gammel lauvskog, Gammel bjørkesuksesjon C (verdi)

Variert skogli med en rekke treslag og naturtyper representert. Områder med gran med grov liggende død ved, løvskogs partier og noe furuskog. Deler er trolig beitepåvirket fra tidligere. Forholdsvis grov skog stedvis. Lokaliteten har generelt en del viktige elementer for biologisk mangfold, Det er lavereliggende og har en gunstig eksponering for arter som er knyttet til varmekjære skoglier. Vegetasjonen er stedvis rikere med innslag av f. eks. blåveis. Mangel på skoglig kontinuitet, samt lille størrelse gir totalt lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

224: Svarteberget - Skog - Gammel lauvskog, Gammel bjørkesuksesjon C (verdi)

Antakelig gammel utmarksbeitet som gror igjen med gran, bjørk og osp av varierende dimensjoner, men ingen spesielt grove trær enda. Få andre nøkkelementer. Kun lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Gran kan tas ut da det er løvskogen som er i fokus

225: Mikkelsenstrand - Skog - Gammel barskog, Furuskog C (verdi)

Vestvendt forsenkning ned mot sjøen. Forholdsvis rik vegetasjon Gran er dominerende i kløfta, men her er det en god del løvskog av bjørk, osp og lind også. Linda vokser kun i skrentene. Nedre deler er løvskogsdominert med bjørk og osp som viktigste treslag. Den sørlige delen har innslag av en del eldre furu opp mot 50 cm i diameter. Området har brukbare kvaliteter, men verdier er ikke høyere en lokal (C)

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst i nedre halvdel, mens det kan drives plukkhogst av gran i øvre del

226: Flatebybråten vest - Skog - Gammel lauvskog, Gammel bjørkesuksesjon C (verdi)

Antakelig gammel utmarksbeitet som gror igjen med gran, bjørk og osp av varierende dimensjoner, men ingen spesielt grove trær enda. Få andre nøkkelementer. Kun lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Gran kan tas ut da det er løvskogen som er i fokus

228: Sylta - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog C (verdi)

Liten ugrøftet og svakt hellende sumpskog med svartor. Vegetasjonen er forholdsvis rik med en del blåveis i øvre deler, ellers enhumleblom, mjødurt, skogburkne og vendelrot. Noe gran og furu i randskoner. Lite område hvor det tidligere er tatt ut frø fra svartor. Størrelsen og mangel på kontinuitet og spesielle arter tilsier lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst, unngå drenering av biotopen

229: Granerudstøa sør - Skog - Rik edellauvskog, Alm-lindeskog B (verdi)

Topografisk variert biotop. I hovedsak sørvendt med lind, osp og eik som dominerende treslag. Enkelte trær begynner å bli grove. Tre grove eiker rundt gammelt industri område. Det finnes noe rasmark og store steiner, samt enkelte fattige tørre bergvegger. Hele området bærer preg av noe kulturpåvirkning, men rike edelløvkoger med innslag av bl. a. blåveis og svarterteknapp er viktige for biologisk mangfold. Verdien er derfor satt til viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

230: Engsdammen øst - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog C (verdi)

Liten ugrøftet og rik sumpskog med en del svartor og ask. Det er lite sokler på trærne så det har antakelig ikke vært skog her så veldig lenge. En liten bekke renner gjennom biotopen. Av karplanter ble det registrert bl. a. brunrot, mjødurt, skogsvinerot, skogsivaks og klourt. Sistnevnte er karakterart for svartor-strandskoger. Lite areal og kort skoglig kontinuitet tilsier lokal verdi (C verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst. Det må ikke dreneres rundt biotopen

231: Sevholdammen nord - Skog - Gammel lauvskog, Gammel bjørkesuksesjon *C* (verdi)

Sørvestvendt lise med gran som dominerende treslag ispedden en del forholdsvis grove bjørk- og ospetrær. Skogen er ikke gammel og mangler helt kontinuitets elementer. Lang bekke står det en del svartor mend det er noe lind knyttet til skrentene i nord. Potensiale på sikt, men få kvaliteter i dag tilsier lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst av løvtrær, men gran kan tas ut.

233: Håkonskastet - Skog - Rik blandingsskog i lavlandet, Sørboreal blandingsskog *B* (verdi)

Variert biotop med en rekke elementer og stor variasjon i topografi, naturtyper og vegetasjonstyper. Spredt med død ved i av ulike treslag og nedbrytningsgrader. Tørr eksponert furuskog i den vestvendte skråninga og rik forholdsvis fuktig løvskog i partiet nærmest vei. Det ble gjort funn av den sjeldne sopparten hvit vedkorallsopp på mørkt læger av osp. Bekken i biotopen renner gjennom en dyp og smal kløft som kaster seg nedover skråningen. Her er det mye fuktige bergvegger. Stort potensiale på sikt for flere arter knyttet til gammel skog. Lokaliteten gis verdi som viktig (B verdi) pga. funn av sårbar art. Det er kun funn av livsmiljøer på bestandsnivå.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

234: Håkonkastsletta - Skog - Gammel lauvskog, Gammel bjørkesuksesjon *C* (verdi)

Mindre område med gjengroende kulturlandskap hvor hovedsakelig osp og bjørk dominerer. Få gamle trær og død ved elementer mangler helt. Ung skog på lite areal og med få nøkkellementer tilsier lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

235: Håkonkastsletta øst - Skog - Gammel lauvskog, Gamelt ospesholt *B* (verdi)

Løvsuksesjon som begynner å bli noe grovere. Det er stor treslagsvariasjon og ganske godt sjiktet skog. Vegetasjonen er meget rik med bl. a. myske, blåveis og fingerstarr spredt over hele lokaliteten. Dette sammen med en rik treslagsvariasjon gir biotopen grunnlag for å huse en rekke markboende sopparter knyttet til rike vegetasjon i skog. Til tross for tidligere kulturpåvirkning gis biotopen verdi som viktig (B).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst, men trær som faller over sti kan ryddes bort.

236: Flaskebekktjernet Sør - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *C* (verdi)

Ugrøftet liten sumpskog i tilknytning til vann. Svartor dominerer, men også noe gran finnes. Ung skog med små tredimensjoner. Lite areal og ingen funn av særegne arter tilsier lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst.

237: Flaskebekktjernet SØ - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *B* (verdi)

Todelt biotop med sumpskog i nord ved vannet og eldre løvskog i sørlige deler med forholdsvis grove osper. Søndre deler av biotopen er plukkhogd. Her står det spredt med forholdsvis grove osper opp til 50 cm i diameter. Viktig element for en rekke arter av insekter, sopp og lav. I sumpskogen ble det funnet slakkstarr og dronningstarr. To sjeldne arter i dette området. Sumpskogstypen er sjelden i hele landet og løvskogen forholdsvis grov, verdien settes derfor til regionalt viktig (B).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst. Mye av grana er allerede tatt ut av biotopen i sør.

238: Kringsjøaveien øst - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *C* (verdi)

Sump med blandingsskog av gran og svartor. Gammel grøft går gjennom området, men er nå i ferd med å fylles en del steder. Vannhusholdninga i biotopen vil på sikt gjenopprettes. Verdien vurderes til å være lokal (C verdi) per 2003.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst, grøft bør ikke graves opp igjen.

239: Ommen - Skog - Rik edellauvskog, Alm-lindeskog *B* (verdi)

Variert område med ulike naturtyper og mange nøkkellementer spredt. Rike edelløvskog med mye lind, områder med eik og hollet med bjørk og osp. I den vestvendte skråninga i øst er det barskog ispedd en del bjørk og osp. Her finner vi hvit vedkorallsopp som er en sjelden soppart som lever på gammel død ved av osp. Potensielt store verdier for sopp som er knyttet til død ved og til rik bakke under lind og hassel. Viktig viltbiotop for spurvefugl og spetter.

I Bratli (2003) står følgende: Det foreligger innsamlinger i herbariet ved Botanisk museum i Oslo av sumpartene langstarr og kjempepiggnopp. Trolig stammer disse funnene fra fuktige småsumper i bunn av åsen. Det finnes også eldre belegg av den

rødlistede arten bråtestorkenebb (R). På berg vokser svartburkne. I overgangen mot strandbergene på Ommen kommer arter som blodstorkenebb, dunhavre og smalkjempe inn. Selve strandbergene er imidlertid nokså artsfattige og er ikke inkludert. I øvre del går skogen over i furuskog med en visst oseanisk preg. Mosene storstyle og blåmose ble registrert her. Dette er suboseanisk arter, hvor særlig storstyle er nokså sjelden på Østlandet. Det oseaniske preget forsterkes av at flere moser og lav med kystutbredelse er funnet, som skjørblæremose, ryemose og blyhinnelev. Dette er arter med en nokså begrenset utbredelse på Østlandet. Furuskogen i overkant av lokaliteten og nordover ble ikke undersøkt, men det er sannsynlig at relativt naturnær, potensielt viktig furuskog finnes her. Det er lite død ved i edelløvskogen, og det ble observert at rydding av døde trær er foretatt. Det anbefales at de døde trærne ikke blir tatt vekk, da dette er viktige levesteder for blant annet insekter, sopp og moser. Videre anbefales det at man tar mest mulig hensyn til skogen ved tilrettelegging for friluftaktivitet. Stier og lignende bør f.eks. ikke opparbeides mer enn i dag.

Gammel rik skog med mange nøkkelementer over et forholdsvis stort areal tilsier regional verdi (B).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

242: Gaupefjell vest - Skog - Gammel lauvskog, Gamelt ospeholt *B (verdi)*

Småkupert område med variasjon i terreng og naturtyper, fuktighet og elementer. Området har yngre skog etter hogst for en del år tilbake. Det er imidlertid ikke blitt plantet gran og det har utviklet seg en naturlig løvsuksesjon. Det finnes forholdsvis mye død ved av osp i et parti. Her fant vi sopparten ospepig som lever på død ved av osp. Bra potensiale som løvskogsbiotop og funn av sjelden art tilsier regional verdi (B).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

245: Baltserud øst - Skog - Gammel barskog, Granskog *B (verdi)*

Svak forsenkning med grov granskog og furu i kantene. En del læger og gadd, en hvis kontinuitet i død ved. Noe berg og blokkmark, samt høystubber av gran. Tidligere beitepåvirka skog på rik grunn. Det ble gjort funn av den rødlista sopparten begerfingersopp på en enslig ospelåg. En av få biotoper i landskapet med en viss kontinuitet i død ved tilsier regional verdi (B).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

247: Lønnås vest - Skog - Gammel lauvskog, Gammel bjørkesuksesjon *C (verdi)*

Tidligere kulturmark som er grodd igjen med osp, bjørk og gran. Få kvaliteter i dag, men har potensiale på utvikle gammel løvskog på sikt. Lokal verdi (C).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
På sikt kan det tas ut gran

248: Holmsbakken - Skog - Gammel lauvskog, Gamelt ospeholt *C (verdi)*

Område med osp som står igjen etter at barskogen er hogd ut. 25-30 stk grove osper som måler 35-70 cm i diameter. Viktig habitat for en rekke insekter, sopp og fugler. Noen av de største ospene som ble registrert på Nesodden. Trærne kan potensielt være viktig levested for sjeldne insektarter knyttet til ekskonerte ospetrær. Lokal verdi (C) da ingen spesielle arter er bekreftet per i dag.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
På sikt kan det tas ut gran

250: Rudstrand - Skog - Gammel barskog, Furuskog *C (verdi)*

Barblandingsskog med noe innslag av osp og bjørk. Mest død ved i sør ellers spredt i biotopen. En del død ved av furu finnes, noe som er sjeldent i landskapet ellers. Til tross for funn av en rødlistet art gis lokaliteten lokal verdi (C verdi) da det jevnt over er lite gammelskogselementer.

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

252: Naverud Ø - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *A (verdi)*

Svartorsump langs bekk med mye død ved av gran. Flere grove svartor også noe død ved. I skråning noe rikt med blåveis ellers fattig med mye død ved av gran, mest av tidlig nedbrytningsstadie. Også en liten sump med svartor i øst. Innslag av bjørk og osp i skråningen, noe død ved av disse også. Meget variert biotop med mange elementer, ganske stort areal og flere sjeldne arter tilsier verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

253: Grøndalen - Skog - Rik sumpskog, *B (verdi)*

Sumpskog med høyt vannspeil. Flere svartor med 0.5 m sokkel. Granskogen er rel. ung med noe gadd og læger. Finnes noe bjørk. Sjeldent med sumpskog med høyt vannspeil i landskapet ellers derfor gis lokaliteten verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

254: Løes Nordre - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Gammel hagemark med flere eldre eik. Varierer med rike partier, skrinne partier og mer fattige områder. Noe gran er plantet i området. Stedvis nyere hogsttinnegrep der gamle eiker er spart. Innslag av osp finnes. Noe mindre dimensjoner på eik enn rundt Røer. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Rydde busk og småtrær samt fristille de største eikene. Plukkhogst av gran og ingen planting av gran. Beite bør gjennoptas.

255: Kongebråten N - Skog - Gammel barskog, Granskog *C* (verdi)

Kløft/søkk med ospesuksesjon i lia i vest ned mot fuktigere sump med hovedsakelig gran i bunn. En del yngre ospeskog i lia er inkludert for å utvikle eldre løvsuksesjon på sikt. En del død ved av gran finnes i bunn av søkk. Biotopen er gunstig arrondert for å beholde et fuktig lokalklima. Mangel på kontinuitet og gammelskogs-elementer tilsier verdi som lokalt viktig (C verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

256: Røer N - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Hagemark som beites i dag av hest med flere gamle eik, også noe innslag av yngre edelløv og borealt løv. Rik vegetasjon. Finnes gadd og læger av eik. Del av flere eikeskogsbiotoper rundt Røer, bør ses i sammenheng som bl. a. et viktig vilt- og kulturlandskapsområde. Skjødseil er viktig for å bevare verdiene i området. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Fortsatt beite

258: Røer S - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Hagemark lågurtskog med flere eldre eik. Noe død ved av hassel finnes. En del bjørk i nord med flere grove læger. Biotopen er noe mer påvirket i nord. Finnes noe lønn i biotopen. Del av flere eikeskogsbiotoper rundt Røer, bør ses i sammenheng som bl.a. et viktig vilt- og kulturlandskapsområde. Skjødseil er viktig for å bevare verdiene i området. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

260: Sørby S - Skog - Rik edellauvskog, Or-askekog *A* (verdi)

Meget variert biotop langs to bekker som møtes. Varierer fra granskog med død ved og svartorsump langs bekkene i vest, til edelløvsog, svartorsump og ospesuksesjoner i vest etter elvemøtet. Det er også innslag av hagemark med eldre eiker sør for Sørby gård. Bergvegger finnes langs bekken. Spredt med død ved av både gran, borealt løv og edelløv. Området er meget viktig viltområde med bl.a. dvergspett. En total vurdering av skogkvaliteter og viltverdier gir verdi som svært viktig (A verdi). Se også beskrivelse i Bratli (2003).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst

261: Sørby Ø - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Eldre hagemark som er iferd med å gro igjen. Spredt med eldre trær og mye yngre edelløv kommer opp under. Ale med eldre eik langs veg er inkludert i biotopen. Biotopen bør skjottes for å bevare og gjenskape biologiske verdiene. Gamle løvtrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Se også beskrivelse i Bratli (2003).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

262: Sørby N - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Rik edelløvsog med flere elementer som bl.a. en 80 cm eikegadd. Innslag av lind finnes. Stedvis er det noe yngre skog. Eik dominerer i tresjikt. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Se også beskrivelse i Bratli (2003).

Forslag til skjøtsel og hensyn:
Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

263: Flateby S - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *C* (verdi)

Noe fattigere eldre eikeskog på åkerholme uten innslag av blåveis. Noe død ved av bjørk og osp. Hassel, lønn og ask finnes i busksjikt. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Størrelse og generell utforming tilsier likevel bare lokal verdi (C verdi) for denne lokaliteten.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

264: Flateby V - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Eldre hagemark som er iferd med å gro igjen. Spredt med eldre eike trær og noe lind. Mye yngre edelløv kommer opp under med lønn og ask. Noe stående og liggende død ved av eik finnes. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing på sikt.

265: Sandaker N - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *C* (verdi)

15 grove eik med mye yngre lønn og ask under i busksjikt. Blåveis finnes. Eldre beite som krever skjøtsel. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Størrelse på lokaliteten og trærnes størrelse tilsier imidlertid kun lokal verdi i dag (2003).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing på sikt.

266: Nordre Sandaker - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Tidligere beite med gamle eik. Mye yngre edelløv og plantet gran i busksjikt. Noe gadd og læger finnes av eik og funn av rødlisteart knyttet til eik gjør biotopen spesiell. Viktige elementer og funn av rødlistet art tilsier verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing. Plantet gran i området bør ryddes vekk.

267: Grimsåsen - Skog - Gammel barskog, Furuskog *C* (verdi)

Kolle med gammel furuskog. Mye berg i dagen og blokkmark. Noen få læger og gadd av furu finnes. I sør ligger en trang dal med gran og innslag av lind og andre løvtrær, som gir biotopen noe variasjon. Målsetting er å restaurere gammel furuskog for å skape mer død ved og gamle trær på sikt. Denne kollen er plukket ut fordi den har noe eldre trær og noe mer død ved enn lignende furuskoger i kommunen, i tillegg til at den har innslag (C verdi) per 2003.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst

268: Hasla - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *B* (verdi)

Svartorsump langs bekk med noe gadd og læger av svartor, samt noe av gran. Noe edelløv i busksjikt. Markert søkk i terrenget gir et fuktig miljø. Funn av sårbar art på død ved av gran. Bekken markerer grensen til Frogn, biotopen strekker seg derfor noe inn i nabokommunen. Del av viktig villtområde for bl. a. spettefugl. En total vurdering av arter, skogstruktur og kontinuitet gir verdi som viktig (B verdi) til tross for funn av sårbar art.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst

269: Rosenhøy - Skog - Gammel barskog, Granskog *B* (verdi)

Flatt område med høyproduktiv granskog på fuktig mark, mye skogsnelle i feltsjikt. Noe svartor, samt en del selje osp og bjørk finnes. Noe død ved av selje, ellers jevnt mye død ved av gran. Eldre skog på fuktig høyproduktiv mark er sjeldent i landskapet. Biotopen har stort potensiale på sikt, men også idag store verdier med bl.a. funn av en sårbar soppart. Helheten gir lokaliteten verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst

270: Krystalldammen - Skog - Gammel lauvskog, Gammel bjørkesuksesjon *C* (verdi)

Løvskog rundt tjern, med mye svartor ellers dominerer bjørk og osp. Skogen er relativt ung og av små dimensjoner. Noe edelløvskog kommer opp i busksjikt. Lite død ved finnes. Løvskogen har potensiale på sikt, men dagens kvaliteter tilsier lokal verdi (C verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst, kan rydde ut gran for å bevare løvandel.

271: Hokholt - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Eldre hagemark med innslag av 5 grove eik og flere eldre furu. Stedvis suksessjon av osp og bjørk. En del lønn kommer opp i busksjikt. Mye blåveis finnes. Noe død ved av bjørk, osp og lønn. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

274: Ruin S - Skog - Rik sumpskog, Rik sumpskog *B* (verdi)

Sørvendt bekkesøkk med noe leire i bunn. Svartor og gran dominerer i tresjikt på fuktig mark i bunn. Noe mer edelløv på tørrere mark. Noe død ved av selje og gran finnes, samt noe av hassel. Noen eiker står spredt, der en er hul med rødmyld. Rike sumpskoger er sjeldne i landskapet, lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst

275: Berger - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Eikeskog med en del innslag av ask og hassel, trolig eldre beite. I noen fuktige søkk også svartor og gran. På de fattigste kollene noe furu. Mye blåveis i feltsjikt. Kun noe død ved finnes spredt. Viktig vilt og rekreasjonsområde. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

276: Berger N - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *C* (verdi)

Kantsone mellom dyrkamark og idrettsbane. En del eik på rundt 40 cm, samt en del yngre edelløv i busksjikt. Også noe furu og osp finnes. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis lokal verdi (C verdi) da trærne fortsatt er ganske unge i økologisk forstand.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

277: Bergerbanen - Skog - Rik edellauvskog, Lågurt-eikeskog *B* (verdi)

Parkaktig eikeskog med flere eldre eiker i sør, mindre dimensjoner av løv i nord. Mye blåveis samt små dimensjoner av lind og lønn. Noen læger av eik finnes. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

278: Haukemyr - Skog - Gammel barskog, Gammel granskog *B* (verdi)

Høybonitets granskog på fuktig mark og delvis rik tørr mark. Mange elementer samt mye død ved både stående og liggende, der mange læger har grove dimensjoner. Sjelden rik på død ved i fuktig rikt miljø, har stort potensiale for sjeldne arter. En rødlistet vedboende sopp ble registrert. Rikhet i vegetasjonstyper og i viktige elementer for en rekke arter tilsier verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Ikke hogst

280: Røertjernet - Ferskvann/våtmark - Dam, *B* (verdi)

Lokalitetskrivelse innlagt av Biofokus den 22.01.2008: Røertjernet er i Bratli (2003) ikke avgrenset som en selvstendig naturtypelokalitet, men inkludert i en større avgrensning av Røer landskapet. Tjernet med omkringliggende myr og vierkratt er nå skilt ut som en egen lokalitet. Tjernet er tidligere undersøkt for øyenstikkere (Olsvik et al. 1990), men kun vanlig blåvannymfe ble påvist i denne undersøkelsen. I 2006 og 2007 ble tjernet undersøkt for øyenstikkere på nytt og det ble da gjort funn av to rødlistede arter regnet som sårbar og direkte truet på rødlistet fra 2006. Den rødlistede arten punktviftefly (NT) er knyttet til myr og fuktig rundt vannet (artskart 2008). Dammen er kartfestet som et registrert viltområde med bl. a. hekking av stokkand (lokalitet 1021 i viltkartet). Vegetasjonen rundt dammen er delt i åpen myr, fuktenger og småvokst vierkrattskog. Dammen av denne typen med rik kantvegetasjon må generelt sies å være viktig for biologiske mangfold. Da det også er registrert at dammen har en viktig funksjon for flere truede arter gis lokaliteten verdi som svært viktig (A verdi). Det anbefales at lokaliteten undersøkes bedre for invertebrater da det er stort potensial for andre

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Skjøtsel bør vurderes dersom det er fuktenger innenfor lokaliteten som bør beites/slås.

281: Røer 3 - Kulturlandskap - Store gamle trær, Hult tre *A* (verdi)

Lokalitetskrivelse innlagt av Biofokus den 23.01.2008:

Lokaliteten har blitt kartlagt av flere personer over lang tid. Svært gammel og hult eiketre som ved veien inn til Røer gård i forkant av tunet. Det er usikkert hvorvidt treet er levested for arter som kun lever her og ikke i resten av eikeskogen som ligger i området. Gamle hule eiker er et svært viktig levested for truede insekter, lav og sopparter. Treet er meget gammel og flere truede arter er påvist i området, lokaliteten får derfor verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Treet må skjøttes med forsiktighet.

282: Søndre Solbergvei - Kulturlandskap - Hagemark, Eikehage *B (verdi)*

Lokalitetskrivelse innlagt av BioFokus den 23.01.2008:

Lokaliteten er registrert av Bård Bredesen i 2007 og består av en kulturlandskapsøy med store eiker som er aktivt skjøttet. Det finnes ett særlig grovt gammel eiketre som kalles "Staureika" i lokaliteten. Store gamle eiketrær er et svært viktig habitat for en rekke sjeldne og trua insekter, samt sopp og lavarter. Det er imidlertid ikke kjent noen spesielle arter fra lokaliteten per 2007. Verdien settes på denne bakgrunn til viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Området bør fortsettes og skjøttes for å ta vare på gammel eik og engvegetasjon. Det bør ikke gjødsles i lokaliteten.

283: Søndre Solbergvei sør - Kulturlandskap - Naturbeitemark, Frisk/tørr, middels baserik eng *B (verdi)*

Lokalitetskrivelse innlagt av BioFokus den 23.01.2008. Lokalitet registrert av Bård Bredesen i 2007. Mindre område med åpne engpartier hvor det bl. a. vokser maianøkleblom og knollmjørdurt. Trolig gammel beite eller slåttemark som nå har grodd noe igjen. Gamle enger med rikt planteliv av denne typen begynner å bli sjeldent i regionen, lokaliteten vurderes derfor til å være viktig (B verdi)

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Engarealene bør slås eller beites og ikke utsettes for gjødsling. Evt. krattskog bør fjernes.

284: Sørby - Kulturlandskap - Parklandskap, Allé *B (verdi)*

Lokalitetskrivelse innlagt av BioFokus den 23.01.2008:

Lokaliteten ble befart av Bård Bredesen i 2007. Gammel allé som er en av de eldste på Nesodden. Flere store og gamle trær av ulike edelløvtrær, samt bjørk. Det finnes bl. a. en stor gammal og hul lind hvor det har hekket kattugle. Gamle alleer er potensielt viktige for en rekke arter av insekter, sopp og lav. Da trærne begynner å bli ganske gamle settes verdien til viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Gamle trær som vurderes hogd bør kappes av høyt oppe på stammen for å bevare en høystubbe som er et svært viktig element for en rekke arter.

285: Sørby Ø II - Kulturlandskap - Hagemark, Askehage *(verdi)*

Lokalitetskrivelse innlagt av BioFokus den 23.01.2008:

Lokaliteten er kartlagt av Bård Bredesen i 2007 og ligger rett øst og sør for husene på Sørby gård. Havnehage med en del eldre trær og engvegetasjon med innslag av marianøkleblom. Kvalitetene er noe usikre og lokaliteten bør oppsøkes i felt for å kvalitets sikre arts mangfold, grenser og verdisetting. Lokaliteten gis verdi som lokalt viktig (verdi) per januar 2008.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Havnehagen bør skjøttes ved at store gamle trær fristilles og beskjæres dersom dette har vært praksis. Engvegetasjon bør slås eller beites.

1052: Odden - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig amfibielokalitet med funn av tre rødlistede amfibiearter. Funn av flere rødlistede amfibiearter gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1053: Lagveien - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede amfibier i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1054: Løkkeveien - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistede amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1055: Hellviktangen N - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistede amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1056: Ringveien - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1057: Ringveien S - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1058: Nesodden lettindustri - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede amfibiearter i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1059: Berger gård - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" og en i sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1060: Solberg gård vest - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede amfibiearter i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1061: Edv. Jacobsens vei - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede amfibiearter i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1062: Tangen terrasse 2 - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1063: Øvre Utsiktsvei 35 - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1064: Solnedgangen 24 - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1065: Skovrodammen - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1066: Skoklefeldtjernet - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet, eksisterende litteratur og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Flora og vegetasjon i lokaliteten er undersøkt av Flatby (1995). Vegetasjonen beskrives som forholdsvis variert. Barskog dominerer, men stedvis forekommer lømmer med svartorsumpskog og små skrenter med lind og hassel. Typisk er innslag av små eiketrær i den fattige furuskogen. Ellers finnes sumpvegetasjon. Det er registrert i underkant av 200 karplanter i området. Flere er varmekjære sørlige eller sørøstlige arter. Blant de mest interessante artene kan nevnes skavgras, slakkstarr, nattfiol, lakrismjelt, tysbast, klourt, kattehale, pors, skogbjørnebær, bekkeveronika og myske. De rødlistede soppartene skaffjordstjerne og styltejordstjerne er fra tidligere samlet ved Skoklefalltjernet, mest sannsynlig innenfor lokaliteten. Begge regnes som hensynskrevende.

Også fuglelivet er rikt (NOF 1995). Minst 53 arter er registrert, og av disse hekker minst 34. De mest spesielle artene oppgis å være gråhegre, sivhøne, sivpurv, toppand og toppmeis. Ellers er det høye tettheter av gjerdesmett, bøksanger og svartmeis.

Selve tjernet med omkringliggende myr- og sumpvegetasjon, sumpområdet i nordvest og vestre del av høydedraget nord for vannet har i følge Flatby (1995) størst botanisk verdi. De mer fattige typene på høydedraget øker imidlertid variasjonen og avgrenser landskapsrommet slik at tjernet blir en grønn lunge i et ellers påvirket landskap. Funn av fire ulike amfibiearter hvorav to er rødlistet gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Området er mye benyttet til friluftsliv og det er registrert en del slitasje på vegetasjonen.

1068: Illjernet N - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1069: Illjernet S - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1070: Sunnaas N - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede amfibiearter i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1071: Sunnaas S - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1073: Nyborgdam, store - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av tre rødlistede amfibiearter i rødlistekategori "nær truet" og sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1074: Karlstad - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede amfibiearter i rødlistekategori "nær truet" og sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1076: Sørby N - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet amfibieart i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1077: Sørby S - Ferskvann/våtmark - Dam, Gårdsdammer *B (verdi)*

Dette er en forholdsvis liten dam i hagen på gården Sørby. Bolghaug & Dolmen (1996) og Strand (1996) fant liten salamander og vanlig frosk i dammen. I følge Bolghaug & Dolmen (1996) virker invertebratlivet for øvrig ordinært og dammen er delvis gjengrodd med andmat. Sennegrass dominerer langs breddene. Lokaliteten gis verdi som viktig (B verdi) da det er funnet to rødlistearter i kategori "nær truet".

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1078: Rør 1 - Ferskvann/våtmark - Dam, Gårdsdammer *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede amfibiearter i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1079: Rør 2 - Ferskvann/våtmark - Dam, *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1080: Søndre Løes - Ferskvann/våtmark - Dam, *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1081: Holt - Ferskvann/våtmark - Dam, Gårdsdammer *A* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter hvorav en er rødlistet som sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1082: Bjerkerud - Ferskvann/våtmark - Dam, *A* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter hvorav en er rødlistet som sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1083: Rud syd - Ferskvann/våtmark - Dam, *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1084: Baldsrud - Ferskvann/våtmark - Dam, *A* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av tre rødlistede arter hvorav en er rødlistet som sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1085: Ugleveien 36 - Ferskvann/våtmark - Dam, *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1086: Naverud gård - Ferskvann/våtmark - Dam, **A (verdi)**

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter hvorav en er rødlistet som sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1087: Blylagsdammen S - Ferskvann/våtmark - Dam, **B (verdi)**

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006). Blylagsdammen ble undersøkt av Bolghaug & Dolmen (1996), som fant den nokså sjeldne arten stavtege på østsiden av dammen. Ellers finnes spissnutfrosk, som er regnet som sjelden på rødlista. Den rødlistede vårfluen *Agraylea sexmaculata* (R) er også funnet (Halvorsen pers. medd.). Lokaliteten gis verdi som viktig (B verdi) da det ikke er funnet rødlistearter i de høyeste kategoriene.

1088: Blylagsdammen N - Ferskvann/våtmark - Dam, **C (verdi)**

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Det er kun kjent padde og vanlig frosk fra dammen og den gis derfor lokal verdi (C verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

.

1089: Krystalldammen - Ferskvann/våtmark - Dam, **C (verdi)**

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Krystalldammen ble undersøkt av Bolghaug & Dolmen (1996), som fant den nokså sjeldne arten stavtege på østsiden av dammen. Vannkantvegetasjonen er relativt triviell, med arter som klourt, flikbrøndsle, vassgro, fredløs og elvesnelle. Dammen er omkranset av fattig barskog og noe svartorsumpskog, som er best utviklet på sør- og østsiden av dammen. Mot veien får vegetasjon mer ugraspreg, og i nord er det grøfter og tilplantinger med gran. Av arter kan nevnes korsved, firblad, blåveis og skogsalat. Det er ikke kjent rødlistede amfibier i dammen, den gis derfor verdi som lokalt viktig (C verdi) intill bedre dokumentasjon er fremlagt om andre forhold.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1090: Søndre Hasle - Ferskvann/våtmark - Dam, **B (verdi)**

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1091: Hasle NS - Ferskvann/våtmark - Dam, **B (verdi)**

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1092: Søndre Grøstad S - Ferskvann/våtmark - Dam, **B (verdi)**

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1093: Grøstad N - Ferskvann/våtmark - Dam, *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): I følge Strand (1996) er dette et skogstjern med forekomst av spiss-snudet frosk. Arten står oppført som sjelden i den nasjonale rødlista. I dammen finnes for øvrig mye myrkongle, gul nøkkerose og tjønnaks. Langs bredden finnes sumpvegetasjon og myr med blant annet flaskestarr, myrhatt, grøtesoleie, hesterumpe, bukkeblad, duskull, trådsiv, sumpmaure og gulldusk. Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter i rødlistekategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1094: Heimli - Ferskvann/våtmark - Dam, Gårdsdammer *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Lokalitet med liten salamander og padde gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1095: Høybråten vestre - Ferskvann/våtmark - Dam, *A* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter hvorav en er rødlistet som sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1097: Hellaveien 186 - Ferskvann/våtmark - Dam, *C* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Det er kun observert padde i dammen som får verdi som lokalt viktig (C verdi)

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1098: Nydammen - Ferskvann/våtmark - Dam, *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i rapport fra Strand (1996): Lokalitet med liten salamander tilsier verdi som viktig (B verdi). Vegetasjonen består av nokså fattig vann- og vannkantflora, bl.a. med lyssiv, mannasøtgras, myrmaure, fredløs, flaskestarr og bukkeblad (Bratli 2003).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1099: Dal - Ferskvann/våtmark - Dam, *B* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter, begge i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1100: Labråten - Ferskvann/våtmark - Dam, *A* (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter hvorav en er rødlistet som sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1101: Lille Nyborgdammen - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Meget viktig amfibielokalitet som inneholder alle de fem amfibieartene som finnes på Østlandet. Lokaliteten gis derfor verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1102: Granerud søndre - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1103: Granerud midtre øst - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødlistet art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1104: Granerud midtre syd - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Lokaliteten inneholder to rødlistede, hensynskrevende amfibier og dammen gis derfor verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1105: Klufta - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter, hvor stor salamander er rødlistet som direkte truet gir lokaliteten verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1106: Damengveien nord - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter, begge i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1107: Myklerud nordre - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1108: Ødegård - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter hvorav en er rødlistet som sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1109: Ugleveien 38 - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1110: Agnor nordre syd - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter, begge i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1111: Kjelleråssvingen vest - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1112: Agnor nordre nord - Ferskvann/våtmark - Dam, *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "sårbar" gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1113: Wistbakken 45 - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1114: Steiner skolen - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter, begge i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1115: Johnsrud beite - Ferskvann/våtmark - Dam, Gårdsdammer *A (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi). I Sandås (2006) er det angitt en annen lokalitet med samme koordinater som er en lite dam på 1 kvadratmeter med navn Jonsrud hage (lille). I denne dammen er det angitt liten salamander, spissnutet frosk og vanlig frosk. På grunn av usikker avgrensning er ikke denne dammen angitt med egen lokalitet. Det er usikkerhet knyttet til verdi og artsforekomster i denne dammen.

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1116: Løeshagaveien - Ferskvann/våtmark - Dam, *B (verdi)*

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1117: Sletta Ø - Ferskvann/våtmark - Dam, B (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1118: Skoklefeld V - Ferskvann/våtmark - Dam, B (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter, begge i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1119: Teigen nordre rensedam - Ferskvann/våtmark - Dam, B (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av en rødliste art i kategori "nær truet" gir verdi som viktig (B verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1120: Lønnås - Ferskvann/våtmark - Dam, A (verdi)

Lokalitetsbeskrivelse innlagt og oppdatert av BioFokus i desember 2006 på bakgrunn av registreringer i vilkartet og i oppdatert liste fra Sandås (Sandås 2006): Viktig viltlokalitet for amfibier. Funn av to rødlistede arter hvorav en er rødlistet som sårbar gir verdi som svært viktig (A verdi).

Forslag til skjøtsel og hensyn:

Det bør på sikt vurderes om dammen trenger skjøtsel i form av oppgraving, sikring av kantsoner og evt. led til andre dammer i nærheten.

1121: Naverud - Ferskvann/våtmark - Dam, Eldre fisketomme dammer B (verdi)

Dam som inneholder liten salamander. Ytterligere opplysninger er ikke kjent. Rødlistet art i kategori NT tilsier verdi som viktig (B verdi).

1122: Fjellstrand - Glanern - Ferskvann/våtmark - Dam, Eldre fisketomme dammer B (verdi)

Skogsam registrert av Kjell Sandås i 2004. Det er registrert liten salamander i dammen. Liten salamander er ført opp som "nær truet" på rødlista og lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Det er ikke kjent om dammen har spesielle kvaliteter ut over å være habitat for amfibier.

1123: Hellaveien 91 - Ferskvann/våtmark - Dam, Gårdsdammer B (verdi)

Hagedam registrert av Kjell Sandås i 2004. Det er registrert liten salamander og spissutet frosk i dammen. Begge artene er ført opp som "nær truet" på rødlista og lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Det er ikke kjent om dammen har spesielle kvaliteter ut over å være habitat for amfibier.

1124: Nylenna - Ferskvann/våtmark - Dam, Eldre fisketomme dammer B (verdi)

Skogsam registrert av Kjell Sandås i 2004. Det er registrert liten salamander i dammen. Liten salamander er ført opp som "nær truet" på rødlista og lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Det er ikke kjent om dammen har spesielle kvaliteter ut over å være habitat for amfibier.

1125: Myklerudbanen - Ferskvann/våtmark - Dam, B (verdi)

Åkerdam nord for idrettsbane registrert av Kjell Sandås i 2004. Det er registrert liten salamander i dammen. Liten salamander er ført opp som "nær truet" på rødlista og lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Det er karuss i dammen (Sandås 2006).

1126: Nydammen N - Ferskvann/våtmark - Dam, Gårdsdammer B (verdi)

Skogsdam registrert av Kjell Sandås i 2004. Det er registrert liten salamander og spissutet frosk i dammen. Begge artene er ført opp som "nær truet" på rødlista og lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Det er ikke kjent om dammen har spesielle kvaliteter ut over å være habitat for amfibier.

1127: Åslund NV - Ferskvann/våtmark - Dam, Gårdsdammer A (verdi)

Skogsdam registrert av Kjell Sandås i 2006. Det er registrert liten- og stor salamander, spissutet frosk og vanlig frosk i dammen. Stor salamander er ført opp på rødlista som sårbar. Lokaliteten gis derfor verdi som svært viktig (A verdi). Det er ikke kjent om dammen har spesielle kvaliteter ut over å være habitat for amfibier.

3 Diskusjon

3.1 Problemer knyttet til oppdatering i 2006

I forbindelse med oppdateringen av naturtypekartet i Nesodden kommune i 2006 ble tidligere registrerte naturtypeobjekter utelatt. Dette har skjedd fordi det opprinnelige datasettet hadde en del grove avgrensninger og fordi de siste registreringen kun omfattet skog og ikke kulturlandskapsobjekter. I etterkant ser det ut til at komplekse områder med mange ulike naturtyper burde blitt behandlet annerledes. Det optimale ville vært å foreta en ny registrering av kulturlandskapsobjekter i disse områdene.

BioFokus har høsten 2007 fått inn flere punktfestede lokaliteter som det er enkelt å legge inn i basen og på kart. Innleggelse av disse områdene vil bli gjort i januar 2008 og oppdatert kart oversendes til Direktoratet for innleggelse i naturbase.

3.2 Vilt og nasjonalt viktige kulturlandskap

I naturbase (www.naturbase.no) inkluderer viltavgrensningen og avgrensningen av nasjonalt viktige kulturlandskap alt viktig areal i området Røer/Solberg/Sørby. Disse sammensatte og meget viktige områdene må derfor sees på som en større helhet selv om det foreligger en rekke ulike naturtypelokaliteter med ulike kvaliteter og verdi.


3.3 Videre oppdatering

Det er blitt lagt ut en del nye artsfunn som kan knyttes til flere lokaliteter i web portalen: Artskart (www.artsdatabanken.no). Det bør gjøres en jobb for å integrere disse nye dataene i kommunens naturdatabase.

Det er på det rene at det enda finnes områder i kommunen som ikke er godt nok kartlagt. Dette gjelder en del dammer, kystsonen og småbiotoper i byggesonen.

Referanser

- Bratli, H. 2003. Biologisk mangfold i Nesodden kommune. NIJOS rapport 03/2003, s.80.
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Rapport_03_03.pdf
- Heggland, A., Abel, K. og Reiso, S. 2004. Viltkartlegging i Nesodden, Frogn og Ås kommuner. Siste Sjanse-notat 2004-6, s.11.
http://biolitt.biofokus.no/rapporter/sistesjansenotat_2004-6.pdf



BioFokus er en ideell stiftelse som skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. BioFokus ønsker å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

En kunnskapsbasert forvaltning forutsetter god dokumentasjon av de arealene som skal forvaltes. BioFokus legger derfor stor vekt på feltarbeid for å sikre oppdaterte og relevante data om botanikk, zoologi, økologi, samt avgrensning og verdisetting av områder.

Høy kompetanse er en forutsetning for å kunne registrere og presentere biologisk mangfold-data på en god måte. BioFokus sine medarbeidere er derfor godt skolert innenfor en rekke artsgrupper og har en bred økologisk forståelse for de ulike naturtypene som de arbeider med, det være seg skog, kulturlandskap eller ferskvann. Digitale verktøy som databaser, GIS og bilde-behandling er viktige redskaper i vårt arbeid for å anskueliggjøre naturverdier på en best mulig måte.

Stiftelse utgir en digital rapportserie som heter BioFokus-rapport, <http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>