

Supplerende kartlegging av naturtyper i Nesodden kommune 2009

Ole Lønnve og Terje Blindheim



Ekstrakt

BioFokus har på oppdrag av Nesodden kommune kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 i Nesodden kommune. Det er totalt kartlagt 22 nye naturtypelokaliteter, samt at fem tidligere registrerte lokaliteter har blitt oppdatert. I tillegg er basen oppdatert med info på lokaliteter ved Bergerskogen som er dokumentert i egen rapport. Data er overlevert på Natur2000 format og det er laget sosifiler for kartavgrensningene.

Nøkkelord

Naturtypekartlegging
Nesodden
Akershus
Bergerskogen
Skoklefall

Omslag

FORSIDEBILDER
Øvre: Svovelkjuke på eik
Midtre: Gammel skog
Nedre: Dam ved Tangen
Alle bilder Ole J. Lønnve

LAYOUT

Blindheim Grafisk

ISSN: 1504-6370

ISBN: 978-82-8209-099-5

BioFokus-rapport 2010-3

Tittel

Supplerende kartlegging av naturtyper i Nesodden kommune 2009

Forfatter(e)

Ole J. Lønnve og Terje Blindheim

Dato

20. januar 2010

Antall sider

64 sider inkl. vedlegg

Publiseringstype

Digitalt dokument (Pdf). Som digitalt dokument inneholder denne rapporten "levende" linker.

Oppdragsgiver

Nesodden kommune/Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Tilgjengelighet

Dokumentet er offentlig tilgjengelig.

Andre BioFokus rapporter kan lastes ned fra:

<http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>

BioFokus: Gaustadallèen 21, 0349 OSLO

Telefon 2295 8598

E-post: post@biofokus.no Web: www.biofokus.no

Sammenstilling av prosjektet

BioFokus har på oppdrag av Nesodden kommune v/ Ellen Lien foretatt en supplerende kartlegging av naturtyper i Nesodden kommune. Inkludert i dette arbeidet har det blitt foretatt registreringer ved Skoklefall hvor kommunen hadde særlige behov for naturinformasjon i forbindelse med planlagt bebyggelse. Vi har også behandlet lokalitetene fra Bergerskogen (Røsok 2009) som ikke tidligere lå inne i kommunens naturbase (Natur2000) og gjort noen forandringer på avgrensninger av lokaliteter som hadde en unøyaktig avgrensning.

Bakgrunnen for utvalget av lokaliteter ligger i notat fra Nesodden kommune hvor totalt 46 lokaliteter var merket av for ønsket kartlegging. Lokalitetene var prioritert og vi har i vårt arbeid fulgt denne prioriteringen. Siste kolonne i tabell 1 henviser til nummer i prioriteringslisten. I kommentarfeltet i tabell 1 er opphavet til lokaliteten presisert.

Alle data er lagt inn i kommunens naturbase (Natur2000). Eksportfiler fra totalt 31 lokaliteter er en del av leveransen i dette prosjektet. I tillegg er alle lokaliteter digitalisert og det er produsert en sosifil for alle nye og endrede kartavgrensninger. Denne rapporten inneholder en enkel oversikt over registrerte naturtyper, samt faktaarkene fra alle lokaliteter som er nykartlagt eller hvor beskrivelser er oppdatert. Se Røsok (2009) for en oversikt over lokalitetsbeskrivelser fra Bergerskogen.

Følgende lokaliteter har skiftet nummer:

- Lokalitet 280 Røertjern → 126 Røertjern

De 32 andre behandlede lokalitetene som det er oversendt database og kart for er enten ikke tidligere lagt inn i kommunens database eller har fått ny beskrivelse, ny kartavgrensning eller begge deler.

Kartleggingen er gjort etter instruks i DN håndbok 13 versjon 2007 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007).

Tabell 1: Viser oversikt over lokaliteter som har blitt behandlet i dette prosjektet. I kolonnen kommentar betyr "NY" at lokaliteten ikke har stått på kommunens prioriteringsliste, men en lokalitet vi er kommet over under kartlegging av de andre områdene. Siste kolonne henviser til nummereringen i kommunens prioriteringsliste.

Nr	Lokalitet	Hovednaturtype	Naturtype	ID	Utforming	ID	VERDI	Kommentar	Pri nr.
108	Bergtunveien	Skog	Rik edellausskog	F01	Or-askekog	F0107	B	Fra Bergerskograpp	
109	Bergtunveien S	Skog	Rik blandingskog i lavlandet	F13	Boreonemoral blandingskog	F1301	B	Fra Bergerskograpp	
110	Nesodden lettindustri	Ferskvann/våtmark	Dam	E09	Gårdsdam	E0901	B	Fra Bergerskograpp	
111	Nesodden videregående skole	Skog	Rik edellausskog	F01	Lågurt-eikeskog	F0101	C	Fra Bergerskograpp	
112	Hellvikveien	Kulturlandskap	Store gamle trær	D12	Gammelt tre	D1204	C	Fra Bergerskograpp	
113	Nesoddtangen vest	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	G09	Sørlig	G0901	C	Fra pri. liste	42
114	Nesoddtangen gård	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	G09	Sørlig	G0901	B	Fra pri. liste	40
115	Tangenlaget	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	G09	Sørlig	G0901	C	Fra pri. liste	39
116	Lagveien	Skog	Rik sumpskog	F06	Rik sumpskog	F0601	B	NY	
117	Nesoddtangen sør-vest	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	G09	Sørlig	G0901	C	NY	
118	Skoklefall gård	Kulturlandskap	Store gamle trær	D12	Gammelt tre	D1204	A	Fra pri. liste	30
119	Skoklefall ridesenter	Kulturlandskap	Store gamle trær	D12	Gammelt tre	D1204	A	Fra pri. liste	29
120	Skoklefallåsen	Skog	Rik edellausskog	F01	Lågurt-eikeskog	F0101	B	Skoklefall	
121	Nesodden Steinerskole	Skog	Rik sumpskog	F06	Rik sumpskog	F0601	A	Skoklefall	32
122	Ursvik	Skog	Rik sumpskog	F06	Rik sumpskog	F0601	B	NY	

Nr	Lokalitet	Hovednaturtype	Naturtype	ID	Utforming	ID	VERDI	Kommentar	Pri nr.
123	Hellvikalleen	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	G09	Sørlig	G0901	B	Fra pri. liste	34
124	Sefjell	Skog	Rik edellaav-skog	F01	Alm-lindeskog	F0105	C	Fra pri. liste	33
125	Berger vest	Skog	Rik edellaav-skog	F01	Lågurt-eikeskog	F0101	B	Fra pri. liste	28
126	Røertjern	Ferskvann/våtmark	Rik kultur-landskapssjø	E08	Næringsrik utforming	E0801	A	Oppdatert beskrivelse	5
127	Løes	Skog	Rik blandings-skog i lavlandet	F13	Boreonemoral blandingsskog	F1301	B	Fra pri. liste	2,3
128	Løes østre, øst	Kulturlandskap	Store gamle trær	D12	Gammelt tre	D1204	C	NY	
129	Løes østre, sør	Kulturlandskap	Store gamle trær	D12	Gammelt tre	D1204	C	NY	
130	Røer, åkerholme nord	Skog	Rik edellaav-skog	F01	Lågurt-eikeskog	F0101	B	NY	6
131	Røer, åkerholme sør	Skog	Rik edellaav-skog	F01	Lågurt-eikeskog	F0101	B	NY	6
132	Røer skogen, øst	Skog	Rik edellaav-skog	F01	Lågurt-eikeskog	F0101	B	NY	6
133	Sørby	Kulturlandskap	Store gamle trær	D12	Gammelt tre	D1204	B	Oppdatert beskrivelse	10
134	Torrvik	Kyst og havstrand	Rikt strandberg	G09	Sørlig	G0901	B	NY	
135	Nesoddtangen gård, dam	Ferskvann/våtmark	Dam	E09	Gårdsdam	E0901	A	NY	
136	Røerbekken	Ferskvann/våtmark	Viktig bekke-drag	E06	Parti som binder sammen andre naturmiljøer	E0603	B	Fra pri. liste	4
276	Bergerbanen							Kun kartjusteringer	
260	Sørby skogen							Kun kartjusteringer	
								Ingen avgrensning	41
274	Ruin S	Skog	Rik blandings-skog i lavlandet	F13	Boreonemoral blandingsskog	F1301	B	Fra Berger-skograpport	
275	Berger	Skog	Rik edelløv-skog	F01	Lågurt eikeskog	F0101	B	Fra Berger-skograpport	

Litteratur

Direktoratet for Naturforvaltning. 2007. Kartlegging av naturtyper - verdisetting biologisk mangfold, rev. utg. DN-håndbok 13. <http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500031188&language=0>

Røsok, Ø. 2009. Biologiske registreringer og konsekvens-vurderinger i forbindelse med reguleringsplaner ved Bergerskogen, Nesodden kommune. BioFokus-rapport 2009-21, s.28. <http://biolitt.biofokus.no/rapporter/biofokus-rapport/biofokusrapport2009-21.pdf>

Foto: Ole J. Lønnve. Kanten av lokaliteten på nedsiden av Nesoddtangen gård.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rikt strandberg
Utforming: Sørlig
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord-øst for Nesoddtangen gård.

Naturgrunnlag: Bergrunnen består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Løsmassene består av bart fjell, stedvis med tynt løsmassedekke.

Naturtyper og utforminger: Majoriteten av lokaliteten sorterer under naturtypen rikt strandberg med sørlig utforming.

Lokaliteten består av et relativt stort strandområde med en del mindre bergrygger som strekker på langsseg gjennom området. Mange steder er det rike plantesamfunn og lokaliteten må kunne sies å være ganske heterogen med flere vegetasjonstyper representert. Deler av lokaliteten er tydelig påvirket av gjess og andre sjøfugler, og enkelte steder er det noe slitasje og skrot fra folk som benytter området til solbading. Lokaliteten er rik på karplanter. I kanten av området var det et vist innslag av edelløvskog med en del ask.

Artsmangfold: Lokaliteten har en rik flora. Følgende arter ble påvist under registreringen: smalkjempe, gulaks, nyresildre, kantkonvall, knollmjødurt, tveskjeggveronika, sisselrot, hundekjeks, tiriltunge, strandløk, strandnellik, blåkløkke, engtjæreblom, strandvortemelk, vendelrot, gåsemure, smaltimotei, hvitmaure, bleikstarr, tepperot, kornstarr, slåttstarr, røsslyng, lintorskemunn, stemorsblomst, småsyre, markmalurt, gulmaure, engsmelle, smørbukk, jordbær, mjødurt, fuglevikke, engsolleie, åkervindel, buerort, engsyre, engfiol, dunkjempe, nyresildre, prikkperikum, skogkløver, fagerkløkke, stankstorkenebb, saltsiv, strandkryp, rødsvingel, strandkvann, strandkjempe, kvitbergknapp, ask, rose, furu, rogn, svartor, rognasal, kirsebær.,

Trusler: Fremmede arter og til en viss grad slitasje fra folk som ferdes her.

Fremmede arter: berberis, gravbergknapp, syrin, skvalderkål, rynkerose

Verdivurdering

Lokaliteten er ganske stor, og flere vegetasjonstyper er representert. Ingen rødlistefunn ble gjort, men det er sannsynlig at det finnes forekomster av rødlistearter her, særlig insekter. Diversiteten av karplanter er forholdsvis stor. På bakgrunn av dette gis lokaliteten regional verdi (B verdi).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Oppslag av ask kan med fordel ryddes/tynnes. Fjerning av søppel og annet skrot.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Lokaliteten preges dels av svært skrint jordsmonn, og over store



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rikt strandberg
Utforming: Sørlig
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på østsiden av Nesoddtangen, noen hundrede meter sør fra Tangen brygge.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten sorterer under naturtypen rikt strandberg. Utformingen er sørlig. Lokaliteten består av tildels skrinne bergrygger med betydlige partier bart fjell og vegetasjonsdekket er dermed sparsomt mange steder. Området brukes en del til rekreasjon med

soling og bading om sommeren. Flere gamle badehus ligger langs stranda. I tillegg går det en merket sti (Kyststien) ned til lokaliteten. Spredt ligger noe skrot og det er dumpet noe hageavfall i kantene. Flere fremmedarter og hageflykninger forekommer på og langs lokaliteten. En liten bekk drenerer ut i en liten vik. Langs denne vokser noe svartor. En hage grenser ned mot lokaliteten i vest.

Artsmangfold: Ingen rødlistearter ble funnet. Blodstorkenebb forekommer sparsomt i kanten langs stien ned mot stranda. Ellers ble følgende karplanter registrert under befaringen: Åkergull, smørbukk, bitterbergknapp, hvitbergknapp, strandløk, småsyre, stankstorkenebb, engtjæreblom, smalkjempe, strandkjempe, fuglevikke, strandvortemelk, gåsemure, mjødurt, knollmjødurt, tiriltunge, rose sp., sissilrot, hvitkløver, liljekonvall, kantkonvall, jordbær, lintorskemunn, tveskjeggveronika og skogburkne. Noe trær finnes også her og der, spesielt et parti midtsentrert på lokaliteten. Følgende treslag ble registrert: spisslønn, osp, furu, rogn, kirsebær, svartor, ask, bjørk, hegg, rognasal og *Salix* sp.

Trusler: Tråkk og slitasje fra folk er nok den største trusselen. I tillegg er spredning av fremmede planter og hageflykninger et problem.

Fremmede arter: Rødhyll, rynkerose, syrin, berberis, gravbergknapp og blankmispel.

Verdivurdering

Lokaliteten har en forholdsvis rik flora, selv om vegeasjonsdekket er tildels svært sparsomt. Potesial for insekter, særlig mikrosommerfugler knyttet til denne type vegetasjon er absolutt til stede, men er ikke påvist. Lokaliteten er forholdsvis stor, men med mindre variert flora enn tilliggende lokaliteter, samt en del påvirkning gir vurderes verdien og være lokal (C verdi).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Fjerning av fremmede arter som rynkerose og syrin bør gjøres før disse sprer seg for mye.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Fra svartorsump ved Lagveien.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik sumpskog
Utforming: Rik sumpskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger i et lite skogparti mellom Tangenveien (RV 156) og Lagveien noen hundrede meter fra Tangen brygge på Nesoddens østside.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten består av et lite parti med rik sumpskog langs en liten bekk. Svartora er i størrelsesintervallet 20-40 cm dbh. I tillegg finnes enkelte forholdsvis grove grantrær på lokaliteten med en dbh på ca 50 cm. Av andre treslag forekommer rogn, ask, kirsebær,

spisslønn, bjørk, hegg, trollhegg og tyspast. I tillegg finnes noe lind i kantene. Skogen er relativt mørk, og lite lys slipper til på skogbunnen. Vegetasjonstypen kan karakteriseres som blanding av sumpskogvegetasjon, lågurt og litt fattigere partier med blåbærskog. Fredløs, skogsnelle, enghumleblom samt blåbær ble registrert. Partier har høy dekning av moser. Det finnes noe død ved på lokaliteten, vesentlig i form av læger, men kontinuiteten er lav. I kanten mot Lagveien er det dumpet noe hageavfall.

Trusler: Hugst og utbygging

Verdivurdering

Vegetasjonstypen rik sumpskog er sterkt truet (EN). I føkke DN-håndbok 13 skal alle forekomster av denne typen vurderes som svært viktige. Men vurdert ut fra svært liten størrelse, lav kontinuitet og begrenset artsinventar, vurderes lokaliteten som regionalt viktig (B verdi).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Hageavfall bør ikke dumpes her. Skogen bør få utvikle seg fritt og det bør ikke gjøres inngrep i eller i nærheten som kan føre til drennering og senkning av grunnvannsspeilet.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Oversikt over Nesoddtangen sør-vest..



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rikt strandberg
Utforming: Sørlig
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligg litt sør-vest for Tangen brygge på nordspissen av Nesodden.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten består av rikt strandbærg med ganske godt utviklet urtevegetasjon. Svært skrinne partier med bart fjell finnes også.

Artsmangfold: På lokaliteten finnes forholdsvis mye blodstorkenebb. Ellers forekommer

Lok. nr. 117 Nesoddtangen sør-vest forts.

engtjereblom, markmalurt, strandløk, bitterbergknapp, høyaks, knollmjødurt, nyresildre, veronika sp. og natt og dag fiol.

Trusler: Tråkk og slitasje.

Fremmede arter: Gravbergknapp.

Verdivurdering

Lokaliteten er forholdsvis liten, men med ganske godt utviklet karplanteflora typisk for strandberg i indre Oslofjord. Den har et potensial for en rekke insketer knyttet til denne type habitater. Mangel på interessante funn samt lokalitetens størrelse gjør at den bare blir vurdert til lokalt viktig naturtype (C).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Unngå for mye tråkk og slitasje på vegetasjonen.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Stor eik ved Skoklefall gård.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Gammelt tre
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger i utkanten av hagen til Skoklefall gård nord på Nesodden.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten utgjøres av en stor sommereik med en dbh på ca 120 cm. Treet står ikke fritt, det kommer opp mye annen vegetasjon rundt i form av mye krattskog av ask, kirsebær, spisslønn, alm (NT) og osp. Feltsjiktet består av lågurtvegetasjon med liljekonvall, noe kantkonvall, hvitveis, stankstorkenebb, kratthumleblom og rose sp. I tillegg vokser det syrin her. Treet kan ha begynnende hulhet.

Trusler: Hugst av tre.

Verdivurdering

Gamle og hule eiketrær er det enkelthabitat som huser flest sjeldne og trua arter i Norge. De er særlig viktige for insekter, men en rekke lav, sopp og moser finner også sitt levested på slike trær. På denne bakgrunn og treets forholdsvis store størrelse vurderes denne lokaliteten som svært viktig (A verdi).

Artsliste for lokaliteten

Totalt 1 art(er) påvist: Alm (NT).

Skjøtsel og hensyn

Det bør ryddes rundt og under treets krone slik at ingen trær eller busker vokser opp i kronedekket. Eika selv og artene knyttet til det er avhengig av lys og varme. Det bør etableres eng rundt treet som slås regelmessig.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Stor eik ved Skoklefall ridesenter.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Gammelt tre
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger i skogkanten ved ridesenteret på Skoklefall gård nord på Nesodden, og er godt synelig fra RV 156.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten utgjøres av en stor sommerek med en dbh på ca 100 cm. Treet står fritt, og det er relativt nylig (2-3 år siden) ryddet rundt den i forbindelse med bygging av et ride/hestesenter. Arealet rundt bærer defor preg av dette og noe kan kalles for ruderatmark hvor det har vært fylt masse/gravd. På nedsiden av treet renner en liten bekk. Ellers preges arealet av lågurtvegetasjon med liljekonvall, hvitveis og knollerteknapp. Treet har trolig en begynnende hulhet.

Trusler: Hugst og skading av treet.

Verdivurdering

Gamle og hule eiketrær er det enkelthabitat som huser flest sjeldne og trua arter i Norge. De er særlig viktige for insekter, men en rekke lav, sopp og moser finner også sitt levested på slike trær. På denne bakgrunn og treets forholdsvis store størrelse vurderes denne lokaliteten som svært viktig (A verdi).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Holde vegetasjonen rundt treet relativt åpen, slik at treet blir stående eksponert til. Det bør ikke vokse trær og busker under krona til treet.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Lokaliteten består av lågurtskog med mange eiketrær på opp mot



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik edellauvskog

Utforming: Lågurt-eikeskog

Mosaikk:

Feltsjekk: 27.05.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger litt øst for Skoklefall gård nord på Nesodden. Middels rike berggrunn- og løsmasseforhold. Nesodden befinner seg i sin helhet i borenemooral vegetasjonssone og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon. Lokaliteten utgjøres av en vestvendt sone langs en plen/gressslette på vestsiden og avgrenses mot mer karrige furudominert blåbærskog i øst.

Naturtyper og utforminger: Tresjiktet preges av mye eik med dbh opp mot 50 cm, men flesteparten av trærne ligger i intervallet 20-40 cm. Feltsjikteter utgjøres av rik lågurtvegetasjon. Noen steder kommer det opp en del ask, spisslønn og osp. Lokaliteten er ellers preget av noe ferdsl (det går en sti inne i skogen) samt at det har blitt utført noe trefelling her. Mengden død ved er lav.

Artsmangfold: Følgende karplanter ble registrert: Rose sp., liljekonvall, kantkonvall, knollerte knapp, jordbær, teiebær, smørbukk, engtjæreblom, firkantperikum, hengeaks, lunnrapp, snerperørkvein, engknoppurt, engsolleie, engfrytle, gulaks, hvitmaure, gulmaure, bleikstarr, hundegras, kratthumleblom, skjermesveve, timotei, ryllik, hvitkløver, balderbrå, lintorskemunn, gjeldkarve, stormarimjelle og tiriltunge. Av trær forekommer foruten eik, furu, einer, asal sp., spisslønn, ask, osp, kirsebær og eple. Det ble under befaringen også samlet inn noen insekter, og enkelte interessante funn ble gjort: Snutebilleren *Tychius quinquepunctatus*, som er en art knyttet til erte knapp på varme og rike lokaliteter, og bladvepsen *Profenusa pygmaea*, som minerer bladene på eik, og er i nyere tid kun kjent fra en håndfull lokaliteter fra Oslo til Kristiansand.

Trusler: Ubygging. Det er planlagt utbygging av Skoklefallåsen. Dette kan få konsekvenser for denne lokaliteten selv om det planlagte utbyggingsarealet ligger rett utenfor avgrensingen til lokaliteten. Deponering av masse og anleggstrafikk under byggeprosessen kan berøre lokaliteten på en uheldig måte. Videre kan man tenke seg at de største trærne på lokaliteten kan komme til å skygge for sola når det hele er ferdig, og at man derfor vil fjerne dem.

Fremmede arter: Kaprifol, mispel sp.

Verdivurdering

Lokaliteten har et bra artsinventar og enkelte av funnene indikerer at den kan ha interessante kvaliteter. Dessuten er lokaliteten vestvendt. En bedre insektinventering burde vært utført. Vegetasjonstypen lavurt-eikeskog har truetetskategori "noe truet" (VU). I følge DN-håndbok nr. 13 er alle forekomster av rik edelløvskog viktige. På bakgrunn av dette vurderes derfor denne lokaliteten til viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten


Skjøtsel og hensyn

Det bør tas hensyn til denne lokaliteten ved utbygging av Skoklefallåsen. Soleksponerte Lågurt-eikeskoger i tilknytning til åpne flater som denne er svært viktige for biologisk mangfold. Eiketrærne vil få en fin utvikling over tid hvis de får stå urørt. Tørre greiner og trær bør ikke fjernes. Det kan være en fordel at oppslag av særlig ask holdes nede slik at disse ikke etterhvert skygger ut annen vegetasjon. Det kan med fordel drives slått i engpartiene mellom skogen og sletta.

Litteratur

Direktoratet for naturforvaltning, 2006. Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13. 2. edition. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.

Foto: Ole J. Lønnve. Parti fra lokaliteten



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik sumpskog
Utforming: Rik sumpskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs bekken som drenere ut av Skoklefalltjern langs nedsiden av Steinerskolen.

Naturgrunnlag: Bergrunnen består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt samt diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. I selve sumpskogen er det tykkere næringsrike løsmasser. Nesodden befinner seg i sin helhet i borenemooral vegetasjonssone og svakt oseenisk

vegetasjonsseksjon.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten omfatter arealer i tilknytning til bekken ut fra Skoklefalltjern. Denne bekken renner dels nede i en liten kløft, slik at deler av lokaliteten er ganske mørk. Mye svartor med diameter opp mot ca 40 dbh dominerer lokaliteten. Flere av trærne står på karakteristiske "sokler". Siden bekken kommer fra et tjern, er den nok ikke veldig flomutsatt, men ved mye nedbør over en tid kan det nok allikevel være forholdsvis mye vann her. Vegetasjonstypen består av rik sumpskog. Denne vegetasjonstypen er sterkt truet (EN). Utformingen er ganske god, og arealet er forholdsvis stort. Det finnes en del død ved i partier av både gran og løv, kontinuiteten er middels til god. Omtrent midtveis i lokaliteten er det forholdsvis godt utviklede partier med strutseving. Lokaliteten bærer noe preg av anleggsarbeidet fra den gangen Steinerskolen ble bygd, bl.a. ved at noe masse er fylt ned mot bekken enkelte steder. I tillegg er det gjort inngrep fra private hageeiere samt slengt noe hageavfall enkelte steder. I den øverste delen av lokaliteten kan det virke som om det en gang har vært utført inngrep i bekken. Noe søppel og skrot finnes spredt. Både småsalamander (NT) og spissnutfrosk (NT) er observert i området rundt Steinerskolen (Artskart, 2009). En veg deler lokaliteten i to.

Artsmangfold: Følgende karplanter ble påvist: langstarr, skogsivaks, sumphaukeskjegg, bekkeblom, bekkeveronika, vendelrot, mjødurt, sølvbunke, sølvbunke, skogburkne, krossved, rips, skogstjerneblom, hassel, bekkekarse, krusfingerrose, fingerstarr, slyngsøtvier, mjødurt, rips, skogørkvein, kruskjønnaks og strutseving. Av trær ble foruten svartor, gran, bjørk, eik, rogn og alm (NT) registrert. Det ble også inventert litt etter insekter her 29. mai, og bladvepsen *Fenusa dohrnii* ble funnet på svartor. Denne arten ble nylig publisert ny for Norge (Lønnve, 2009), og funnet fra denne lokaliteten er således det tredje registrerte funnet fra Norge.

Trusler: Lokaliteten kan bli berørt av utbygging av Skoklefallåsen i nedkant. Det er i de nederste/midterste partiene av lokaliteten vi finner de beste partiene med bl.a. rikt utviklede strutsevingforekomster. Anleggsarbeid i denne delen vil være svært uheldig.

Spredning av fremmede arter grunnet dumping av hageavfall kan være et problem.

Fremmede arter: Rødhyll. Mye iberiaskogssnegl har blitt observert på lokaliteten tidligere (O. Lønnve).

Verdivurdering

Rik sumpskog er en sterkt truet naturtype i Norge. Denne lokaliteten er relativt stor med god utforming, og potensialet for rødlistearter bør være bra. Området er sannsynligvis viktig også for amfibier. På bakgrunn av dette gis denne lokaliteten verdi som svært viktig naturtype (A).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Det er viktig at det ved utbygging av Skoklefallåsen tas hensyn til denne lokaliteten. Det bør arbeides for at ikke hageavfall tippes i lokaliteten. Ellers bør lokaliteten få utvikle seg fritt.

Litteratur

Lønnve, O. J. 2009. Notes on Norwegian sawflies (Hymenoptera, Symphyta) II. 13 species new to the Norwegian fauna. Norwegian Journal of Entomology 56, 50-56.

Foto: Ole J. Lønnve Oversikt over lokalitetens sørende.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik sumpskog
Utforming: Rik sumpskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 08.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger ned mot sjøen på Nesoddens østside mellom Ursvik og Oksvall. Det går en tursti gjennom området, og det er bebyggelse på begge sider.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten består av et parti med dels rik sumskog i tilknytning til en liten bekk/fuktdrag. I tillegg finnes partier som mer sorterer under naturtypen edelløvsog. Dimensjonene på svartora er opp mot 40 cm dbh. I tillegg til svartor er en rekke trær representert

på lokaliteten, og treslagvariasjonen er derfor stor, men få trær er særlig store. Mengden død ved karakteriseres som lav, og noen trær er hugd nylig. En forekomst av ramsløk finnes i tilknytning til bekk/fuktdrag.

Artsmangfold: Følgende trær er registrert under befaringen: Svartor, rogn, osp, spisslønn, bjørk, eik, selje, alm (NT), ask, gran, kirsebær, hagetorn, trollhegg, hegg og hassel. Andre karplanter: Bjørnebær sp., bringebær, kratthumleblom, enghumleblom, einstape, skogburkne, hengeving, mjødurt, skogsnelle, gjerdevikke, skogsvinerot, vendelrot, fredløs, markjordbær, stankstorkenebb, knollerteknapp, reinfann og ramsløk. Registranten har tidligere søkt litt etter insekter i og i områder i nærheten av lokaliteten. Almestjertvinge (VU) ble funnet på blomstrende kanadagullris langs vei rett i nærheten av lokaliteten 7. juli 2006. Dette er så langt eneste kjente funn av denne arten på Nesodden.

Trusler: Ingen kjente.

Fremmede arter: Platanlønn forekommer spredt. En forholdsvis stor hestekastanje som ser ut til å frø seg vokser innenfor lokaliteten.

Verdivurdering

Lokaliteten har en del kvaliteter. Den er rik botanisk sett. Den er sannsynligvis viktig for enkelte grupper insekter, f.eks tovinger. Alm er ikke veldig vanlig på Nesodden og denne forekomsten av alm er sannsynligvis viktig for almestjertvinge som er funnet i nærheten. En bedre inventering etter insekter burde gjennomføres på denne lokaliteten. Ramsløk er heller ikke vanlig på Nesodden. Den skal være kjent fra området ned mot Flaskebek brygge fra 1950, 60 og tidlig 70-tall, men om disse forekomstene fremdeles eksisterer er usikkert (mye er bygd ut siden da). Lokaliteten er ellers preget av menneskelig aktivitet, og kontinuiteten er lav. På bakgrunn av forekomsten av rik sumskog samt potensialet denne lokaliteten har for insekter vurderes den til viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten

Totalt 2 art(er) påvist: Alm (NT), Ramsløk.

Skjøtsel og hensyn

Platanlønn bør fjernes, ellers bør lokaliteten få utvikle seg fritt.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Oversiktsbilde fra lokaliteten. Syrin og andre fremmedarter finnes i



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rikt strandberg
Utforming: Sørlig
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger innenfor en privat hage på østsiden av Hellvikalleen. Lokaliteten er liten og avgrensingen følger naturlige engas utbredelse. Lokaliteten er omgitt av vei, bebyggelse og hager.

Naturtyper og utforminger: Selv om denne lokaliteten ikke ligger helt nede ved stranda, går den under naturtypen rikt strandberg. Lokaliteten består av en frodig tørreng med store mengder

blodstorkenebb, engtjereblom og en rekke karplanter typiske for denne type habitater. Lokaliteten er dels preget av omgivelsene med innslag av femmede arter som syrin. Mye oppslag av ask og dels spisslønn forekommer på lokaliteten.

Artsmangfold: Blodstorkenebb, entjæreblom, markjordbær, tveskjeggveronika, gullris, hvitmaure, kantkonvall, smørbukk, tiriltunge, ryllik, skogkløver, fuglevikke, kransmynte, bergmynte, fagerklokke, prikkperikum, rose sp., spisslønn, ask og kirsebær.

Trusler: Gjenngroing av fremmedarter.

Fremmede arter: Syrin, gullregn.

Verdivurdering

Rikt strandberg er en noe truet naturtype (VU). Flekkengmott (*Ostrinia quadripunctalis*) (EN) er funnet like ved lokaliteten (Artskart og GBIF-Norge, 2009). Habitatet til denne arten er tørrenger, men vertsplanten er ukjent. Siden denne arten forekommer i området er det ikke usannsynlig at den også kan være på denne lokaliteten. Dessverre var det overskyet og kjølig på befaringstidspunktet, hvilket vanskeliggjøre søk etter eventuelle insekter. På bakgrunn av dette vurderes derfor lokaliteten til en viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten


Skjøtsel og hensyn

syrin og andre hageflykninger bør fjernes. Oppslag av ask og spisslønn bør ryddes.

Litteratur

Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.<http://artskart.artsdatabanken.no/>

Foto: Ole J. Lønnve. Lindetrær langs sti i nedkant av lokaliteten.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik edellauvskog
Utforming: Alm-lindeskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten utgjør en smal “stripe” som ligger i østlig nedkant av et lite åsparti, kalt Sefjell, på Hellvik, Nesodden. En sti går gjennom lokaliteten, og en liten kraftlinje går også gjennom her.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten rik edelløvskog, med utforming alm-lindeskog. Ganske mye lind forekommer her, men dimensjonene er forholdsvis små på de fleste trærne. Øvre

diameter på lind er 40-50 cm dbh. I tillegg til lind forekommer også en rekke andre treslag på lokaliteten, men dimensjonene er ikke spesielt store. I feltsjiktet er det lågurtvegetasjon med fattigere partier. Mengden død ved er liten. Lokaliteten er preget av ferdsel, og her og der er det dumpet noe hageavfall, og hageflykninger og fremmedarter forekommer gjennom hele lokaliteten.

Artsmangfold: Treslag: lind, osp, hassel, furu, kirsebær, bjørk rogn, gran, einer, selje, trollhegg, hegg. Andre karplanter: gjerdevikke, knollerteknapp, skogkløver, stankstorkenebb, skogsvinerot, hårfrytle, skogburkne, jordbær, hengeaks, kratthumleblom, teiebær, bringebær, rose sp. og liljekonvall. På befaringstidspunktet ble flere stær (NT) observert. Det er svært sannsynlig at de hekket innenfor lokaliteten eller like ved.

Trusler: Fremmedarter, hageavfall, trefelling.

Fremmede arter: Spirea, skvalderkål og andre hageflykninger.

Verdivurdering

Lokaliteten har et vist potensial. Lokalt er det ikke vanlig med såpass store enkeltforekomster med lind. bortsett fra enkelte alleer forekommer som regel lind forholdsvis spredt og enkeltvis på Nesodden. Lokaliteten kan også være viktig biotop for fugl. Vegetasjonstypen alm-lindeskog er dessuten vurdert til en hensynskrevende vegetasjonstype (LR). Lokaliteten gis derfor lokal verdi (C).

Artsliste for lokaliteten

Totalt 1 art(er) påvist: Stær (NT).

Skjøtsel og hensyn

Hageavfall bør ikke dumpes på lokaliteten. Ellers bør trærne få utvikle seg fritt.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Lågurt-eikeskog ved Berger vest.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik edellauvskog

Utforming: Lågurt-eikeskog

Mosaikk:

Feltsjekk: 04.08.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensning: Lokaliteten ligger rett vest for Berger gård og er avgrenset i vest og nord av et jorde og i sør og øst av skog som er preget av bestandsskogbruk.

Naturtyper og utforminger: Tresjiktet domineres av eik med en øvre dbh på omlag 80 cm, men de fleste trærne er betydelig mindre (ca 20-40 cm dbh). I tillegg forekommer spisslønn, ask, osp, rogn, hassel, gran, furu og einer på lokaliteten. Mengden død ved er liten. Feltsjiktet utgjøres av lågurtvegetasjon, men med innslag av mer skrinne partier med blåbær. Enkelte steder ligger berget opp i dagen. I kanten mot jordet er det et fuktparti med bl.a. skogsivaks. Et gammelt epletre står innenfor lokaliteten, noe som kan indikere at lokaliteten har vært en del av en husmannsplass e.l. En saltstein for elg finnes også plassert innenfor lokaliteten. Det er også dumpet noe kvist et par steder.

Artsmangfold: Følgende karplanter ble påvist i feltsjiktet: Liljekonvall (mye), firkantperikum, gullris, tveskjeggveronika, fagerklokke, hundekjeks, sløke, gjeldkarve, jordbær, smørbukk, rose sp., stormarimjelle, skogkløver, skogstorkenebb, teiebær, knollerteknapp, blåbær, prestekrage, lintorskemunn, ryllik, skogsalat, sissilrot, småsyre, gjerdevikke, balderbrå, rødknapp og vanlig sølvmure.

Trusler: Først og fremst hugst.

Fremmede arter: Rødhyll.

Verdivurdering

Vegetasjonstypen lågurt-eikeskog er i følge DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning, 2006) noe truet (VU). Lokaliteten har videre en relativt fin bestand av eik, hvor noen av trærne er ganske grover. Disse vil kunne få en fin utvikling over tid hvis de får stå i fred. Lokaliteten er dessuten ganske vestvent i kanten av et jorde, hvilket gjør lokaliteten ganske eksponert og dermed varm og har derfor et bra potensial for insekter, men også fugl, f. eks. sangere og trostefugler, vil kunne trives godt her. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som viktig naturtype.

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Røertjern "by night".



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik kulturlandskapssjø

Utforming: Næringsrik utforming

Mosaikk:

Feltsjekk: 13.08.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger sør-vest for Røer gård.

Naturtyper og utforminger: Røertjern er omgitt av tett gråseljekratt, som ved høy vannstand dels står under vann. Langs vannet består kantene mange steder av flytortorv. Her forekommer bl.a. melkerot og litt svartor. Mellom flytetorvpartiene og gråseljekrattene finnes bl.a. store mengder myrkongle. Lokaliteten er ellers dels omgitt av dyrket mark, hestebeite og annen skog. Tjernet er fiskerikt med sannsynligvis store bestander mort og gjedde. Mye nøkkerose finnes langs kanten rundt hele tjernet. Tre mindre bekker drenerer ut i kjernet ved tjernets vestlige og sørlige del, mens en noe større bekk drenerer ut i øst. Denne munner ut i Bunnefjorden.

Artsmangfold: Flere rødlistede arter er påvist i tilknytning til Røertjern (Artsdatabanken og GBIF-Norge, 2009): Sivhøne (NT), nattergal (NT), punktviftefly (NT), sørlig høstlibelle (VU) og

blodrød høstlibelle (EN). I tillegg skal fiskeørn (NT) være observert her våren 2009 (Marit Røer pers. med.). Den forholdsvis skjeldne øyestikkeren gulvinget høstlibelle er også funnet her (funnet av Lønnve, 2006). Både sørlig høstlibelle og blodrød høstlibelle er observert i store antall ved dette tjernet og i alt 10 øyestikkerarter er registrert her (registrant, O. Lønnve, 2006/07).

Trusler: Ingen kjente.

Verdivurdering

Funn av flere rødlistearter på denne lokaliteten, deriblant en VU-art og en EN-art tilsier at dette er en svært viktig naturtypelokalitet (A).

Artsliste for lokaliteten

Totalt 4 art(er) påvist: Punktvingefly (NT), Gulvinget høstlibelle, Blodrød høstlibelle (EN), Sørlig høstlibelle (VU).

Skjøtsel og hensyn

Litteratur

Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.<http://artskart.artsdatabanken.no/>

foto: Ole J. Lønnve. Langs åkerkanten står enkelte halvstore eiketrær.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet

Utforming: Boreonemoral blandingsskog

Mosaikk: Totalt 4 naturtype(r) registrert: Rik edellauvskog F01 - Lågurt-eikeskog F0101 (65%), Gammel lauvskog F07 - Gammelt ospenholt F0701 (15%), Andre viktige områder X16 - Frodig engparti, som tidligere trolig har vært beiemark for kyr. (15%), Dam E09 - Gårdsdam E0901 (1%).

Feltsjekk: 27.08.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger rett øst for Røertjern, og renser mot denne. Den strekker seg fra bekken ut av Røertjern og litt sørover langs dyrket mark. I øst grenser lokaliteten mot grandominert barskog. En grasdekt kjerrevei går inn gjennom deler av lokaliteten og stier

forekommer. Deler av lokaliteten er vestvendt med et varmekjært preg.

Naturtyper og utforminger: I hvert fall deler av denne lokaliteten har nok i tidligere tider vært benyttet som husdyrbeite og slått. Tresjiktet er over store partier, særlig mot åkerkanten, dominert av eik men med et betydelig innslag av andre treslag. Andre partier er dominert av bjørk og osp og enkelte parier av ask. De fleste treslag typisk for edelløvskog på Nesodden er representert i området, men det er forholdsvis lite lind, alm, hassel og hegg. Ingen store trær av lind og alm ble registrert under befaringen. Øvre dimensjoner på eik, omlag 90 cm dbh., men de fleste trærne er betydelig mindre (10-40 cm dbh). Et par eiketrær har trolig begynnende hulhet. Endel eldre osp og bjørk er også godt representert innenfor avgrensningen. Øvre dbh på osp er omlag 50 cm. Enkelte store ask finnes også, med øvre dbh på ca 50 cm. Død ved finnes spredt og i partier, både i form av læger og gadd, samt eldre stubber. Majoriteten av den døde veden er av bjørk. Alle nedbrytningsstadier er representert, men det er lite i de siste nedbrytningsstadier. Sjiktningen på skogen er lav til middels, og de største dimensjonene er lite representert, selv om det innimellom står noen forholdsvis store eiketrær. Feltsjiktet domineres av lågurtvegetasjon, men med skrinnere og fattigere partier. Det er et fuktdrag gjennom deler av lokaliteten. I den sør-østlige delen mot alders og sykehjemmet finnes en dam. Denne tørker neppe helt inn om sommeren. I tilknytning til denne finne elementer av sumpskog med noe svartor og gråselje. Småsalamander (NT) og bred blålibelle (EN) er registrert i tilknytning til denne (Artsdatabanken og GBIF-Norge, 2009). Helt nede mot bekken ut fra Røertjern, har lokaliteten et mer preg av eng og hagemark med mer spredte trær, men dette er i ferd med å gro igjen. Her ble brun ospekjuke funnet på en død ospegadd. Et gammelt piggtrådgjerde vitner om husdyrhold (trolig storfe) noen tiår tilbake i tid. I dette området er det også et lite fuktparti med gråselje og litt svartor. Mye av lokaliteten ligger eksponert til mot åkerkanten, mens andre partier ligger mer skyggefullt til. Det går enkelte stier gjennom området, og deler av området benyttes som hestebeite. Der det går hest har dette medført en kraftig slitasje på undervegetasjonen.

Artsmangfold: Følgende treslag er registrert: Eik, osp, hassel, bjørk, svartor, selje, gråselje, rogn, spisslønn, ask, lind, hegg, kirsebær, alm, (NT), trollhegg, einer, gran og furu. Andre karplanter registrert: liljekonvall, kantkonvall, markjordbær, kratthumbleblom, stornesle, ryllik, nyseryllik, mjødurt, skogkløver, hvitkløver, rødkløver, hvitveis, skogburkne, rose sp., gullris, fuglevikke, tveskjeggveronika, firkantperikum, stormarimjelle, teiebær, skogstorkenebb, stankstorkenebb, hundekjeks, hvitmaure, gullmaure, knollerteknapp, engsyre, blåklukke, blåklukke, timotei, rørkvein, rødknapp, lintorskemunn, bringebær, skogsnelle, smørbukk (mye i partier), skjermesveve, engsoleie, krossved og rødknapp.

Trusler: Spredt er det stort opplag av ask. Dette bør holdes nede.

Fremmede arter: Edelgran (noen selvfrødde ungplanter), blankmispel og rødhyll samt iberiaskogsnegl. Denne siste arten er det mye av.

Verdivurdering

Lokaliteten har stor treslagsvariasjon og artsrikt feltsjikt. Lokaliteten er dels vestvendt. Den er også ganske hetrogen, og flere vegetasjons- og naturtyper finnes innenfor avgrensningen. Bare på bakgrunn av dette tilsier det at lokaliteten bør ha et stort potensial som leveområde for en rekke organismer. Her er stor variasjon som gir nisjer for mange arter. Solblom (VU) er funnet her i 2005. Død ved mengden er derimot ikke så stor, og lokaliteten mangler helt veldig store og gamle trær, selv om noen eiketrær er forholdsvis store med trolig begynnende hulhet.

Vegetasjonstypene lågurt-eikeskog og gråseljekratt er noe truede (VU) vegetasjonstyper.

Dvergspett (VU) skal også ha hekket her. Lokaliteten er sannsynligvis svært viktig for fugl (f.eks. hakkespetter og sangere). Lokaliteten har et stort potensial for sopp, særlig jordboende arter og potensialet for sommerfugler, enkelte tovingegrupper og veps er også stort. Lokaliteten må også sees i sammenheng med resten av eikeskogen i området rundt Røer-Torget. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten

Totalt 1 art(er) påvist: Alm (NT).


Skjøtsel og hensyn

Oppslag av særlig ask her og der kan med fordel holdes litt i sjakk.

Litteratur

Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.<http://artskart.artsdatabanken.no/>

Foto: Ole J. Lønnve. Lindeallee på østsiden av Løes østre.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Gammelt tre
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.08.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Allee som går fra Kirkevein og opp mot Løes østre.

Naturtyper og utforminger: Allee med omlag 20 lindetrær med variable dimensjoner, øvre dimensjoner er ca 50-60 cm dbh. Trærne er ikke styvet. I øvre del opp mot gården står noen store bøketrær.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble funnet, men ved Løes østre er det registrert mange sommerfuglarter (Artsdatabanken og GBIF-Norge, 2009) som potensiell også kan være knyttet til denne lokaliteten.

Trusler: Ingen åpenbare trusler.

Verdivurdering

Lind har mellomrik bar som gjerne huser en blanding av arter som i hovedsak vokser på fattigbarkstrær og på rikbarkstrær. Trærne i denne allen er ikke veldig store og gamle, men de kan allikevel være viktige for enkelte interessante arter knyttet gamle løvtrær. På bakgrunn av dette gis lokaliteten lokal vedi.

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Litteratur

Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.<http://artskart.artsdatabanken.no/>

Foto: Ole J. Lønnve. Lindeallee på Løes østre..



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Gammelt tre
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.08.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Allee som går fra Kirkevein og opp mot Løes østre.

Naturtyper og utforminger: Allee med omlag 16 lindetrær noe variable dimensjoner, øvre dimensjoner er ca 80 cm dbh. Trærne er ikke styvet, men enkelte greiner er kappet. Noen trær kan ha begynnende hulhet.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble funnet, men ved Løes østre er det registrert mange sommerfuglarter (Artsdatabanken og GBIF-Norge, 2009).

Trusler: Ingen åpenbare trusler.

Verdivurdering

Lind har mellomrik bar som gjerne huser en blanding av arter som i hovedsak vokser på fattigbarkstrær og på rikbarkstrær. Trærne i denne allen er ikke veldig store og gamle, men de kan

allikevel være viktige for enkelte interessante arter knyttet gamle løvtrær. På bakgrunn av dette gis lokaliteten lokal verdi (C verdi).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Deler av lokaliteten er veldig tett grunnet oppsalg av ask. Denne kan med fordel tynnes/ryddes litt. Videre er slitasjen fra hest neppe positiv. Bruken av lokaliteten som hestebeite kan med fordel modereres noe. Middlere beitepress med noe rydding med noen års mellomrom er optimalt for de fleste arter.

Litteratur

Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.<http://artskart.artsdatabanken.no/>

Foto: Ole J. Lønnve .Lokaliteten utgjøres av en åkerholme langs innkjørselen til Røer.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik edellauvskog
Utforming: Lågurt-eikeskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 05.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på venstre hånd langs innkjørselen til Røer gård.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er omgitt med åker på alle kanter. Det går en stor kraftlinje tvers gjennom lokaliteten, og under denne blir det ryddet med jevne mellomrom noe som påvirker negativt. Tresjiktet består av edelløvtrær som eik, lind, ask, spisslønn, kirsebær og hassel. Av boreale løvtrær forekommer noe osp og rogn. En stor eik med en dbh på ca 1 m med trolig

begynnende hulhet står i den øslige halvdelen av lokaliteten. Ellers finnes tre eiker med dbh på omlag 50-60 cm. En av disse har ganske mye døde greiner. Ut over dette er det ikke store trær på lokaliteten. Feltsjiktet utgjøres av rik lågurtvegetasjon. Det er lite naturlig død ved på lokaliteten, men i forbindelse med rydding under kraftlinjen ligger det en del kvist her. Her er det også et stort oppsalg av ask.

Artsmangfold: Følgende karplanter ble registrert: rose sp., liljekonvall, kantkonvall, knollerteknapp, dag og nattfiol, stankstorkenebb, skogstorkenebb, kratthumbleblom, hundekjeks, markjordbær, teiebær, bringebær, engsolleie, smørbukk, firkantperikum, engsyre, tveskjeggveronika,

Trusler/påvirkning: Kraftgate som stadig ryddes.

Fremmede arter: Rødhyll.

Verdivurdering

Lågurt-eikeskog er en noe truet naturtype (VU). På lokaliteten forekommer en forholdsvis stor eik. I tillegg er treslagvariasjonen stor. Lokaliteten må også sees i sammenheng med resten av eikeskogen i området rundt Røer-Torget. I dette området er det påvist en rekke interessante og rødlistete arter. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Store trær som står nær kraftgate bør bevares.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Skogbunnen er dekket av liljekonvall.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik edellauvskog

Utforming: Lågurt-eikeskog

Mosaikk:

Feltsjekk: 05.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten utgjøres av en åkerholme litt øst for eikeskogen på Røer.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er omgitt med åker på alle kanter. En større kraftlinje sneier så vidt bort i kanten av lokaliteten. Området betsår av lågurt-eikeskog med svært mye liljekonvall på skogbunnen. Ca 10 eiketrær med en dbh i intervallet 60-90 cm forekommer innenfor avgrensningen. Andre treslag forekommer også som lind, ask, spisslønn, kirsebær,

hassel, einer og eple. Noe død ved forekommer spredt gjennom hele lokaliteten, men samlet sett er mengden død ved lav. I følge Artskart (Artsdatabanken og GBIF Norge, 2009) oksetungesopp (NT) registrert her i 2006.

Artsmangfold: I feltsjiktet ble følgende karplanter registrert under befaringen: Liljekonvall, kantkonvall, hvitveis, blåveis, skogburkne, gjerdevikk og teiebær

Trusler: Ingen kjente

Fremmede arter: Rødhyll sprer seg gjennom lokaliteten.

Verdivurdering

Lågurt-eikeskog er en noe truet naturtype (VU). På lokaliteten forekommer en forholdsvis stor eik. I tillegg er treslagvariasjonen stor. Oksetungesopp (NT er registrert her, og denne arten er i tillegg til å være en rødlisteart, en signalart for rike artsamfunn. Lokaliteten må også sees i sammenheng med resten av eikeskogen i området rundt Røer-Torget. I dette området er det påvist en rekke interessante og rødlistete arter. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten

Totalt 1 art(er) påvist: Oksetungesopp (NT).

Skjøtsel og hensyn

Litteratur

Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.<http://artskart.artsdatabanken.no/>

Foto: Ole J. Lønnve. Et steingjerde vitner om tidligere tiders bruk av området som



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik edellauvskog

Utforming: Lågurt-eikeskog

Mosaikk:

Feltsjekk: 05.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs RV 156. I nord grenser lokaliteten mot åker, i vest og sør mot annen skog og i nord mot kraftlinje.

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten utgjøres av lågurt-eikeskog. Øvre dbh på eika er 70-80 cm, men de fleste trærne ligger i intervallet 30-40 cm dbh. Noen trær har begynnende hulhet. Andre treslag som spisslønn, ask, lind, furu, gran, bjørk og hassel forekommer også gjennom

lokaliteten. Feltsjiktet domineres av liljekonvall, men partier med blåbærskog finnes spredt. Et gammelt steingjerde vitner om tidligere tiders bruk som beitemark for husdyr.

Artsmangfold: I feltsjiktet ble følgende karplanter registrert under befaringen: Liljekonvall, knollerteknapp, hvitveis og blåbær.

Trusler: Ingen kjente.

Fremmede arter: Rødhyll.

Verdivurdering

Lågurt-eieskog er en noe truet naturtype (VU). På lokaliteten forekommer forholdsvis store eik. I tillegg er treslagvariasjonen forholdsvis stor. Lokaliteten må også sees i sammenheng med resten av eieskogen i området rundt Røer-Torget. I dette området er det påvist en rekke interessante og rødlistete arter. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. allen langs veien til Sørby gård.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Store gamle trær

Utforming: Gammelt tre

Mosaikk:

Feltsjekk: 10.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Loklaiteten ligger langs veien rett før man kommer til selve Sørby gård og er omgitt av åker på begge sider.

Naturtyper og utforminger: En av de eldste alleene på Nesodden bestående av forskjellige treslag: Ask (26 trær), lind (2 trær), bjørk (2 trær), rogn (2 trær) og spisslønn (2 trær). Øvre dbh 70 cm (ask), 90 cm (lind), 50 cm (bjørk), 30 cm (rogn) og 70 cm (spisslønn). Trærne er ikke styvet. Et av lindetrærne er hule, og det skal ha hekket kattugle her (Direktoratet for naturforvaltning, 2009).

Trusler: Ingen kjente

Verdivurdering

Gamle trær representerer lang kontinuitet. De kan ha forekomster av arter som tidligere var mer

Lok. nr. 133 Sørby forts.

utbredt. Ask, lind, lønn og rogn er alle rikbarkstrær, og kan derfor ha et vist potensial som levested for en rekke arter. På bakgrunn av dett gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Oversiktsbilde av lokaliteten.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rikt strandberg
Utforming: Sørlig
Mosaikk:
Feltsjekk: 21.08.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten strekker seg fra Torrvik brygge til utløpet av bekken fra Røertjern.

Naturtyper og utforminger: Strandberg med en god del blodstorkenebb i partier og ellers mange planter typiske for denne naturtypen i Indre Oslofjord. I kantene vokser en del svartor, men også en rekke andre løvtrær som alm (NT), ask, spisslønn, selje, rogn og furu. Lokaliteten utgjør en

forholdsvis smal stripe, og er relativt bratt. Mange partier består av bart fjell uten vegetasjon. Enkelte fuktdrag går ned mot stranda. I kantene kommer det inn enkelte hageflykninger og andre fremmede arter som rynkrose og skvalderkål. Enkelte brygger ligger langs stranda.

Artsmangfold: Følgende karplanter ble registrert i feltsjiktet: Blodstorkenebb, smørbukk, markjordbær, fuglevikke, hvitbergknapp, blåklukke, fjærekoll, liljekonvall, kantkonvall, skjærmsveve, hvitmaure, skogsalat, bringebær, rose sp., stankstorkenebb og hvitmaure.

Trusler: Kyststien går langs her, men den representerer neppe noen stor trussel. Bading/soling på svaberg er heller neppe noe stort problem. Hageavfall samt forvilling av fremmedarter utgjør trolig den største trusselen

Verdivurdering

Rikt strandberg er en noe truet vegetasjonstype. Lokaliteten har en rik flora og kantsonen har forholdsvis stor treslagvariasjon. Dessverre er lokaliteten østvendt, noe som nok ekskluderer de mest varmekrevende artene. Allikevel har denne lokaliteten et stort potensial for interessante arter, særlig insekter knyttet til denne naturtypen. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype.

Artsliste for lokaliteten

Totalt 1 art(er) påvist: Alm (NT).

Skjøtsel og hensyn

Få bedre oversikt over fremmedarter i kantsonen. Disse bør så ryddes vekk.

Litteratur

Foto: Ole J. Lønnve. Dammen øst for Nesoddtangen gård.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Dam

Utforming: Gårdsdam

Mosaikk:

Feltsjekk: 04.06.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger litt sør-øst for Nesoddtangen brygge.

Naturtyper og utforminger: En verdifull dam som har en rik amfibieforekomst. Alle amfibiearter, med unntak av padde og damfrosk, er registrert her. Dammen er avsondret fra sjøen med noen få meter både i avstand og høyde, og er trolig lite påvirket av sjøvann. Sverdlilje og litt svartor vokste rundt dammen.

Trusler: Gjenfylling?

Fremmede arter: Ingen registrert.

Verdivurdering

På bakgrunn av denne dammens viktighet for amfibier, med bl.a. stor salamander (VU), gis den verdi som svært viktig naturtype (A).

Lok. nr. 135 Nesoddtangen gård, dam forts.

Artsliste for lokaliteten


Totalt 4 art(er) påvist: Stor salamander (**VU**), Liten salamander (**NT**), Spissnutet frosk (**NT**), Vanlig frosk.

Skjøtsel og hensyn

Litteratur

Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.<http://artskart.artsdatabanken.no/>

Foto: Ole J. Lønnve. En grov svartor står langs bekken nær RV-156.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Viktig bekkedrag
Utforming: Parti som binder sammen andre naturmiljøer
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.08.2009 (siste)

Beskrivelse

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten går fra vestsiden av RV-156 og følger Røerbekken oppover mot Røertjern.

Naturtyper og utforminger: Bekkedrag med rik og variert flora. Ganske mye død ved forekommer. Stor treslagsvariasjon med svartor (bl.a. et grovt eksemplar med dbh på omlag 90 -100 cm), spisslønn (opp mot 70 cm dbh), lind, ask, alm (NT), hegg, rogn, osp, selje, furu og gran.

De fleste trærne er rundt 40 cm dbh. I kantsonen finnes or-askeskog (VU), samt partier med lågurtvegetasjon og mer sumpskog preget vegetasjon.

Artsmangfold: I kantsonen forekommer bl.a. mjødurt, smørbukk, trollbær, markjordbær, stankstorkkenebb, vendelrot, skogsveve, skogsalat, liljekonvall, hagetorn, skogburkne og rips.

Trusler: Noe fyll av hageavfall og masse samt litt skrot ligger helt nederst i lokaliteten mot RV-156. Videre finnes en forholdsvis stor kraftgate som krysser bekken. I forbindelse med denne blir skogen med jevne mellomrom ryddet.

Fremmede arter: Snøballbusk

Verdivurdering

Denne lokaliteten må sees i sammenheng med resten av området rundt Røer, og den er en naturlig forlengelse av området øst for RV-156 (Sørby Sør). Vegetasjonstypen or-askeskog er noe truet (VU), treslagvariasjonen er dessuten høy. Lokaliteten har et godt potensial for fugl samt enkelte insektgrupper som soppmugg. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som viktig naturtype (B).

Artsliste for lokaliteten

Totalt 1 art(er) påvist: Alm (NT).

Skjøtsel og hensyn

Litteratur

Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik edellauvskog

Utforming: Or-askehog

Mosaikk: Totalt 6 naturtype(r) registrert: Rik sumpskog F06 - Rik sumpskog F0601 (25%), Gammel lauvskog F07 - Gamle ospesholt (10%), Rik edellauvskog F01 - Lågurt-eikeskog F0101 (15%), Rik sumpskog F06 - Rik sumpskog F0601 (25%), Gammel lauvskog F07 - Gamle ospesholt (10%), Rik edellauvskog F01 - Lågurt-eikeskog F0101 (15%).

Feltsjekk: 13-10-2003 (siste)

Beskrivelse

Naturtype/vegetasjonstyper: Meget variert biotop langs to bekker som møtes. Varierer fra granskog med død ved og svartorsump langs bekkene i vest, til edeløvskog, svartorsump og ospesuksesjoner i vest etter elvemøtet. Det er også innslag av hagemark med eldre eiker sør for Sørby gård. Bergvegger finnes langs bekken. Spredt med død ved av både gran, borealt løv og edelløv. Området er meget viktig viltområde med bla.a dvergspett. Se også beskrivelse i Bratli (2003).

Verdivurdering

En total vurdering av skogkvaliteter og viltverdier gir verdi som svært viktig (A verdi).

Artsliste for lokaliteten

Totalt 1 art(er) påvist: Granrustkjuke.

Skjøtsel og hensyn

Ikke hogst

Litteratur

Bratli, H. 2003. Biologisk mangfold i Nesodden kommune. Nijos rapport 03/2003.

Naturtyperegistreringer

Naturtype: Rik edellauvskog

Utforming: Lågurt-eikeskog

Mosaikk:

Feltsjekk: 13-10-2003 (siste)

Beskrivelse

Naturtype/vegetasjonstyper: Kantsone mellom dyrkamark og idrettsbane. En del eik på rundt 40 cm, samt en del yngre edelløv i busksjikt. Også noe furu og osp finnes. Gamle eiketrær er viktige for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav.


Verdivurdering

Lokaliteten gis lokal verdi (C verdi) da trærne fortsatt er ganske unge i økologisk forstand.

Artsliste for lokaliteten**Skjøtsel og hensyn**

Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.

Litteratur



BioFokus er en ideell stiftelse som skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. BioFokus ønsker å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

En kunnskapsbasert forvaltning forutsetter god dokumentasjon av de arealene som skal forvaltes. BioFokus legger derfor stor vekt på feltarbeid for å sikre oppdaterte og relevante data om botanikk, zoologi, økologi, samt avgrensning og verdisetting av områder.

Høy kompetanse er en forutsetning for å kunne registrere og presentere biologisk mangfold-data på en god måte. BioFokus sine medarbeidere er derfor godt skolert innenfor en rekke artsgrupper og har en bred økologisk forståelse for de ulike naturtypene som de arbeider med, det være seg skog, kulturlandskap eller ferskvann. Digitale verktøy som databaser, GIS og bilde-behandling er viktige redskaper i vårt arbeid for å anskueliggjøre naturverdier på en best mulig måte.

Stiftelsen utgir en digital rapportserie som heter BioFokus-rapport, <http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>